



Noticario Ornitológico

Authors: Molina, Blas, Prieta, Javier, and Lorenzo, Juan Antonio

Source: Ardeola, 62(1) : 187-218

Published By: Spanish Society of Ornithology

URL: <https://doi.org/10.13157/arla.62.1.2015.187>

BioOne Complete (complete.BioOne.org) is a full-text database of 200 subscribed and open-access titles in the biological, ecological, and environmental sciences published by nonprofit societies, associations, museums, institutions, and presses.

Your use of this PDF, the BioOne Complete website, and all posted and associated content indicates your acceptance of BioOne's Terms of Use, available at www.bioone.org/terms-of-use.

Usage of BioOne Complete content is strictly limited to personal, educational, and non - commercial use. Commercial inquiries or rights and permissions requests should be directed to the individual publisher as copyright holder.

BioOne sees sustainable scholarly publishing as an inherently collaborative enterprise connecting authors, nonprofit publishers, academic institutions, research libraries, and research funders in the common goal of maximizing access to critical research.

NOTICARIO ORNITOLÓGICO

Blas MOLINA¹, Javier PRIETA² y Juan Antonio LORENZO³ (Canarias)

Este informe recopila información de 168 especies repartidas por toda la geografía nacional, siguiendo la secuencia taxonómica y los nombres según la *Lista de las Aves de España* (Gutiérrez *et al.*, 2012). Entre otras citas recoge datos de censos realizados generalmente a escala regional por algunas comunidades autónomas: buitre leonado, espátula, avutarda, alimoche, etc. Citas de irrupción de verderón serrano *Carduelis citrinella* con registros en lugares no habituales como Lugo, Málaga, Sevilla o Ceuta. En Canarias, entre otras especies tanto nidificantes como migratorias, se aportan nuevos datos que confirman la continua expansión del tarro canelo *Tadorna ferruginea* y de la tórtola senegalesa *Streptopelia senegalensis*.

Se recomienda el envío de las observaciones de interés a la dirección noticiario@seo.org.

CISNE VULGAR

Cygnus olor

Se avista en el lago de Bañolas, Girona, un ave con anilla de Noruega, el 10 de febrero de 2015 (G. Dalmau). Tres individuos en el marjal de Pego-Oliva, Valencia, el 11 de febrero de 2015 (Grupo de anillamiento Pit-Roig).

ÁNSAR CARETO

Anser albifrons

Cuatro adultos en el azud de Riobos, Salamanca, del 3 de diciembre de 2014 al 25 de enero de 2015 (M. Rouco, A. Ceballos y otros). Máximo de cuatro adultos en la laguna de El Oso, Ávila, el 7 de diciembre de 2014 (R. Vicente, V. de Dios, D. Sánchez, S. Macías y F. Cosme). Máximo de 13 ejemplares en la Laguna de La Nava, Palencia, el 8 de diciembre de 2014 (J. Barrueso). Máximo de tres ejemplares en las lagunas de Villafáfila, Zamora, el 27 de diciembre de 2014 (C. Osorio, J. Barrueso y otros). Un ejemplar en el embalse de

Ullibarri-Gamboa, Álava, del 8 al 21 de enero de 2015 (S. Alarcón). Presencia en el embalse de Valdecañas, Cáceres, entre el 24 de noviembre de 2014 y el 28 de enero de 2015, con un máximo de 6 aves (J. Briz, V. Risco, S. Mayordomo, R. Montero y otros). Dos adultos en arrozales de Madrigalejo, Cáceres, el 7 y el 19 de diciembre de 2014 (M. Kelsey). En Badajoz, uno en el embalse de Los Canchales el 29 de noviembre de 2014 (J. L. Bautista); uno en la laguna de Torremejía del 4 de enero al 3 de febrero de 2015 (M. Gálvez y J. Guerra); dos en Moheda Alta, Navalvillar de Pela, el 20 de enero de 2015 (J. Guerra, M. Gálvez y J. Gómez Aparicio) y uno en el embalse de Alange el 3 de febrero de 2015 (J. Guerra).

ÁNSAR INDIO

Anser indicus

Corrección: En *Ardeola*, 61: 435-436: el número de ejemplares observados en la laguna Mari Pascuala, Parque Polvoranca, Leganés, Madrid, son dos (J. M. Gálvez Linares y J. M. Gálvez Gil).

¹ noticiario@seo.org; bmolina@seo.org

² javierprieta@gmail.com

³ jalorenzo@seo.org

BARNACLA CANADIENSE GRANDE*Branta canadensis*

Un adulto anillado en Reino Unido localizado en el parque de Isabel La Católica, Gijón, Asturias, al menos hasta el 9 de marzo de 2015 (C. Álvarez Usategui).

BARNACLA CARIBLANCA*Branta leucopsis*

Cinco individuos en la laguna de La Nava, Palencia, del 5 de diciembre de 2014 al 20 de enero de 2015 (C. Zumalacárregui). Una en la marisma Gallega, Doñana, Huelva, del 9 al 31 diciembre de 2014 (L. García). Cinco ejemplares en Muriillo del Río Leza, La Rioja, el 2 de marzo de 2015 (I. Gámez). Un ejemplar en el embalse de El Vicario, Ciudad Real, el 10 de noviembre de 2014 (B. Gutiérrez).

BARNACLA CARINEGRA*Branta bernicla*

Un ejemplar en la marisma Gallega, Doñana, Huelva, el 12 de diciembre de 2014 (L. Gracia y M. Cañadas). Cuatro ejemplares en el azud de Riobobos, Salamanca, del 2 de enero al 1 de febrero de 2015 (A. González Mendoza). Unos 300 ejemplares en las marismas de Santoña, Cantabria, el 2 de enero de 2015 (C. Gutiérrez Expósito). Cuatro individuos cazados en la albufera de Valencia, Valencia, el 3 de enero de 2015 (Birding Albufera). Cuatro ejemplares en Villafáfila, Zamora, del 3 al 24 de enero y un ejemplar hasta el 21 de febrero de 2015 (C. Osorio, B. Arenaz, M. Rodríguez y J. Olabarría). Máximo de 20 ejemplares en Urdaibai, Vizcaya, el 14 de febrero de 2015 (J. Hidalgo). Cinco ejemplares en Chipiona, Cádiz, el 11 de enero de 2015 (J. Salcedo y M. A. Rojas). Un ejemplar en el embalse de Campañana, Carucedo, León, del 17 al 27 de enero de 2015 (E. de la Calzada, P. Nieto, R. Blanco y M. Rodríguez). Máximo de seis ejemplares en Plaiaundi, Irún, Guipúzcoa, el 19 de enero de 2015 (I. Gutiérrez). Tres ejemplares en Málaga del 19 al 26 de enero de 2015 (J. Ramírez, J. Milla y A. Paterson). Uno en Aznalcóllar, Sevilla, el 29 de enero de 2015 (F. Chiclana).

Corrección: se elimina la cita que por error se incluyó en *Ardeola*, 61: 436, correspondiente a tres

aves en el embalse de Urrunaga, Álava, el 8 de enero, 4 de febrero y 10 de marzo (S. Alarcón y C. Mateos).

GANSO DEL NILO*Alopochen aegyptiacus*

Se instala una pareja en la laguna artificial de Caja Mágica, Madrid, en 2012; en 2013 se observa que sacan 6-7 pollos, que fueron desapareciendo al final del verano; en 2014 realizaron una primera puesta sacando adelantes seis pollos y tiene lugar una segunda puesta en la segunda semana de octubre con nueve huevos, con presencia de los dos adultos y tres pollos en el mes de noviembre (Alcebo-J. Sánchez). En Moheda Alta, Navalvillar de Pela, Badajoz, presencia de más de 19 aves entre el 20 de octubre y el 27 de diciembre de 2014, con un máximo de 57 aves en esta última fecha (J. Guerra, F. Bernáldez, F. Macías, J. Porras, M. Kelsey y otros). Se cuentan 34 ejemplares en el embalse de Alcollarín, Cáceres, el 18 de octubre de 2014 (F. Yuste). Cuatro ejemplares en el embalse del Torcón, Toledo, el 17 de noviembre de 2014 (A. Nicolau). Una pareja con varias crías en la entrada del río Zújar al embalse de la Serena, a la altura de la antigua estación de Belalcázar, Córdoba, el 6 de diciembre de 2014. La presencia de ganso del Nilo en el entorno del Zújar y el Guadamatilla está siendo ya bastante común, observando grupos que llegan a los 25 individuos (SEO-Córdoba). Un individuo en la zona de lagunaje, Las Negras, Almería, el 4 de enero de 2015 (P. de Oña). Dos adultos en el embalse de Bermejales, Granada, el 18 de enero de 2015 (J. M. Fernández y I. Fernández). Dos ejemplares en el parque de La Polvoranca, Leganés, Madrid, el 22 de febrero de 2015 (B. García). Cuatro aves en el delta del Llobregat, Barcelona, el 5 de marzo de 2015 (F. López).

Corrección: En *Ardeola*, 61: 436: el número de ejemplares observados en la laguna Mari Pascuala, Parque Polvoranca, Leganés, Madrid, son dos (J. M. Gálvez Linares y J. M. Gálvez Gil).


TARRO CANELO*Tadorna ferruginea*

Presencia de una pareja en el campo de golf de la Federación Española, Madrid, desde marzo hasta junio de 2014 sin observarse reproducción, y de

nuevo aparece en la primavera de 2015 (E. Torija). Un ejemplar en el parque de La Polvoranca, Leganés, Madrid, del 22 de febrero al 4 de marzo de 2015 (B. García). Un ejemplar en el embalse de Valdecañas, Cáceres, el 23 de noviembre y el 15 de diciembre de 2014 (J. Briz, V. Risco y S. Mayordomo). Uno en Moheda Alta, Navalvillar de Pela, Badajoz, del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2014 (C. Clemente, S. Mayordomo, J. M. Herranz y otros). En Navarra, dos ejemplares en Arguedas, el 13 de diciembre de 2014 (J. M. Samanes); uno en la laguna de Dos Reinos, el 3 de enero de 2015 (J. Sola) y dos en la balsa de Zolina, el 6 de diciembre de 2014 (E. Salvatierra).

Canarias. Censo de la población nidificante en Canarias en la temporada de cría de 2014: entre 42 y 46 parejas nidificantes, la mayoría en Fuerteventura (36-40) aunque también en Lanzarote (cuatro parejas), Gran Canaria (dos) y Tenerife (una posible), con un total de entre 169 y 315 ejemplares adultos para el conjunto de las islas (J. A. Lorenzo y M. Cabrera, Delegación de Canarias de SEO/BirdLife). Datos de nidificación y de nuevas localidades en diferentes islas que reflejan su expansión actual en el archipiélago. En Lanzarote, en las dos localidades de cría habituales: en las salinas de Janubio, Yaiza, una pareja con 19 pollos de al menos una semana de edad el 28 de marzo de 2015, permaneciendo los 19 pollos con vida y ya muy crecidos el 11 de abril de 2015 (J. Sagardía y F. J. García Vargas), y en el campo de golf de Tías, una pareja con nueve pollos el 6 de abril de 2015, mientras que el 17 de abril de 2015 se constata que al menos ocho pollos continúan en el lugar (F. J. García Vargas y J. Sagardía). Además, el 13 de marzo de 2015 se observa una pareja de adultos bañándose en gavias de Guatiza, Tegui, aunque a los pocos minutos después emprendieron el vuelo (D. Trujillo). En Gran Canaria, en el campo de golf de El Cortijo, Telde, donde cría en los últimos años, el 8 y el 10 de marzo 2015 hay dos adultos junto a 12 pollos, y el 24 de marzo de 2015 sólo los adultos y ni rastro de los pollos (M. A. Suárez). En esta misma isla, el 27 de noviembre de 2014 y el 2 de diciembre de 2014 se detectan 17 ejemplares en Juan Grande en una balsa de agua para riego donde se reprodujo la especie la primavera de ese mismo año (*Ardeola*, 61: 437), y donde hay

13 ejemplares el 23 de febrero de 2015 y 8 individuos el 20 de marzo de 2015 (A. Delgado). Además, nuevas localidades: en charca de riego de El Barrial, Gáldar, una pareja el 30 de enero de 2015 (B. Rodríguez y N. Carrasco), seguramente el mismo enclave donde hay una pareja con comportamiento territorial ante un chorlito chico el 11 de abril de 2015 (D. Trujillo). También el 11 de abril de 2015 pero en el embalse el Draguillo, Gáldar, se detecta una pareja con 10 pollos pequeños que expulsan a una garza real, mientras que el 16 de abril de 2015 en Montaña de Laguna Chica, Agüimes, se observa una pareja con nueve pollos pequeños (D. Trujillo). En Tenerife, una pareja en la Charca de Bernardino, Granadilla de Abona, el 27 de octubre de 2014 (R. Fernández Febles) y de nuevo el 14 de noviembre de 2014 (R. Barone y E. Sacramento), así como en el norte de la isla, donde por el momento no se había visto, un macho adulto en el campo de golf de Buenavista del Norte entre el 7 de marzo y el 2 de abril de 2015 (J. Curbelo y B. Rodríguez). En La Gomera, primera observación: en el embalse de Cardones, Alajeró, se observa un macho que manifiesta comportamiento de alarma junto a un pequeño grupo de fochas comunes el 20 de marzo de 2015 (D. Trujillo).



Tarro canelo *Tadorna ferruginea*. Granadilla de Abona (Tenerife). Foto: Ramón Fernández Febles.

PATO MANDARÍN*Aix galericulata*

Un macho en Castro de Rei, Lugo, el 23 de diciembre de 2014 (D. Calleja). Una hembra o juvenil en Soutomayor, Pontevedra, el 24 de marzo de 2015 (V. Rodríguez). Un macho en Plaiaundi, Guipúzcoa, desde el 19 de noviembre al 12 de diciembre de 2014 (J. P. Esparcia). Un macho en Urdaibai, Vizcaya, el 26 de diciembre de 2014 (J. L. Pacheco y J. M. Domínguez). En Navarra: dos machos y una hembra adultos en el río Arga, Pamplona, desde el 22 al 30 de diciembre de 2014 (D. García Mina, J. Ardaiz, D. García y H. Sarasa) y dos machos y una hembra en el embalse de Irabia, Navarra, el 29 de diciembre de 2014 (A. Senosiain). Un individuo en el pantano del Zarcejo, finca Los Escoriales, entre Andújar y Villanueva de la Reina, Jaén, el 5 de diciembre de 2014 (F. Silvestre).

SILBÓN EUROPEO*Anas penelope*

Canarias. Citas invernales: En Lanzarote, un ave en el campo de golf de Tías entre el 4 y el 22 de noviembre de 2014 (J. Sagardía y F. J. García Vargas). En Gran Canaria, una hembra en la pequeña presa de La Data, San Bartolomé de Tirajana, a 920 m de altitud, el 3 de diciembre de 2014 (D. Trujillo). En Tenerife, un macho en plumaje de



Silbón europeo *Anas penelope*. Gravera de Las Galletas, Arona (Tenerife). Foto: Ramón Fernández Febles.

eclipse en las graveras de Las Galletas, Arona, el 8 y el 13 de noviembre de 2014 (R. Fernández Febles) así como el 14 de noviembre de 2014 (R. Barone y E. Sacramento).

ÁNADE FRISO*Anas strepera*

Canarias. En La Palma, grupo de seis aves en una charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2014 (R. Burton).

ÁNADE AZULÓN*Anas platyrhynchos*

Canarias. En Lanzarote, un macho en el campo de golf de Tías entre el 7 y el 9 de abril de 2015 (J. Sagardía, D. Pérez y F. J. García Vargas). En Tenerife, un macho en compañía de fochas comunes en la balsa de La Cruz Santa, Los Realejos, el 13 y 14 de noviembre de 2015 (D. Trujillo).

ÁNADE RABUDO*Anas acuta*

Canarias. En Tenerife, una hembra en una de las charcas de un campo de golf en San Miguel de Abona el 14 de noviembre de 2014 (R. Barone y E. Sacramento).

CERCETA CARRETONA*Anas querquedula*

Bando destacado con un mínimo de 200 aves en el embalse de La Pedrera, Torremendo, Alicante, el 8 de marzo de 2015 (C. Requena, P. Perales, T. García, M. Fernández, S. Carrasco y T. García Rubio). **Canarias.** En La Palma, en fecha invernal, una hembra en una charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, el 6 de diciembre de 2014 (R. Burton).

PORRÓN PARDO*Aythya nyroca*

Primera cita de reproducción de esta especie para la provincia de Granada: una hembra con ocho crías en la Charca de Suárez, Motril, Granada, el 31 de mayo de 2014 (J. Pérez-Contreras), no

obstante, parece tratarse de un caso de hibridación con porrón europeo *Aythya ferina*, pues se llegó a observar a un macho de esta especie cortejando e intentado copular con el ejemplar hembra de porrón pardo y posteriormente se comprueba que los descendientes que han sobrevivido tras el verano muestran rasgos mixtos de sus progenitores. El 21 de febrero de 2015, la hembra de porrón pardo permanece aquerenciada en el mismo lugar donde se la puede observar acompañada de hasta cinco aves híbridas, tres machos y dos hembras (J. Pérez-Contreras). Un macho en el embalse de Ullibarri-Gamboa, Álava, el 18 de diciembre de 2014 (I. Sarabia). Dos ejemplares en la laguna de Las Cañas, Navarra, del 13 al 18 de octubre de 2014 y de nuevo el 1 de marzo de 2015 (R. Rodríguez, J. L. Pacheco, J. A. Ucha y H. García). Un macho en la laguna de Lor, Cascante, Navarra, el 5 de noviembre de 2014 (D. Villana). Una hembra adulta en la laguna de Pitillas, Navarra, el 17 de enero de 2015 (J. M. Lekuona). Un macho adulto en el embalse de Valdemudarra, Valladolid, del 2 al 15 de octubre de 2014 (J. M. Lorenzo). Un macho en la laguna de Pedraja de Portijo, Valladolid, los días 14 y 15 de octubre de 2014 (P. López). En Ciudad Real en 2015, una hembra en la laguna de Caracuel de Calatrava el 2 de enero (R. Gosálvez); máximo 17 ejemplares en el embalse de El Vicario, el 31 de enero de 2015 (X. Piñeiro); entre uno y siete ejemplares en la laguna de Navaseca, Daimiel, del 10 de noviembre de 2014 al 21 de febrero de 2015 y máximo de siete adultos el 29 de diciembre (X. Piñeiro y J. V. Oropesa). Un juvenil en Hellín, Albacete, el 14 de noviembre de 2014 (J. A. Cañizares). Una hembra en la depuradora de La Roda, Albacete, el 5 de diciembre de 2014 (J. A. Cañizares). Cuatro ejemplares en la EDAR de Alhama de Murcia, Murcia, el 19 de octubre de 2014 (T. García Rubio, J. M. Zamora y A. Zamora). Una hembra en Moheda Alta, Navalvillar de Pela, Badajoz, del 30 de octubre al 7 de diciembre de 2014 (M. Kelsey, J. M. Herranz y otros). En Cáceres: en la gravera La Atalaya, Aldea del Cano, presencia desde el 13 de octubre de 2014 al 24 de febrero de 2015, con un máximo de dos parejas el 4 de noviembre (J. Solana, S. Molano, S. Mayordomo, C. Clemente y otros); un macho en el embalse de Alcollarín el 30 de diciembre de 2014 (F. Montaña); dos hembras en el embalse de Arrocampo el 10 de

enero de 2015 (D. Langlois, S. Langlois, J. Briz, V. Risco, M. García y otros); nueve ejemplares en la Charca de Los Calles, Toril, el 17 de enero de 2015 (S. Mayordomo); uno en el embalse de Valdecañas el 28 de enero de 2015 (R. Montero y F. Bernáldez). En Cádiz, un macho en la laguna de Juncosa, Puerto de Santa María, el 27 de enero de 2015 (A. Povedano) y seis ejemplares en la laguna de La Paja, Chiclana de la Frontera, el 13 de febrero de 2015 (J. C. Marín). Un ejemplar híbrido con porrón europeo en el embalse de La Pedrera, Torremendo, Alicante, el 8 de marzo de 2015 (C. Requena, P. Perales, T. García, M. Fernández, S. Carrasco y T. García).

PORRÓN MOÑUDO

Aythya fuligula

En Murcia, donde es raro, uno en la EDAR de Cabezo Beaza, Cartagena, Murcia, el 16 de diciembre de 2014 (A. Fernández Caro, D. Zamora, A. Sansano y T. García Rubio).

Canarias. En La Palma, dos aves en una charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, desde el 8 de noviembre de 2014 hasta el 10 de febrero de 2015 (R. Burton).

PORRÓN BASTARDO

Aythya marila

Una hembra en el embalse de Ullibarri-Gamboa, Álava, del 27 de diciembre de 2014 al 30 de marzo de 2015 (I. Gutiérrez). Un ejemplar de primer invierno en la marisma Blanca, Santander, Cantabria, el 8 de enero de 2015 (I. Gutiérrez). Una hembra en la depuradora de Medina de Rioseco, Valladolid, el 14 de enero de 2015 (C. Pérez). Un macho adulto en la laguna de Pitillas, Navarra, el 17 de enero de 2015 (J. M. Lekuona). Un macho de primer invierno en Medina del Campo, Valladolid, el 11 de febrero de 2015 (J. M. Lorenzo). Un macho en el embalse de Pedrezuela, Madrid, del 8 de marzo al 6 de abril de 2015 (R. Fernández).

PATO HAVELDA

Clangula hyemalis

Una hembra o juvenil en Poio, Pontevedra, del 18 de diciembre de 2014 al 11 de enero de 2015

(E. Martínez Sabaris, M. Gálvez y F. Bernáldez). Un macho adulto en Rianxo, A Coruña, el 11 de enero de 2015 (M. Gálvez y F. Bernáldez). Un macho en Cangas de Morrazo, Pontevedra, del 5 al 23 de marzo de 2015 (J. L. Lorenzo). Una hembra en Veta la Palma, Puebla del Río, Sevilla, el 13 de marzo de 2015 (A. Pastoriza).

NEGRÓN ESPECULADO

Melanitta fusca

Un macho en O Grove, Pontevedra, del 17 de diciembre de 2014 al 5 de enero de 2015 (C. D. Romai). Dos individuos en El Abra, Getxo, Vizcaya, el 31 de diciembre de 2014 y el 1 de enero de 2015 (J. Elorriaga y L. López-Areal). Tres ejemplares en Migrán, Pontevedra, el 9 de enero de 2015 (A. Martínez Pernas).

PORRÓN OSCULADO

Bucephala clangula

Un individuo en la balsa de Zolina, Navarra, el 16 de marzo de 2015 (E. Salvatierra).

MALVASÍA CANELA

Oxyura jamaicensis

Un macho en la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 20 de febrero de 2015; después se desplaza a la laguna de Campillos, Málaga, siendo abatido en abril de 2015 en el embalse de El Vicario, Ciudad Real (E. Torres Esquivias).

MALVASÍA CABECIBLANCA

Oxyura leucocephala

Censo en España, diciembre de 2014: se cuentan 1.724 ejemplares; los datos de diciembre de años anteriores son 2.175 aves en 2013, 2.081 en 2012, 1.960 en 2011 y 4.486 en 2000, que es el máximo registro obtenido (E. Torres Esquivias). Una hembra o juvenil en la laguna de Las Cañas, Navarra, del 12 al 18 de octubre de 2014 (J. L. Pacheco y J. M. Domínguez). Primer registro en la provincia de Cáceres: dos hembras jóvenes en el embalse de Alcollarín, Cáceres, el 18 de noviembre de 2014; un ejemplar permanece al menos hasta el 27 de noviembre (M. Kelsey, S. Daly, R. Montero, M. Viskens y otros).

COLIMBO CHICO

Gavia stellata

Un juvenil en Isla Cristina, Huelva, el 24 de octubre de 2014 (J. M. Méndez). Un juvenil en el Espigón Juan Carlos I, Huelva, el 1 de diciembre de 2014 (J. M. Méndez). Un ejemplar en el embalse de La Sotonera, Huesca, el 20 de enero de 2015 (J. C. Albero).

COLIMBO ÁRTICO

Gavia arctica

Un ejemplar en las salinas del cabo de Gata, Almería, el 9 de enero de 2015 (Á. Díaz Pastor y M. Llorente).

COLIMBO GRANDE

Gavia immer

Un ejemplar en Nerja, Málaga, el 9 de diciembre de 2014 (P. Van Franeken). Dos ejemplares en el embalse del Ebro, Burgos, del 9 al 17 de enero de 2015; uno continúa el 24 de enero (J. Morala). Dos ejemplares en Las Amoladeras, cabo de Gata, Almería, del 15 de enero al 4 de marzo de 2015 (R. Martín).

ZAMPULLÍN CUELLIRROJO

Podiceps auritus

Uno en Ortigueira, A Coruña, del 31 de octubre al 25 de noviembre de 2014 (R. Hevia y E. Matheu). Un ejemplar en Trabucador, delta del Ebro, Tarragona, del 30 de diciembre de 2014 al 2 de marzo de 2015 (T. Küppel y C. Oliver). Uno en la ría del Eo, Castropol, Asturias, el 7 de febrero de 2015 (M. Martínez López).

ZAMPULLÍN CUELLINEGRO

Podiceps nigricollis

Canarias. Continúan las citas invernales. En las salinas de Janubio, Yaiza, el número de aves señalado previamente (*Ardeola*, 61: 441) aumenta a 32 ejemplares a partir del 26 de octubre de 2014, permaneciendo en el lugar hasta el 28 de febrero de 2015 (F. J. García Vargas). En Tenerife, continúa el ejemplar mencionado en la balsa de La Tabona, La Guancha (*Ardeola*, 61: 441),

viéndose entre el 6 de octubre de 2014 y el 2 de marzo de 2015 (D. Trujillo).

PARDELA CENICIENTA
Calonectris diomedea

Durante el paso postnupcial de 2013 se estiman 475.000 ejemplares desde la punta de Desnarigado, Ceuta (SEO-Ceuta; López Rodríguez, 2014).

PARDELA SOMBRÍA
Puffinus griseus

Un grupo de al menos 15 aves descansando y realizando cortos vuelos en la playa del Espigón Juan Carlos I, frente a Punta Umbría, Huelva, el 3 de enero de 2015 (J. Pérez-Contreras, A. Barragán, Ó. Rodríguez y B. Pérez Machado).

PAÍÑO DE MADEIRA
Oceanodroma castro

Canarias. En Fuerteventura, en aguas al sur de la península de Jandía, el 21 de septiembre de 2014 se observa un ejemplar próximo a la localidad de la Punta y a menos de 6 millas de la costa (M. Cabrera, M. Carrillo, E. Alcántara, M. J. Jiménez y P. Hernández).

ALCATRAZ ATLÁNTICO
Morus bassanus

Canarias. En los islotes del archipiélago Chinijo, al norte de Lanzarote, un ejemplar exhausto recogido en La Graciosa el 26 de noviembre de 2014 (J. Espinel-Centro Isla de La Graciosa, OAPN), así como un adulto en aguas entre el islote de Alegranza y Montaña Clara volando en dirección norte el 12 de febrero de 2015 (D. Trujillo). En Gran Canaria, entre 100-200 m mar adentro frente a los acantilados marinos de Peñón Bermejo, La Aldea de San Nicolás, se observa un juvenil el 13 de abril, aunque al parecer está en el lugar desde al menos el 11 de abril de 2015 (D. Trujillo y E. Navarro). En El Hierro, cerca de Cueva Honda, La Frontera, se observa un adulto pescando en el mar a principios de noviembre de 2014 (S. Padrón, comunicado por D. Trujillo). En La Palma, uno en aguas costeras al oeste de la isla el 2 de octubre de 2014 (T. Brereton), y otro pescan-




Alcatraz atlántico *Morus bassanus*. La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria). Foto: Domingo Trujillo.

do entre pardelas cenicientas en aguas frente a Los Cancajos, Breña Baja, el 3 de marzo de 2015 (A. Broen).

CORMORÁN GRANDE
Phalacrocorax carbo

Tres nidos ocupados en la cola del embalse de Bornos, Cádiz, el 31 de marzo de 2015 (J. Pérez-Contreras y B. Pérez Machado).

Canarias. En Fuerteventura, dos ejemplares en vuelo a menos de un kilómetro de la costa por



Cormorán grande *Phalacrocorax carbo*. Alajeró (La Gomera). Foto: Domingo Trujillo.

El Vachuelo, Tuineje, el 8 de noviembre de 2014 (M. Cabrera). En Gran Canaria, un adulto en vuelo sobre el mar cerca de acantilados marinos de Güigüi, La Aldea de San Nicolás, el 1 de abril de 2015, aunque según información local lleva avistándose al menos desde dos meses antes y descansa habitualmente en acantilados marinos de El Descojonado (D. Trujillo, E. Navarro y I. Nogales). En La Gomera, en acantilados marinos de punta de Erese, Alajeró, un ejemplar juvenil el 21 de marzo de 2015 (D. Trujillo). En La Palma, segunda cita, uno observado desde la costa de Fuencaliente volando a baja altura sobre el mar el 12 de marzo de 2015 (T. Revill).

AVETORO COMÚN

Botaurus stellaris

Un ejemplar en la Gravera de Viñuelas, Galisteo, Cáceres, el 6 de marzo de 2015 (S. Mayordomo). Un ejemplar en el embalse de Arrocampo, Cáceres, los días 8 y 23 de marzo de 2015 (S. Mayordomo, E. Palacio, P. de la Nava y otros).

AVETORILLO COMÚN

Ixobrychus minutus

Un macho, en un dormidero de garcilla bueyera y grajilla, en el viejo molino de Orihuela, en el río, Murcia, el 6 de diciembre de 2014 (T. Coll, M. Más y T. García).

Canarias. En Tenerife, en charca de riego entre Valle de Guerra y Tejina, una hembra en varias fechas invernales, en concreto entre el 6 de diciembre de 2014 y el 18 de enero de 2015 (R. Fernández Febles). El Hierro, cuarta cita, un macho adulto exhausto se recoge el 1 de abril de 2015 en las proximidades de montaña de Tejeguete, La Frontera, y al ser recuperado se libera al día siguiente entre la vegetación adyacente a la balsa de Frontera (D. Trujillo y S. Padrón).

MARTINETE COMÚN

Nycticorax nycticorax

Uno en un dormidero de garcilla bueyera y grajilla, en el viejo molino de Orihuela, en el río, Murcia, el 6 de diciembre de 2014 (T. Coll, M. Más y T. García).



Martinete común *Nycticorax nycticorax*. Tías (Lanzarote). Foto: Francisco Javier García Vargas.

Canarias. En Lanzarote, cinco aves en las salinas de Janubio, Yaiza, el 28 de marzo de 2015, y en Puerto del Carmen, Tías, tres aves el 1 de abril de 2015 (F. J. García Vargas) y una el 2 de abril (F. J. García Vargas y J. Sagardía) y el 7 de abril de 2015 (F. J. García Vargas), así como un ejemplar en Tegui Golf el 12 de abril de 2015 (F. J. García Vargas y J. Rodríguez Martínez). En Tenerife, dos ejemplares, al menos uno de ellos inmaduro, vistos durante la noche del 7 de noviembre de 2014 en la charca cercana a los campos de golf de San Miguel (D. Trujillo, R. Barone y V. R. Cerdeña). En dicho lugar ya se habían visto ejemplares de diferentes edades (*Ardeola*, 61: 442). En El Hierro, en Agua Nueva, La Frontera, se recoge un ejemplar juvenil exhausto que tras permanecer unas horas en cautividad en casa de un particular se escapa y emprende vuelo sin dificultad el 12 de marzo de 2015 (D. Trujillo y S. Padrón).

GARCILLA CANGREJERA

Ardeola ralloides

Un ejemplar en el Parque Natural de El Hondo, Alicante, el 14 de diciembre de 2014 (I. Sánchez Peñalver, I. Bartolomé, J. Palacios y T. García Rubio).

Canarias. En Gran Canaria, en la Charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, un ejemplar juvenil el 1 de febrero de 2015 (B. Rodríguez y N. Carrasco) y de nuevo en el mismo sitio el 6 de marzo de 2015 (D. Trujillo) y otra vez el 29



Garcilla cangrejera *Ardeola ralloides*. Parque Natural de El Hondo (Murcia). Foto: Isidro Bartolomé.

de marzo de 2015 (J. A. Lorenzo). En La Palma, en una charca de riego en La Costa, Tazacorte, un ejemplar del 13 al 31 de enero de 2015 (R. Burton).

GARCILLA BUEYERA *Bubulcus ibis*

Canarias. En El Hierro, en estanques de riego de la zona baja de Frontera, tres aves el 7 de noviembre de 2014 y una el 28 de diciembre de 2014 (D. Trujillo). En La Palma, dos aves entre garcetas comunes en una charca de riego en La Costa, Tazacorte, el 13 de enero de 2015 (R. Burton).

GARCETA GRANDE *Egretta alba*

En Segovia, donde hay pocos registros: un ave en la cola del embalse de Linares del Arroyo, Made-ruelo, el 3 de septiembre de 2014 (J. A. Fargallo, I. López-Rull y D. Daversa) y un ejemplar en el embalse de Serones, río Voltoya, Urraca Miguel, el 20 de noviembre de 2014 (Juan A. Fargallo). Se cuentan 20 ejemplares entrando al dormitorio del embalse de Arrocampo, Cáceres, el 22 de octubre de 2014 (J. L. Bautista). Mayor concentración en Extremadura: 68 ejemplares entran al dormitorio de Valverde de Mérida, Badajoz, el 27 de octubre de 2014 (J. Guerra). Un ejemplar en el embalse de Alarcón, Valverde del Júcar, Cuenca, el 13 de diciembre de 2014 (S. O. Pinedo).

GARZA REAL *Ardea cinerea*

En 2014, en el embalse de Linares, Segovia, 14 nidos localizados, al menos 11 con éxito, y un mínimo de 25 pollos volados de 27 nacidos, aunque es posible que alguno de los más tempranos pasara desapercibido. Las garzas criaron aquí por primera vez en 2003, y en 2013 volaron 26 pollos (F. J. Fernández y Fernández-Arroyo).

GARZA IMPERIAL *Ardea purpurea*

Canarias. En Lanzarote, un ave en Puerto del Carmen, Tías, el 1 de abril de 2015 (F. J. García Vargas) y un ave en Costa Tegui-se el 12 de abril de 2015 (J. Rodríguez Martínez y F. J. García Vargas). En Tenerife, en charcas de riego de Bajamar, La Laguna, una el 15 de marzo de 2015 (J. C. de la Paz), vista también el 29 de marzo así como el 2 y el 12 de abril de 2015, aunque el 2 de abril hay otro ejemplar en otra charca de la zona, y al atardecer del 12 de abril de 2015 se cuentan cuatro aves juntas acudiendo a un dormitorio con otras especies de garzas (R. Fernández Febles). En el suroeste de la isla, un ejemplar en compañía de una garza real y un martinete en una pequeña presa en Armeñime, Adeje, el 9 de abril de 2015 (D. Trujillo). En La Palma, un ejemplar en una charca de riego en La Costa, Tazacorte, el 31 de marzo de 2015 (R. Burton).

CIGÜENA NEGRA*Ciconia nigra*

Censo de la provincia de Jaén en 2013-2014: ocho parejas seguras y dos posibles, y una productividad de 1,5 pollos/nido (Francisco J. / Martín-Iberus Birding). Censo en Extremadura, año 2014: se censan 197 parejas reproductoras, 79 en Badajoz y 118 en Cáceres; vuelan 322 pollos, 90 en Badajoz y 232 en Cáceres (GobEX-Gpex). Durante el paso posnupcial de 2014 se cuentan 3.203 ejemplares en Tarifa, Cádiz (Migres).

CIGÜENA BLANCA*Ciconia ciconia*

Durante el paso posnupcial de 2014 se cuentan 66.764 ejemplares en Tarifa, Cádiz (Migres).

Canarias. En Lanzarote, un ave sobrevolando el aeropuerto de Guacimeta, San Bartolomé, el 4 de abril de 2015 (F. J. García Vargas). En Fuerteventura, dos aves en el campo de golf en Caleta de Fuste, Antigua, el 21 de junio de 2014 (N. García), seguramente las mismas dos aves vistas a poca distancia posadas en apoyos de tendidos eléctricos en las Salinas del Carmen, Antigua, el 26 de junio de 2014 (M. Cabrera). Con posterioridad en esta isla, un ejemplar en el Vertedero Insular, Puerto del Rosario, el 2 de octubre de 2014 y de nuevo el 17 de abril de 2015 (R. Cerdaña). En Tenerife, en zona agrícola de Los Príncipes, Los Realejos, se observa un ejemplar en vuelo el 11 de febrero de 2015 (D. Trujillo).

IBIS SAGRADO*Threskiornis aethiopicus*

Un ejemplar en Madrid-Río, Madrid, el 21 de diciembre de 2014 (M. Martínez López).

MORITO COMÚN*Plegadis falcinellus*

Segunda localidad con reproducción segura en Extremadura: en junio y julio de 2014 se confirma la presencia de un mínimo de cuatro nidos y siete pollos volantones en la colonia mixta de ardeidas, cigüeña blanca y espátula de la Isla del Prado, embalse de Montijo, Mérida (C. González Villalba).

En el azud del Guadiana, Badajoz, 43 aves el 25 de octubre de 2014 (J. C. Paniagua) y 42 el 2 de diciembre de 2014 (E. Cositllo).

IBIS EREMITA*Geronticus eremita*

Censo en 2014 en Andalucía: en la comarca de La Janda, Cádiz, se censan 24 parejas reproductoras, tres más que en 2013 (CMAOT-Junta de Andalucía).

ESPÁTULA COMÚN*Platalea leucorodia*

En el censo en paso posnupcial del año 2014 en el Corredor La Barrosa-Cabo Roche, Cádiz, se cuentan 11.500 ejemplares (Limes-Platalea). Censo invernal en España en 2014: tomando como fechas centrales los días 13 y 14 de diciembre se censan 2.024 ejemplares en ocho comunidades autónomas, destacando Andalucía con 1.700 aves, Galicia con 233 y Cantabria con 59, el resto de regiones acogen menos de 20 individuos cada una, aunque en Extremadura, donde se suele superar esta cifra, no se realizó censo (Grusec).

FLAMENCO COMÚN*Phoenicopterus roseus*

Total de 18 ejemplares en Moheda Alta, Navavillar de Pela, Badajoz, el 20 de octubre de 2014 (J. Porras). Un ejemplar en vuelo sobre Monfragüe, Cáceres, el 9 de marzo de 2015 (J. Arias). Dos ejemplares en la laguna de Torremejía, Badajoz, del 18 al 29 de marzo de 2015 (J. Guerra y M. Gálvez).

ABEJERO EUROPEO*Pernis apivorus*

Durante el paso posnupcial de 2014 se cuentan 43.625 ejemplares en Tarifa, Cádiz (Migres).

ELANIO COMÚN*Elanus caeruleus*

Un individuo adulto en Artarian, Navarra, el 16 y 17 de marzo de 2015 (J. Murillos y H. Sarasa).

MILANO NEGRO*Milvus migrans*

Durante el paso posnupcial de 2014 se cuentan 79.324 ejemplares en Tarifa, Cádiz (Migres). Un ave junto a milanos reales cerca de dos pequeñas granjas de ganado ovino, Sigüenza, Guadalajara, el 8 de enero de 2014 (S. Pérez Gil).

Canarias. En Lanzarote, un ave en el vertedero de Zonzamas, Teguiise, los días 11 y 12 de diciembre de 2014 (R. Cerdeña). En Gran Canaria, un individuo entre el Lomo del Bicho y Los Giles, Las Palmas de Gran Canaria, el 11 de abril de 2015 (D. Trujillo). En Tenerife, un ejemplar en las proximidades del vertedero del sur de Tenerife, Arico, el 4 de mayo de 2014 (D. Trujillo). En El Hierro, un ejemplar cerca del mirador de las Playas, El Pinar, el 30 de marzo de 2014, y otro ejemplar entre montaña la Caleta y valle del Cabrito, Valverde, el 25 de noviembre de 2014 (D. Trujillo y J. Sánchez). En La Palma, uno en la costa de Tzacorte el 30 de septiembre de 2014 (T. Breton).



Elanio común *Elanus caeruleus*. Artarian, valle de la Valdorva (Navarra). Foto: Haritz Sarasa.

MILANO REAL*Milvus milvus*

Censo de dormitorios en Extremadura, enero de 2015: se cuentan 5.688 ejemplares (GobEX-Gpex). Censo de reproductores en Andalucía en 2014: se localizan 46 parejas reproductoras, 42 en Doñana y cuatro en la Sierra de Aracena (Huelva); de las 42 parejas de Doñana, 27 realizan la puesta, 13 crían con éxito y vuelan 17 pollos (CMAOT-Junta de Andalucía). Censo de dormitorios en Andalucía, enero 2014: se cuentan 1.767 ejemplares; las cifras de años anteriores son 1.849 en diciembre de 2013, 1.474 en enero de 2013, 1.591 en diciembre de 2012, 1.556 en enero de 2012 y 1.964 en diciembre de 2011 (CMAOT-Junta de Andalucía). Censo de dormitorios en Segovia: se cuentan 2.356 ejemplares el 10 de enero de 2015 (SEO-Segovia). Censo de dormitorios en Navarra: se cuentan 1.687 ejemplares y se estiman 1.795 en 19 dormitorios con presencia censados los días 10 y 11 de enero de 2015 (Gorosti).

QUEBRANTAHUESOS*Gypaetus barbatus*

En el año 2014 se censan 136 unidades reproductoras en el Pirineo español; por comunidades autónomas fueron 86 en Aragón, 44 en Cataluña y 6 en Navarra; la productividad global fue de 2,26 pollos volados por territorio (0 en Navarra, 0,24 en Aragón, 0,33 en Cataluña), el 64% de las unidades realizaron la puesta y el éxito reproductor conjunto fue de 0,41 (Magrama).

ALIMOCHE COMÚN*Neophron percnopterus*

A los datos sobre las Hoces del Riaza e inmediaciones, en 2014 que aparecen en *Ardeola*, 61: 445 puede añadirse que los nidos con éxito fueron tres (dos en el Refugio y uno cerca), con seis pollos volados en total, dos en cada nido (F. J. Fernández y Fernández-Arroyo). Durante el paso posnupcial de 2014 se cuentan 1.741 ejemplares en Tarifa, Cádiz (Migres). Censo en Andalucía en 2014: se censan 23 parejas reproductoras repartidas por Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén; son dos parejas menos que en 2013, que-



Alimoche común *Neophron percnopterus*. Dormidero de alimoche y buitre leonado (Cáceres). Foto: Javier Prieta.

dando muy por debajo de las 41 parejas del año 2003 (CMAOT-Junta de Andalucía). Censo en Extremadura, año 2014: 153 parejas reproductoras, 33 en Badajoz y 120 en Cáceres (GobEX-Gpex). Se censan 17 parejas en la Comunidad Valenciana en el año 2014; excepto una pareja en la provincia de Valencia, el resto se ubican en Castellón (Generalitat Valenciana). En el año 2014 se censan 19 territorios ocupados y 14 parejas nidificantes en la provincia de Vizcaya (Icarus y Diputación Foral de Vizcaya). En 2014-2015 se continúa con el seguimiento de la población invernante en el centro-este de la provincia de Cáceres; se localizan cuatro dormideros, el principal alcanza un máximo de 55 aves; el 28 de diciembre de 2014 se realiza un censo de tres de esos cuatro dormideros con un resultado de 67 alimoches contados y 75 estimados (M. Rodríguez, Á. Rodríguez, S. Mayordomo, C. Clemente y J. Prieta).

BUITRE LEONADO

Gyps fulvus

Censo en Andalucía en 2014: se censan 3.400 parejas, un 13% más que en 2008, cuando hubo unas 3.000 parejas (CMAOT-Junta de Andalucía). Censo de reproductores en 2014 en las Hoces del

Riaza, Segovia: vuelan un total de 295 pollos en la colonia, más cinco en zonas cercanas. Se trata de la cifra más alta en los 40 años de seguimiento, muy por encima del máximo anterior de 226 pollos volados en 2006 (F. J. Fernández). Censo otoñal 2014 en las Hoces del Riaza, Segovia: el 9 de noviembre de 2014 se cuentan 1.212-1.215 ejemplares (J. J. Molina y 73 colaboradores más / Fondo para el Refugio de las Hoces del Río Riaza).

BUITRE NEGRO

Aegypius monachus

Censo en 2014 en Andalucía: 325 parejas reproductoras y 180 pollos volados; repartidas por las colonias de Sierra Pelada (107 parejas), Sierra Norte de Sevilla (93 parejas), Sierra de Andújar (72 parejas), Hornachuelos (53 parejas); los censos anteriores fueron de 210 parejas en 2002, 318 parejas y 187 pollos en 2012 y 330 parejas en 2013 (CMAOT-Junta de Andalucía). Censo en Extremadura, año 2014: 919 parejas reproductoras, 98 en Badajoz y 821 en Cáceres; volando 578 pollos, 56 en Badajoz y 522 en Cáceres; las mayores colonias se localizan en Monfragüe, con 330 parejas, y en la Sierra de San Pedro, con 325 (GobEX-Gpex).

CULEBRERA EUROPEA*Circus gallicus*

Durante el paso posnupcial de 2014 se cuentan 15.801 ejemplares en Tarifa, Cádiz (Migres).

AGUILUCHO LAGUNERO OCCIDENTAL*Circus aeruginosus*

Gran dormitorio, quizás el mayor citado en España, con 527 ejemplares contados en Madrigalejo, Cáceres, el 25 de diciembre de 2012 (Naturtrek). **Canarias.** En Lanzarote, un ave a las afueras de Caleta de Famara, Tegui, el 26 de marzo de 2015 (F. J. García Vargas). En Fuerteventura, un macho en El Espinal, Antigua, el 16 de marzo de 2015 (M. Cabrera).

AGUILUCHO CENIZO*Circus pygargus*

Un ejemplar en invierno en Los Baños, Torre Pacheco, Murcia, el 22 de diciembre de 2014 (T. García Rubio).

AZOR COMÚN*Accipiter gentilis*

En Murcia, donde es muy escaso, un ejemplar en Revolcadores, Murcia, el 1 de marzo de 2015 (F. García, T. García, J. A. Barba e I. Cava).

ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA*Aquila adalberti*

Tras la observación continuada durante los últimos años de juveniles y subadultos, se confirma la reproducción de una pareja formada por una hembra adulta y macho damero (tercer año) en el valle del Guadalquivir, en plena campiña olivera de la provincia de Jaén, que saca adelante dos pollos (Iberus Birding-SIECE-Grupo anillamiento Erithacus Sur). En el año 2012 se censan 22 parejas en la provincia de Segovia, 20 inician la reproducción, 15 la completan con éxito, volando 31 pollos; es un claro aumento en relación a las nueve parejas conocidas en el año 1999 (Junta de Castilla y León). Censo en Extremadura, año 2014: 48 parejas reproductoras, 20 en Badajoz y 28 en Cáceres, volando 48 pollos, 27 en Badajoz

y 21 en Cáceres (GobEX-Gpex). Censo en Andalucía, año 2014: se censan 95 parejas reproductoras, nacen 120 pollos y vuelan 105 (CMAOT-Junta de Andalucía). Un ejemplar de segundo año en Calasparra, Murcia, el 28 de febrero de 2015, posteriormente avistado en Cehegín (T. García Rubio, F. A. García, Á. Palacios, A. Zamora, J. M. Zamora y D. Hortelano).

ÁGUILA REAL*Aquila chrysaetos*

Censo en Extremadura, año 2014: 104 parejas reproductoras, 58 en Badajoz y 46 en Cáceres (GobEX-Gpex). Censo en Andalucía, año 2014: 342 parejas reproductoras, hay dos grandes núcleos en Sierra Morena y en el Sistema Bético; los censos anteriores fueron de 193 parejas en 1990, 290 parejas en 2005 y 323 parejas en 2008 (CMAOT-Junta de Andalucía).

ÁGUILA CALZADA*Aquila pennata*

Durante el paso posnupcial de 2014 se cuentan 29.999 ejemplares en Tarifa, Cádiz (Migres). Observaciones en invierno: dos aves en la ciudad de Segovia el 30 de noviembre de 2014 (M. A. García Grande); un ejemplar en San Sebastián, Guipúzcoa, presentes desde agosto de 2014 a febrero de 2015 y conocido individualmente debido a su patrón alar característico; observado en zonas urbanas, acudiendo a cazar con frecuencia al Monte Urgull y se le ve cazar una gaviota reidora (H. González y J. R. Otamendi). Un ejemplar sobrevolando Sevilla capital el 20 de diciembre de 2014 (M. Cuadrado).

Canarias. En Fuerteventura, una en vuelo sobre el Cercado del Jarde, Antigua, el 7 de enero de 2015 (M. Cabrera y J. van Laarhoven). En La Palma, una de morfo claro sobrevolando el risco de la Concepción, Santa Cruz de La Palma, el 28 de noviembre de 2014 (A. Moore).

ÁGUILA PERDICERA*Aquila fasciata*

Un ejemplar, de nombre Zahara, liberado en Madrid en el año 2014 se desplaza hasta Mauritania (Grefa). Censo en Extremadura, año 2014: 95

parejas reproductoras, 53 en Badajoz y 42 en Cáceres, de 78 nidos controlados, 60 tienen éxito, volando 92 pollos, 57 en Badajoz y 35 en Cáceres (GobEX-Gpex).

ÁGUILA PESCADORA

Pandion haliaetus

Canarias. Ejemplar hallado muerto entre los restos de la marea en Caleta Caballo, en La Graciosa, Tegui, el 24 de marzo de 2015 (J. Espinel, Centro Isla de La Graciosa, OAPN).

CERNÍCALO PRIMILLA

Falco naumanni

Censo en la Comunidad de Madrid, año 2014: 305 parejas reproductoras en 32 colonias, 7 de ellas en primillares artificiales; la mayor colonia se localiza en Torrejón de Velasco, con 40 parejas (CMAOT- Comunidad de Madrid).

Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar macho adulto en las inmediaciones de Villaverde, La Oliva, el 25 de febrero de 2015 (B. Rodríguez). En Tenerife, al menos dos machos –un adulto y un inmaduro– en el aeropuerto de Los Rodeos, La Laguna, los días 9 y 12 de abril de 2015, mientras que el 13 de abril se confirma que hay tres machos –dos adultos y un inmaduro– y al menos una hembra; por lo menos uno de los machos adultos y el macho inmaduro permanecían en la zona los días 16 y 20 de abril, y el 22 de ese mismo mes



Cernícalo primilla *Falco naumanni*. La Laguna (Tenerife). Rubén Barone.

se vieron de nuevo dos machos adultos (V. R. Cerdeña, R. Larsson, J. Vizcaíno, M. Fernández del Castillo, R. Barone y B. Rodríguez).

HALCÓN DE ELEONORA

Falco eleonorae

Un individuo reclama insistentemente sobre pinos de laricio en Fuente Acero, Jaén, el 4 y 5 de agosto de 2014 (F. J. Martín Barranco-Iberus Birding). Nueve ejemplares sobrevuelan una zona de huertas en las proximidades de Talavera de la Reina, Toledo, el 30 de agosto de 2014 (A. Casaux y E. Casaux).

POLLUELA PINTOJA

Porzana porzana

Canarias. En Tenerife, en una charca de riego de Bajamar, La Laguna, un ejemplar los días 15, 17, 19 y 26 de marzo, así como de nuevo el 3 de abril de 2015 (R. Fernández Febles).

POLLUELA BASTARDA

Porzana parva

Dos machos descubiertos el 22 de marzo de 2015 en la laguna Soto de las Juntas, Rivas-Vaciamadrid (J. Ruiz Rodrigo), y hasta tres machos el 29 de marzo (G. Lorenzo y R. Almenilla); hay numerosas observaciones de 1-2 machos hasta el 11 de abril (A. D. Pérez, R. Quejido y



Polluela bastarda *Porzana parva*. Soto de las Juntas (Rivas Vaciamadrid). Foto: Blas Molina.

otros). También en este mismo lugar una hembra el 28 de marzo (B. Molina) y que se vuelve a ver en el mismo sitio el 12 abril (B. Molina y M. Juan). Un macho en el río Guadiana, La Zarza, Badajoz, del 10 de marzo al 1 de abril de 2015 (M. Gálvez y J. Guerra). Una hembra en la Charca Suárez, Motril, Granada, el 21 de marzo de 2015 (J. F. Jiménez, M. Sevilla y S. Martín). Una hembra en la laguna Juncosa, Puerto de Santa María, Cádiz, del 22 de marzo al 4 de abril de 2015 (R. García). Un macho en la laguna Juncosa, Puerto de Santa María, Cádiz, los días 4 y 5 de abril de 2015 (J. Elorriaga).

POLLUELA CHICA

Porzana pusilla

Catorce individuos en El Poblenu del Delta, Tarragona, el 9 de octubre de 2014 (D. Bigas). Un ejemplar en el embalse del Atarja, Medina de las Torres, Badajoz, del 15 al 17 de marzo de 2015 (A. Núñez, V. de Alba, F. Montaña, J. Guerra y otros).

GALLINETA COMÚN

Gallinula chloropus

Canarias. En Lanzarote, en la presa de Mala, Haría, un adulto nadando entre agrupación de *Nicotiana glauca* que han quedado a medio sumergir el 13 de marzo de 2015 (D. Trujillo).

CALAMÓN COMÚN

Porphyrio porphyrio

Un ejemplar en las lagunas de Villaba de Duero, Burgos, desde noviembre de 2013 hasta el 14 de marzo de 2015 (V. Salvador).

FOCHA MORUNA

Fulica cristata

Un individuo (con collar blanco 276) en la laguna de Caracuel de Calatrava, Ciudad Real, del 22 de noviembre al 8 de diciembre de 2014 (F. Hidalgo). Varias observaciones en Extremadura. En Cáceres, en la Charca del Lugar, Malpartida de Cáceres, se detecta un ejemplar el 15 de octubre de 2014 (G. Scheur y J. Tarrío) que se ve por última vez el 31 de marzo de 2015 (J. L. Pacheco, J. M.

Domínguez y otros); un individuo en el embalse de Alcollarín, del 2 al 26 de enero de 2015 (J. Gómez Aparicio, J. Guerra, M. Gálvez, M. Kelsey y otros) y se observa de nuevo un ejemplar el 2 de marzo (D. Lindo, K. Mullarney, M. Gálvez, M. Kelsey y R. Pop) y otro diferente con collar el día 24 del mismo mes (H. Stewart, J. P. Prieto y S. Stewart). En Badajoz, una en Moheda Alta, Navalvillar de Pela, el 31 de enero de 2015 (E. del Viejo) y una con collar (blanco 0HU), procedente de La Cañada de las Norias, Sevilla, es observado en el embalse de Brovales, el 3 de marzo y el 15 de abril de 2015 (F. Montaña); una en la Charca de Esparragalejo, del 10 al 20 de marzo de 2015 (J. Guerra, M. Gálvez y J. A. Román).

GRULLA COMÚN

Grus grus

Censos de la población invernante en España, temporada 2014-2015: entre los días 19 y 21 de diciembre de 2014 se cuentan 183.302 grullas, 121.748 de ellas en Extremadura, y entre los días 23 y 25 de enero de 2015 se censan 202.034 ejemplares, 132.902 en Extremadura; en ambos censos el área de mayor importancia ha sido la Zona Centro de Extremadura, Badajoz-Cáceres, con 83.982 y 86.109 aves respectivamente (J. A. Román/Grus Extremadura). Durante la migración prenupcial de 2015 a través del Pirineo se cuentan 248.185 grullas, 190.000 en la provincia de Huesca y 58.185 en la de Navarra; las zonas de sedimentación más



Focha moruna *Fulica cristata*. Charca del Lugar, Malpartida de Cáceres (Cáceres). Foto: Godfried Schreur.

importantes fueron la laguna de Gallocanta, con recuentos máximos de 110.000 aves el 26 de febrero, y el embalse de La Sotonera, con máximo de 82.275 ejemplares el 3 de marzo (Grus-Extremadura y Grupo Oscense de Ornitología).

AVUTARDA COMÚN

Otis tarda

Censo en Andalucía, año 2014: 479 ejemplares en 10 núcleos en las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén; en 2013 se censaron 471 aves (CMAOT).

CIGÜEÑUELA COMÚN

Himantopus himantopus

Canarias. En Gran Canaria, dos ejemplares en charca de riego de Pinto, El Cerrillo, Arucas, el 31 de enero de 2015 (B. Rodríguez). En esta misma isla, en San Bartolomé de Tirajana, dos ejemplares el 11 de septiembre de 2014 y de nuevos dos aves el 20 de marzo de 2015 en una balsa en Juan Grande (A. Delgado), así como una pareja de adultos en la Charca de Maspalomas el 29 de marzo de 2015 (J. A. Lorenzo). En Tenerife, dos aves en la Charca de Bernardino, Granadilla de Abona, y un ave en la presa de Cigüaña Baja, Granadilla de Abona, el 4 de abril de 2015 (R. Cerdeña y F. Cruz Alvarado). En esta misma isla, un macho adulto en el campo de golf de Buenavista del Norte el 7 de abril de 2015 (J. Curbelo y B. Rodríguez).

AVOCETA COMÚN

Recurvirostra avosetta

Canarias. En Lanzarote, tres aves en las salinas de Janubio, Yaiza, el 28 de febrero de 2015, permaneciendo una de ellas en el lugar hasta al menos el 11 de abril de 2015 (F. J. García Vargas).

ALCARAVÁN COMÚN

Burhinus oediconemus

Se cuentan 24-30 aves en el Clot de Galvany, Alicante, entre septiembre a noviembre de 2014 (P. Giner).

Canarias. En El Hierro, el 24 de junio de 2014 en las cercanías de la Cruz de los Reyes, El Pinar,

a 1.353 m de altitud, se localiza un ejemplar incubando dos huevos, lo que supone la cota más alta de nidificación para el conjunto del archipiélago (D. Trujillo y S. Padrón). En La Palma, en el Llano de Las Cuevas, El Paso, un ave los días 10 y 13 de marzo, y dos aves el día 15 de marzo de 2015 (R. Burton).

CHORLITEJO CHICO

Charadrius dubius

Canarias. En La Palma, uno en Las Salinas, Fuencaliente, los días 5 y 12 de marzo (T. Revill), y de nuevo el 13 de marzo de 2015 (R. Burton).

CHORLITEJO PATINEGRO

Charadrius alexandrinus

Presencia invernal en diversos arrozales del norte de Badajoz (Palazuelo, Puebla de Alcollarín, Guadiana del Caudillo, etc.), siendo el grupo mayor visto de 80 aves en Palazuelo los días 1 de noviembre y 12 de diciembre de 2014 (S. Mayordomo, C. Clemente, E. Palacios, M. Kelsey y otros).

Canarias. Interesante observación de un ejemplar anillado visto la tarde del 10 de enero de 2015 en la playa de La Barca, Pájara, en el sur de Fuerteventura, y la mañana del día anterior, 9 de enero de 2015, en las salinas de Janubio, Yaiza, en el suroeste de Lanzarote –ambas localidades distan unos 100 km aproximadamente–, y el ejemplar fue anillado como pollo en la temporada anterior en dicha salinas (G. Tejera, M. Cabrera y J. Lorente). En Gran Canaria, donde se encuentra en peligro de extinción, en la Charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, dos adultos y tres pollos cerca de la desembocadura el 14, 21 y el 28 de marzo de 2015, aunque ese último día además hay un macho adulto aparte en otro sector de la charca, y con posterioridad, el 25 de abril de 2015, siguen en el mismo sitio los dos adultos y los tres pollos ya crecidos (M. A. Suárez).

En Tenerife, donde ha dejado de nidificar en los últimos años, observaciones dentro de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, El Médano, Granadilla de Abona: una hembra en el Llano de Roja el 2 de noviembre de 2014, y otra, o la misma, en los márgenes de La Mareta el 14 de noviembre de 2014 (R. Barone, V. R. Cerdeña y

E. Sacramento). Con posterioridad, también en el sur de la isla, una pareja de adultos en bajíos costeros de Playa Honda, en el litoral de Las Américas, Arona, el 2 de abril de 2015 (R. Jorge Díaz).

CHORLITO CARAMBOLO

Charadrius morinellus

Un juvenil en Cariño, A Coruña, del 1 de noviembre de 2014 al 16 de marzo de 2015 (R. Hevia). Se constata por segundo invierno consecutivo la invernada en La Serena, Badajoz: 20 ejemplares en Campanario el 8 de enero de 2015 (M. Gálvez y J. Guerra) y 21 el 2 de febrero (J. Pérez, J. Portillo, R. Almenilla, A. San Martín y otros). Dos aves en Llerena, Badajoz, el 25 y el 26 de marzo de 2015 (A. Núñez, A. Pavón, F. Montaña y J. Vázquez). Máximo de 155 ejemplares en Bardenas Reales, Navarra, el 5 de octubre de 2014 (G. Deán).

Canarias. En Tenerife, en llanos xéricos cerca de El Fraile, Arona, un ejemplar el 4 de noviembre de 2014 (N. Trujillo, Endemic-foto).

CHORLITO GRIS

Pluvialis squatarola

En Badajoz, tres aves en arrozales de Guadiana del Caudillo el 13 de noviembre de 2014 (M. Gálvez); tres aves en Santa Amalia el 29 de noviembre de 2014 (V. de Alba y A. Núñez); un ejemplar los días 14 y 15 del mismo mes (N. Renwick y S. Mayordomo), así como uno en el embalse de Cuncos, Villanueva del Fresno, el 20 de diciembre de 2014 (F. Montaña y A. Núñez).

CORRELIMOS GORDO

Calidris canutus

Siete ejemplares en arrozales de Palazuelo, Badajoz, el 26 de noviembre de 2014; se observan tres el día 28 (H. Zweers, R. Montero, M. Viskens y J. Torfs).

CORRELIMOS TRIDÁCTILO

Calidris alba

En Badajoz, uno en la Charca de Morantes el 3 y el 5 de octubre de 2014 (F. Lopo y E. del Viejo); uno en los arrozales de Hernán Cortés el 1 de

febrero de 2015 (J. Portillo, J. Pérez y A. San Martín) y uno en la Charca de Esparragalejo el 7 de marzo de 2015 (C. Clemente).

CORRELIMOS ZARAPITÍN

Calidris ferruginea

Canarias. En Lanzarote, grupo de unas 15 aves en las salinas de Janubio, Yaiza, el 28 de marzo de 2015, entre ellas una anillada y con bandera amarilla con código ACJ; tal y como informa el observador fue anillada como pollo en Noruega el 30 de agosto de 2013 (F. J. García Vargas).

CORRELIMOS OSCURO

Calidris maritima

Uno en el puerto de Burriana, Castellón, del 18 de diciembre de 2014 al 17 de enero de 2015 (J. Bort y J. L. Bort). Cinco ejemplares en los muros del castillo de San Sebastián, Cádiz, el 29 de marzo de 2015 (J. Pérez-Contreras y B. Pérez Machado).

COMBATIENTE

Philomachus pugnax

Canarias. Segunda observación en La Gomera: en la zona alta de San Sebastián de La Gomera, en las proximidades de un desagüe, un macho el 28 de noviembre de 2014 (D. Trujillo).

AGACHADIZA COMÚN

Gallinago gallinago

Como resultado del seguimiento de agachadiza común realizado durante las temporadas de cría de 2010 a 2014 en la provincia de Ávila (Sistema Central), aplicando la misma metodología que en el censo de 2009 (Lorenzo y Planelles, 2010) y visitando nuevas zonas con hábitat potencial, se obtuvo un total de 82 parejas/territorios distribuidas en 10 cuadrículas UTM de 10 × 10 km. Las jornadas de seguimiento se realizaron entre el 12 y el 27 de mayo. Se observó un pollo volantón a 1.690 metros de altitud el 18 de mayo de 2010 en la Sierra de Villafranca, San Juan de Gredos, y de forma accidental se localizó un nido con cuatro huevos el 25 de mayo de 2014 a 1.600 metros de altitud en un prado cercado en la Sierra de la Paramera, Navalacruz (M. Lorenzo y P. Planelles).

Canarias. En El Hierro, dos ejemplares en estanques de riego de la zona baja de Frontera el 7 de noviembre de 2014 (D. Trujillo).

CHOCHA PERDIZ

Scolopax rusticola

Un individuo en un pinar en Torre Pacheco, Murcia, el 7 de diciembre de 2014 (J. M. Zamora y M. León). Dos aves en el El Arquillo, Torre Pacheco, Murcia, el 7 de marzo de 2015 (J. Palacios y T. García Rubio).

AGUJA COLINEGRA

Limosa limosa

Canarias. En Lanzarote, cuatro aves en las salinas de Janubio, Yaiza, el 28 de febrero de 2015 (F. J. García Vargas). En Gran Canaria, en la Charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, dos ejemplares el 1 de febrero de 2015 (B. Rodríguez y N. Carrasco) y uno el 6 de marzo de 2015 (D. Trujillo) y de nuevo el 29 de marzo de 2015 (J. A. Lorenzo). En Tenerife, un ejemplar anillado observado en la Charca de Bernardino, Granadilla de Abona, el 27 marzo de 2015; tal y como informan los observadores, el ejemplar fue anillado como pollo en Holanda el 23 de mayo de 2012 (R. Cerdeña, A. Acedo, N. Trujillo y F. Cruz Alvarado).

AGUJA COLIPINTA

Limosa lapponica

Un ejemplar en la laguna de las Quemadas, Córdoba, del 1 al 3 de mayo de 2013 (D. Peinazo).

Canarias. En Tenerife, en una pequeña charca cerca de la urbanización La Maretita, Granadilla de Abona, un ejemplar el 2 de noviembre de 2014 (R. Barone y V. R. Cerdeña), y posiblemente el mismo el 11 y el 18 de noviembre de 2014 (R. Fernández Febles).

ZARAPITO TRINADOR

Numenius phaeopus

Se cuentan 43 aves, en varios grupos en dirección oeste, en el cabo de Palos, Murcia, el 11 de abril de 2015 (J. Palacios y T. García Rubio).

Canarias. En Tenerife, grupo de 15 aves descansando en la costa de Los Abrigos, San Miguel de Abona, el 11 de noviembre de 2014 (R. Fernández Febles).

ARCHIBEBE COMÚN

Tringa totanus

Canarias. En La Palma, en las graveras junto al aeropuerto, Villa de Mazo, un ejemplar en plumaje nupcial el 8 de abril de 2015 (D. Trujillo).

ARCHIBEBE FINO

Tringa stagnatilis

Un individuo en el embalse de El Vicario, Ciudad Real, el 19 de octubre de 2014 (M. J. Valencia). Dos ejemplares en la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 28 de enero de 2015 (M. Hayes). Uno en las Tablas de Alarcos, Ciudad Real, el 6 de febrero de 2015 (X. Piñeiro). Uno en Salinas de Bonanza, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, los días 27 y 28 de marzo de 2015 (J. Márquez).

ANDARRÍOS GRANDE

Tringa ochropus

Canarias. En Tenerife, un ejemplar en la presa de Llano Azul, Arona, el 21 de febrero de 2015 (R. Barone y V. R. Cerdeña).



Aguja colipinta *Limosa lapponica*. Granadilla de Abona (Tenerife). Foto: Ramón Fernández Febles.

ANDARRÍOS BASTARDO*Tringa glareola*

Canarias. En Lanzarote, en gaviás de Guatiza, Teguiise, el 13 de marzo de 2015 se observa un ejemplar, y otro en el campo de golf de Tías (D. Trujillo). En esta misma isla, un ejemplar en las salinas de Janubio, Yaiza, el 28 de marzo de 2015 (F. J. García Vargas), y tres ejemplares en el campo de golf de Tías el 31 de marzo de 2015, permaneciendo una de ellas hasta el 3 de abril de 2015 (F. J. García Vargas). En Gran Canaria, el 31 de marzo de 2015 en Calderín Bajo, San Bartolomé de Tirajana, se observa un ejemplar en una pequeña balsa, y el 16 de abril de 2015 en Montaña del Diablo, Agüimes, otro individuo (D. Trujillo). En la Charca de Maspalomas, San Bartolomé, cuatro ejemplares el 29 de marzo de 2015 (J. A. Lorenzo).

VUELVEPIEDRAS COMÚN*Arenaria interpres*

Un ejemplar en Palazuelo, Badajoz, el 4 de diciembre de 2014 (N. Renwick).

FALAROPO PICOGRUESO*Phalaropus fulicarius*

Un total de 131 ejemplares en migración en Castro Urdiales, Cantabria, entre el 10 de octubre y el 17 de noviembre de 2014; máximo de 40 aves el 15 de noviembre (J. Menéndez). Dos aves de primer año en el lago de Costaballena en Rota, Cádiz, del 4 al 7 de noviembre de 2014 (R. García). Un ave de primer invierno en Medina del Campo, Valladolid, el 5 de noviembre de 2011 (J. M. Lorenzo). Tres ejemplares en Tarifa, Cádiz, el 11 de noviembre de 2014 (J. Elorriaga). Un ejemplar en cabo Roche, Conil de la Frontera, Cádiz, el 12 de noviembre de 2014 (J. Sarry). Uno en la laguna del Prado, Pozuelo de Calatrava, Ciudad Real, del 10 de enero al 21 de febrero de 2015 (D. Llorente y R. Gosálvez).

Corrección: Se rechaza, por ser un error, la cita aparecida en *Ardeola*, 61: 453 correspondiente a un ejemplar joven en las salinas de San Pedro del Pinatar, Murcia, 28 de agosto de 2014 (P. Sparkes, R. Howard, T. García, A. Zamora y R. Zamora).

PÁGALO POMARINO*Stercorarius pomarinus*

Un ejemplar de morfo claro en el cabo de Palos en dirección a Cartagena, Murcia, el 11 de abril de 2015 (J. Palacios y T. García Rubio). Un juvenil de morfo oscuro recogido herido en Tudela, Navarra, el 1 de octubre de 2014 (Guardería de Navarra).

PÁGALO PARÁSITO*Stercorarius parasiticus*

Uno de morfo oscuro en el cabo de Palos en dirección a Cartagena, Murcia, el 11 de abril de 2015 (J. Palacios y T. García Rubio).

Canarias. En La Palma, uno en aguas costeras al oeste de la isla el 2 de octubre de 2014 (T. Breton).

PÁGALO GRANDE*Stercorarius skua*

Un ejemplar recogido herido en el Rincón del Soto, La Rioja, el 21 de enero de 2015 (CRFS La Fombera).

GAVIOTA ENANA*Hydrocoloeus minutus*

En el vertedero de Tudela, Navarra, hay observaciones del 8 de diciembre de 2014 al 13 de febre-



Falaropo picogrueso *Phalaropus fulicarius*. Lago de Costaballena en Rota, Cádiz. Foto: Francisco Chiclana.

ro de 2015, con un máximo de siete ejemplares este último día (J. C. Lorenzo, H. Sarasa y J. M. Lekuona). Un ave de primer invierno en el embalse del Vicario, Ciudad Real, del 18 de enero al 6 de febrero de 2015 (X. Piñeiro). Dos aves, un adulto y un primer invierno, en el embalse de Orellana, Badajoz, de modo intermitente entre el 22 de enero y el 6 de abril de 2015; es el segundo invierno seguido con presencia de la especie en la localidad (M. Kelsey, N. Renwick, S. Mayordomo, J. Guerra, M. Gálvez y otros).

GAVIOTA DE SABINE

Xema sabini

Un ave de primer invierno en Cádiz el 28 de noviembre de 2014 (M. Jiménez).

GAVIOTA REIDORA

Chroicocephalus ridibundus

Canarias. En La Palma, en sendas charcas de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, entre 2 y 5 aves del 7 al 29 de noviembre de 2014 (R. Burton). Además, una en una charca de riego en Cabrejas, Tazacorte, el 17 de enero de 2015 (R. Burton).

GAVIOTA DE AUDOUIN

Larus audouinii

Un ave de tercer año en los sotos de Albolafia, Córdoba, el 7 de mayo de 2012 (D. Peinazo).

GAVIOTA DE DELAWARE

Larus delawarensis

Un ave de primer invierno en el puerto de Burriana, Castellón, del 3 de diciembre de 2014 al 7 de enero de 2015 (M. Carregal, J. R. Sánchez, F. Peireiras y J. Bort). En A Coruña: en Cariño, un ave de primer año del 20 al 23 de noviembre de 2014 y un ejemplar de tercer año el 5 de enero de 2015 (R. Hevia); un individuo en O Burgo, Culleredo, del 26 de noviembre de 2014 al 14 de marzo de 2015 (A. Sandoval); un ejemplar en Lires el 2 de enero de 2015 (M. Xestoso), y un ave de primer invierno en Noia el 4 de febrero de 2015 (D. Rodríguez Vieites). En Pontevedra, un ave de primer invierno en Baiona del 23 de noviembre

de 2014 al 2 de abril de 2015 (A. Lomeña y X. Varela) y un adulto en Cambados el 1 de enero de 2015 (X. Piñeiro). Un ave de segundo año en Xove, Lugo, el 8 de marzo de 2015 (P. Gómez, A. Gutiérrez y otros). En Asturias, un adulto en Gijón del 9 de enero al 8 de febrero de 2015 (I. Díaz Pallarés) y un ave de primer invierno en Muros de Nalón del 16 al 22 de febrero de 2015 (M. Quintana). En Cantabria, un ave de tercer año en la ría de Ajo el 24 de febrero de 2015 (G. Rodríguez y M. García Tarrasón) y un ave de segundo año en Santander del 18 al 29 de marzo de 2015 (J. Menéndez y J. Hernández). Un adulto en Getxo, Vizcaya, del 1 al 6 de febrero de 2015 (K. de Dios). Un ave de segundo año en Irún, Guipúzcoa, del 21 de enero al 11 de febrero de 2015 (I. Gutiérrez). Uno de primer invierno en Rota, Cádiz, del 8 de enero al 30 de marzo de 2015 (J. Sarry, A. Colorado y R. García).

GAVIOTA CANA

Larus canus

Un ejemplar en Madrid-Río, río Manzanares, Madrid, el 31 de diciembre de 2014 (J. M. Gálvez Linares y J. M. Gálvez Gil).

GAVIOTA SOMBRÍA

Larus fuscus

Canarias. En La Gomera: en acantilados marinos cercanos a Caleta de Eresito, Alajeró, un adulto junto a varias gaviotas patiamarillas el 10 de octubre de 2014, mientras que entre Cueva de la Lana y Caleta de la Jarrita, Alajeró, se observa nuevamente un adulto junto a dos gaviotas patiamarillas el 21 de marzo de 2015 (D. Trujillo).

GAVIOTA ARGÉNTEA EUROPEA

Larus argentatus

Presencia continua en el vertedero de Tudela, Navarra, entre el 25 de octubre de 2014 y el 31 de marzo de 2015, con aves de todas las edades y un máximo de cinco ejemplares el 2 de diciembre (R. Rodríguez). Cinco observaciones de aves solitarias de primer invierno, segundo invierno y adultos en Madrid-Río, Madrid, entre el 15 de noviembre de 2014 y el 11 de enero de 2015 (M. Martínez López). Un ave de tercer año en el ver-

tedero de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 15 de noviembre de 2014 (G. Martín). Un ave de segundo invierno en el embalse de La Sotonera, Huesca, el 10 de diciembre de 2014 (J. C. Albero). Un ave de primer invierno en Córdoba capital los días 3 y 4 de marzo de 2015 (D. Peinazo). Un adulto en Santa Pola, Alicante, el 21 de marzo de 2015 (J. Marco y A. Ubach).

Canarias. En La Palma, un ejemplar de tercer invierno entre gaviotas patiamarillas en Las Salinas en Fuencaliente el 22 de diciembre de 2014 (R. Burton).

GAVIÓN ATLÁNTICO

Larus marinus

Primeros registros en Salamanca: en el CTRU de Gomezello se observa un ave de cuarto invierno-adulto y un ave de primer invierno los días 7 y 22 de enero de 2015 respectivamente (M. Rodríguez Esteban). Un ejemplar de tercer invierno en Chionona, Cádiz, del 3 al 7 de febrero de 2015 (J. Sarry). Un ejemplar de primer invierno en el vertedero de Colmenar Viejo, Madrid, el 7 de febrero de 2015 (M. Juan y J. M. Ruiz).

FUMAREL CARIBLANCO

Chlidonias hybrida

Cita invernala: un ejemplar en el río Guadiana, Mérida, Badajoz, los días 14 y 20 de enero de 2015 (J. Solana).



Gavión atlántico *Larus marinus*. Un ejemplar de primer invierno. Vertedero de Colmenar Viejo (Madrid). Foto: Miguel Juan.

Canarias. En Lanzarote, un ave en Puerto del Carmen, Tías, moviéndose entre el puerto de la Tiñosa y el campo de golf de Tías entre el 29 de marzo de 2015 y el 3 de abril de 2015, día en el que se observan dos aves en el mencionado campo de golf (F. J. García Vargas).

FUMAREL COMÚN

Chlidonias niger

Se cuentan 110 aves en la balsa de Zolina, Navarra, el 21 de abril de 2015 (H. Sarasa).

FUMAREL ALIBLANCO

Chlidonias leucopterus

Un ejemplar en la laguna de Navaseca, Daimiel, Ciudad Real, el 18 de octubre de 2014 (M. J. Valencia). Un adulto en el embalse de Orellana, Badajoz, al menos entre el 20 de enero y el 28 de febrero de 2015; podría tratarse del mismo ejemplar que invernó la temporada anterior en esta localidad (W. Harworth, J. F. Jiménez, M. Sevilla y otros).

MÉRGULO ATLÁNTICO

Alle alle

Un adulto en Castro Urdiales, Cantabria, los días 25 y 26 de octubre de 2014 (J. Menéndez). Un ejemplar en Hondarribia, Guipúzcoa, los días 15 y 16 de enero de 2015 (I. Guereña).

GANGA ORTEGA

Pterocles orientalis

Tres individuos en Sierra Morena, Aldeaquemada, Jaén, en una zona adhesada, en plena sierra fuera de su hábitat típico (F. J. Martín Barranco-Iberus Birding).

TÓRTOLA SENEGALESA

Streptopelia senegalensis

Canarias. Continúa la expansión por las islas. En Gran Canaria, nueva localidad: en el barranco de Arguineguín, entre Mogán y San Bartolomé de Tirajana, se avista un individuo el 28 marzo de 2015 (D. Trujillo). En Tenerife, en El Espinal, en Tejina, La Laguna, localidad donde se ha citado



Tórtola senegalesa *Streptopelia senegalensis*. San Sebastián de La Gomera (La Gomera). Foto: Domingo Trujillo.



Vencejo pálido *Apus pallidus*. Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria). Foto: Domingo Trujillo.

previamente, una el 9 de marzo de 2015 y dos el 5 de abril de 2015 (R. Fernández Febles). En La Gomera, tercera localidad: en el campo de golf de Tecina, San Sebastián de La Gomera, se observa un adulto el 27 de noviembre de 2014 y tres ejemplares de diversas edades el 20 de marzo de 2015 (D. Trujillo). En El Hierro, tercera localidad: en Timijiraque, Valverde, dos ejemplares el 29 de diciembre de 2014 y posteriormente se observa un adulto el 27 de enero de 2015 (D. Trujillo).

COTORRA DE KRAMER

Psittacula krameri

Tres aves en la plaza de la catedral de Cádiz el 29 de marzo y el 1 de abril de 2015 (J. Pérez-Contreras y B. Pérez Machado).

BÚHO CAMPESTRE

Asio flammeus

Se avistan 25 ejemplares cerca de la laguna de Gallocanta, Teruel, el 14 de noviembre de 2014 (J. A. Sánchez González).

Canarias. En el islote de Alegranza, Tegui, se halla el cadáver de un ejemplar en las proximidades de la casa de El Veril el 12 de febrero de 2015 (D. Trujillo). En El Hierro, se encuentran los restos de un ejemplar muerto cerca de la fuente de Mencáfete, Frontera, el 29 de octubre de 2014 (G. Carrasco).

CHOTACABRAS EUROPEO

Caprimulgus europaeus

Un individuo canta por la noche en Fuente Acero, P. N. Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, Jaén, en pinares de pino laricio, a unos 1.500 m. de altitud el 4 de agosto de 2014 (F. J. Martín-Iberus Birding).

VENCEJO PÁLIDO

Apus pallidus

Un invierno más se constata la invernada de la especie en Alange, Badajoz, con un máximo de 11 ejemplares el 1 de diciembre de 2014 y de 8 aves el 26 de enero de 2015 (J. Solana). Uno en Trujillo, Cáceres, el 24 de diciembre de 2012 (Naturtrek).

Canarias. En Gran Canaria, citas en distintas localidades: el 1 de abril de 2015 se observan cinco aves volando ligadas a acantilados marinos de Güügü Grande, La Aldea de San Nicolás; el 3 de abril de 2014 en Llanos de Botija, Gáldar, se identifica un ejemplar entre vencejos unicolores; el 12 de abril de 2015 en Cabeza del Morro, Las Palmas de Gran Canaria, se detecta un bando de una veintena de ejemplares, llegándose a observar una cópula, y en esa misma fecha en Llano Alegre, Santa María de Guía de Gran Canaria, se observa un ave; el 13 de abril de 2015 se avistan cuatro ejemplares volando cerca del puerto de la Aldea de San Nicolás; y el 17 de abril de 2015 en Lomo del Bicho, Las Palmas de Gran Canaria, se observan dos aves que reclaman en vuelo (D. Trujillo).

VENCEJO REAL

Apus melba

Canarias. En Fuerteventura, nueve aves en Tiscamanita, Tuineje, el 2 de septiembre de 2014 (M. Cabrera). En Gran Canaria, en la cumbre, en el pinar de Bailico, entre Tejeda y Vega de San Mateo, un ejemplar el 16 de agosto de 2014 y dos ejemplares el 17 de agosto de 2014 (A. Delgado).

VENCEJO CAFRE

Apus caffer

Confirmada la reproducción de la especie en Minas de La Carolina, Jaén: se localiza un nido de golondrina daúrica ocupado por este vencejo, con excrementos de pollos y cascarones en el suelo, el 23 de septiembre de 2013 (Francisco J. Martín Barranco-Iberus Birding). Nido ocupado, restos de un pollo depredado en el suelo, en el interior de unas ruinas de un cortijo en el P. N. de Despeñaperros, Jaén, el 1 de agosto de 2014 (F. J. Martín Barranco-Iberus Birding, L. Guerrero, I. Muela y F. M. Camacho).

VENCEJO MORO

Apus affinis

Entre 2 y 5 ejemplares en Rota, Cádiz, del 13 de diciembre de 2014 al 11 de enero de 2015 (R. García, J. Salcedo y otros).

ABEJARUCO EUROPEO

Merops apiaster

Canarias. En Tenerife, uno en La Cumbrilla, Anaga, Tenerife, el 7 de abril de 2015 (J. González).

TORCECUELLO EUROASIÁTICO

Jynx torquilla

Canarias. En Lanzarote, en el campo de golf de Tías, un ave el 31 de marzo de 2015 y dos el 1 de abril de 2015 (F. J. García Vargas y J. Sagardía), así como un ejemplar en la depuradora antigua de Costa Teguiuse el 31 de marzo de 2015 (F. J. García Vargas), y tres aves en Puerto del Carmen el 2 de abril de 2015 (F. J. García Vargas y J. Sagardía). En Fuerteventura, un ejemplar en las inmediaciones de Vallebrón, La Oliva, el 3 de marzo de 2015 (B. Rodríguez y J. J. Hernández). En Tenerife, en campo de golf en San Miguel de Abona, uno el 4 de abril de 2015 (R. Cerdeña y F. Cruz Alvarado).



Vencejo cafre *Apus caffer*. P. N. Despeñaperros (Jaén). Nido primero de golondrina común, después daúrica y finalmente vencejo cafre. Foto: Francisco Martín Barranco.

PICO PICAPINOS*Dendrocopos major*

Canarias. En Tenerife, en Guamasa, La Laguna, en zona rural con huertas y arbolado disperso, un macho visto y escuchado desde mediados de noviembre de 2014 hasta finales de febrero de 2015 (A. Martín).

PICO MENOR*Dendrocopos minor*

Un ave en una chopera del pinar de la Pava, delta del Llobregat, Barcelona, el 4 de octubre de 2014, que corresponde a la primera cita conocida de esta especie para esta llanura deltaica (J. M^a Fontcubierta, M. Jornet, M. San Romà y R. Bastida; Romero, 2004) y vuelve a detectarse el día 9 de octubre en el mismo lugar (X. Larray y F. López). Dos aves en el entorno del Palacio del Acebrón, Parque Nacional de Doñana, Huelva el 29 de diciembre de 2014 y el 1 de enero de 2015 (J. Pérez-Contreras y B. Pérez Machado).

ALONDRA RICOTÍ*Chersophilus duponti*

Un ejemplar en una saladar-erial en el entorno del Mar Menor, Murcia, el 28 de marzo de 2015 (C. Requena y T. García Rubio).

AVIÓN ZAPADOR*Riparia riparia*

Canarias. En Gran Canaria, un ejemplar en vuelo cerca de la autovía en Hoya Alta, Arucas, el 12 de abril de 2015, y otro en vuelo en zona de invernaderos y charcas en Los Espinales, Agüimes, el 16 de abril de 2015 (D. Trujillo).

GOLONDRINA COMÚN*Hirundo rustica*

Un ejemplar en Acehúche, Cáceres, el 18 de diciembre de 2014 (M. Rodríguez).

Canarias. En La Palma, una sobrevolando charcas de riego en La Costa, Tazacorte, el 31 de enero de 2015 (R. Burton), y bando de unos 13

individuos sobrevolando plataneras en la costa de Fuencaliente el 10 de marzo de 2015 (T. Revill).

GOLONDRINA DÁURICA*Cecropis daurica*

Diversas citas de cría en la zona nororiental de la provincia de León: al menos una pareja con pollos voladeros en Vegamediana, el 20 de julio de 2008 (J. L. Robles); un ave forrajeando junto a golondrinas comunes, aviones comunes y vencejos comunes en Fuentes de Peñacorada el 23 de julio de 2011 (J. L. Robles); al menos dos ejemplares en el entorno de puentes de la carretera de circunvalación de Cistierna el 12 de mayo de 2015, y tres ejemplares el día 15 de mayo en el mismo lugar (J. L. Robles); un nido en un túnel del camino vecinal de Santa Olaja de la Varga a Ocejo, el 14 julio de 2013, con al menos un ejemplar volando en desfiladero del Duerna, donde está situado; esta zona es ocupada también en 2014 y, al menos, se observan tres aves, mínimo un joven, el 1 de agosto de 2014 (J. L. Robles). Encontrados tres nidos ya terminados debajo de puentes sobre la carretera en las proximidades de San Feliz de Torío, el 15 de mayo de 2014, desde entonces hasta finales de septiembre del mismo año se observan en varias fechas al menos dos ejemplares volando, y se comprueba entrada de ejemplares a uno de los nidos hasta el 27 de septiembre de 2014 (Á. Hernández Lázaro); nido



Golondrina dáurica *Cecropis daurica*. Proximidades de San Feliz de Torío (León). Foto: Ángel Hernández Lázaro.

en puente sobre el ferrocarril cerca de Cistierna, construido en la primera quincena de junio de 2014, ocupado hasta el 14 de octubre de 2014, sacan adelante con éxito al menos dos pollos (J. L. Robles); y un adulto volando prolongadamente próximo a unos afloramientos calizos con cortados y cuevas, en la cabecera del Valle Diez, Valmartino, el 15 de junio de 2014 (J. L. Robles). Ejemplares invernantes en Extremadura: uno en Saucedilla, Cáceres, el 8 de diciembre de 2014 (S. Mayordomo); dos ejemplares en Cáceres el 29 de diciembre de 2014 (J. Solana) y uno en Alange, Badajoz, el 31 de diciembre de 2014 (A. M. Sánchez).

Canarias. En Tenerife, un ejemplar adulto de paso por el aeropuerto de Los Rodeos, La Laguna, el 13 de abril de 2015 (B. Rodríguez y R. Barone).

AVIÓN COMÚN

Delichon urbicum

Varios ejemplares en Alange, Badajoz, permanecen en diciembre de 2014 (J. Guerra y M. Gálvez). Dos ejemplares en Plasencia, Cáceres, en noviembre y diciembre de 2014 (J. Prieta e I. Solana). Cuatro aves en la EDAR de Cabezo Beaza, Cartagena, Murcia, el 16 de diciembre de 2014 (A. Fernández Caro, D. Zamora, A. Sansano y T. García Rubio).

BISBITA DE RICHARD

Anthus richardi

Observaciones en A Coruña: entre 2 y 5 ejemplares en el parque de Bens, A Coruña, del 28 de noviembre al 17 de diciembre de 2014 (X. Varela); uno en Abegondo el 4 de diciembre de 2014 (M. Carregal) y uno en Baldaio el 4 de diciembre de 2014 (X. Varela). Tres aves en Ribadeo, Lugo, el 23 de diciembre de 2014 (L. J. Cantil y F. Tornero). Doce aves en el cabo de Peñas, Asturias, el 16 de diciembre de 2014 (R. Fernández). Un ejemplar en Ossó de Sió, Lleida, el 11 de diciembre de 2014 (X. Macia y I. Oliveras). Dos en Aznalcázar, Sevilla, del 11 al 23 de diciembre de 2014 (F. Chiclana, M. Martín, J. Sarry y otros). Dos ejemplares en La Janda, Vejer de la Frontera, Cádiz, del 13 al 21 de diciembre de 2014 (J. Elorriaga). Tres ejemplares en el P. N. de Doñana, Huelva,

el 23 de diciembre de 2014 (J. Sarry). Tres aves en el marjal de Almenara, Castellón, el 13 de diciembre de 2014 (T. Alcocer, J. Portillo y otros).

BISBITA CAMPESTRE

Anthus campestris

Canarias. En Gran Canaria, un ejemplar en el campo de golf de Las Meloneras, San Bartolomé de Tirajana, el 7 de marzo de 2015 (D. Trujillo).

BISBITA GORGIRROJO

Anthus cervinus

Canarias. En Fuerteventura, en el campo de golf de Antigua, dos aves –un adulto y un primer invierno– el 7 de enero de 2015 (A. Ramesh). En Gran Canaria, en Lomo del Cardonal, Gáldar, dos ejemplares que buscan alimento entre campos de *Mesembryanthemum crystallinum*, junto a lavanderas boyeras, el 3 de abril de 2015 (D. Trujillo).

LAVANDERA BOYERA

Motacilla flava

Una en el río Guadalupejo, Alía, Cáceres, el 12 de diciembre de 2014 (J. A. Herrera) y uno en el embalse de Valdecañas, Cáceres, el 24 de diciembre de 2014 (S. Mayordomo).

Canarias. En Fuerteventura, grupo de unas 100 aves acompañando un ganado de ovejas en La



Lavandera boyera *Motacilla flava*. Gáldar (Gran Canaria). Foto: Domingo Trujillo.

Mata, Tuineje, el 1 de abril de 2015 (M. Cabrera). En Gran Canaria, el 29 de marzo de 2015 en las salinas de Arinaga, Agüimes, se observa un macho de la subespecie típica y una hembra; el 1 de abril de 2015 en Lomo del Cardonal, Gáldar, se avista un ave, mientras que el 2 de abril de 2015 en el mismo lugar hay tres ejemplares –un macho de la subespecie *M. f. flava*, otro que corresponde a *M. f. flavissima*, y una hembra–; además, en la misma fecha en Llanos de Botija, Gáldar, se detectan dos aves, y al día siguiente se contabilizan unos 40 ejemplares –todos los machos que pudieron ser determinados correspondían a *M. f. flava*– (D. Trujillo). En Tenerife, cerca de finca con vacas en Tejina, La Laguna, un ejemplar el 6 de noviembre de 2014 (R. Fernández Febles). En La Gomera, en desagües de una granja de la parte alta de San Sebastián de La Gomera se observa un macho correspondiente a la subespecie típica el 20 de marzo de 2015 (D. Trujillo). En La Palma, ejemplares de la forma *iberiae*: dos cerca de las charcas de riego de Las Martelas, Los Llanos de Aridane, el 4 de marzo y 2015, y dos aves en las antiguas graveras del aeropuerto, Mazo, el 5 de marzo de 2015 (A. Broen).

LAVANDERA BLANCA

Motacilla alba

Un ejemplar invernante de la subespecie *yarrellii* en Torre Pacheco, Murcia, el 9 de diciembre de 2014, en el mismo lugar donde se había observado en 2013 (T. García Rubio) y un ejemplar en la misma localidad el 14 y 15 de marzo de 2015 (A. Zamora y Tomás García Rubio).

Canarias. En La Palma, en charcas de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, una los días 17, 21 y 23 de noviembre de 2014, y dos aves entre el 7 de enero y el 28 de febrero de 2015, quedando sólo una los días 10 y 13 de marzo de 2015 (R. Burton). Un ejemplar en Las Salinas en Fuencaiente el 13 de marzo de 2015 (R. Burton).

BULBUL NARANJERO

Pycnonotus barbatus

En la ciudad autónoma de Melilla, donde no había información de esta especie, se considera común (A. González).

ACENTOR ALPINO

Prunella collaris

En la provincia de Zamora, donde hay pocas observaciones, dos aves en la sierra de la Culebra, a 1.243 metros, entre los términos de Flechas y Linarejos, el 5 de noviembre de 2014 (J. Talegón y M. M. Navarro).

COLIRROJO TIZÓN

Phoenicurus ochruros

Canarias. En Tenerife, una hembra en uno de los campos de golf de San Miguel de Abona el 4 de abril de 2015 (R. Cerdeña y F. Cruz Alvarado). En El Hierro, segunda observación: un macho en las inmediaciones de la ermita Virgen de la Peña, Valverde, el 26 de noviembre de 2014 (D. Trujillo).

COLIRROJO REAL

Phoenicurus phoenicurus

Canarias. En Gran Canaria, una hembra en Lomo del Cardonal, Gáldar, el 3 de abril de 2015 (D. Trujillo).

TARABILLA NORTEÑA

Saxicola rubetra

Un ejemplar en Huélagá, Cáceres, el 21 de noviembre de 2014 (C. Clemente).



Colirrojo real *Phoenicurus phoenicurus*. Gáldar (Gran Canaria). Foto: Domingo Trujillo.

Canarias. En Gran Canaria, un ejemplar en Lomo del Cardonal, Gáldar, el 2 de abril de 2015 (D. Trujillo).

TARABILLA EUROPEA

Saxicola rubicola

Canarias. En Lanzarote, un ave a las afueras del pueblo de Tías el 2 de enero de 2015 (F. J. García Vargas y J. Sagardía). En Gran Canaria, un macho en plumaje nupcial en Lomo del Cardonal, Gáldar, el 3 de abril de 2015 (D. Trujillo).

COLLALBA GRIS

Oenanthe oenanthe

Un ejemplar en Alcántara, Cáceres, el 7 de diciembre de 2014 (M. Rodríguez). Un ejemplar en Alange, Cáceres, del 12 al 16 de diciembre de 2014 (J. Guerra y M. Gálvez).

Canarias. En Gran Canaria, en San Bartolomé de Tirajana, en Calderín Alto se detectan dos aves y en Calderín Bajo se avista una el 30 de marzo de 2015, mientras que en este último sitio, el 31 de marzo de 2015 hay tres aves, así como otra en Lomo los Azules y dos individuos más en El Llanito; el 2 de abril de 2015 en Lomo del Cardonal, Gáldar, se observan dos individuos aunque sólo queda uno al día siguiente, otro en Llanos de Agaete y otro en Llano de las Moriscas, Agaete; el 12 de abril de 2015 en Cabeza del Morro, Las



Collalba gris *Oenanthe oenanthe*. Agaete (Gran Canaria). Foto: Domingo Trujillo.

Palmas de Gran Canaria, hay un ejemplar; el 14 de abril de 2015 en las cercanías del polígono industrial del Goro, Telde, un individuo y, por último, el 16 de abril de 2015 en Pozo Izquierdo, Santa Lucía de Tirajana, un ejemplar (D. Trujillo). En La Palma, un ejemplar en el Llano de Las Cuevas, El Paso, el 30 de octubre de 2014 (R. Burton).

MIRLO CAPIBLANCO

Turdus torquatus

Uno junto a zorzales comunes en un olivar a unos 400 m de altitud, en Puente del Obispo, Baeza, Jaén el 12 de diciembre de 2013 (F. J. Pulpillo y F. J. Martín-Iberus Birding).

Canarias. En Fuerteventura, uno en Pico del Mocán, Pájara, el 14 de diciembre de 2014, y otro en Castillo de Lara, Betancuria, el 28 de diciembre de 2014 (M. Cabrera). En Tenerife, en zona de invernada regular; un macho en un cedro canario *Juniperus cedrus* en Risco Verde, La Orotava, en el Parque Nacional del Teide, durante un transecto realizado el 29 de diciembre de 2013 dentro del programa Sacin que lleva a cabo SEO/BirdLife (D. Trujillo).

MIRLO COMÚN

Turdus merula

Canarias. En Fuerteventura, uno en Tarajalejo, Tuineje, el 11 de noviembre de 2014 (M. Cabrera).

CARRICERÍN REAL

Acrocephalus melanopogon

Un ejemplar en el embalse de Arrocampo, Cáceres, del 6 de diciembre de 2014 al 10 de enero de 2015 (F. Montañó, V. de Alba, A. Núñez, M. Gálvez, F. Bernáldez y otros). Un ejemplar en Medina Sidonia, Cádiz, el 13 de enero de 2015 (P. Barrena).

CARRICERO COMÚN

Acrocephalus scirpaceus

Un ejemplar en la gravera de Viñuelas, Galisteo, Cáceres, el 5 de diciembre de 2014 (S. Mayor-domo).

CURRUCA MOSQUITERA*Sylvia borin*

Canarias. En Lanzarote, un ave en la depuradora antigua de Playa Blanca, Yaiza, el 2 de noviembre de 2014 (F. J. García Vargas).

MOSQUITERO PAPIALBO*Phylloscopus bonelli*

Canarias. En Lanzarote, en fechas invernales, un ave en Costa Tegui el 24 de diciembre de 2014 (F. J. García Vargas).

MOSQUITERO SILBADOR*Phylloscopus sibilatrix*

Un ejemplar en acacias y tarayes de salinas de Marchamalo, Cartagena, Murcia, el 5 de abril de 2015 (J. Palacios, C. Requena y T. García Rubio). Capturadas para anillamiento cinco aves en la estación de esfuerzo constante de Montiver, ubicada en un campo de campo de cítricos, Sagunt, Valencia, el 15 de abril de 2015 (C. Mompó).

Corrección: El mes de las observaciones de la Región de Murcia publicadas en *Ardeola*, 61: 464-465 corresponde a mayo y no a abril como se indicaba.

MOSQUITERO COMÚN*Phylloscopus collybita*

Canarias. En Fuerteventura, hasta seis aves en Madre del Agua, Ajuy, Pájara, el 25 de diciembre de 2014 (M. Cabrera).

MOSQUITERO MUSICAL*Phylloscopus trochillus*

Canarias. En Gran Canaria, un individuo en Lomo del Cardonal, Gáldar, el 3 de abril de 2015 (D. Trujillo). En La Palma, uno en una charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, el 2 de octubre 2014 (T. Brereton).

REYEZUELO SENCILLO*Regulus regulus*

Tres aves en los pozos de la nieve de Sierra Espuña, Murcia, el 21 de diciembre de 2014 (J. Palacios y T. García).

PAPAMOSCAS GRIS*Muscicapa striata*

Canarias. En La Palma, en una zona arbolada cerca de la Laguna de Barlovento, un ejemplar el 23 de octubre de 2014 (R. Burton).

PAPAMOSCAS CERROJILLO*Ficedula hypoleuca*

Posible cita de cría en la provincia de Almería: un macho en plumaje reproductor en un encinar maduro, finca Santillana, Sierra Nevada, a 1.500 m s.n.m., el 2 de julio de 2014 (F. J. Martín-Iberus Birding),

BIGOTUDO*Panurus biarmicus*

Nueva localidad con presencia en el País Vasco: grupo pequeño en el lago de Arreo-Caicedo, Álava, el 7 y 12 de noviembre de 2014 (F. Silván, R. Asensio y J. M. Fernández-García). Presencia continua en 2014 e invierno de 2015 en el embalse de Arrocampo, Cáceres; con un máximo de cinco aves observadas simultáneamente el 24 de noviembre de 2014 (S. Mayordomo). Una hem-



Bigotudo *Panurus biarmicus*. Embalse de Arrocampo (Cáceres). Foto: José Luis Bautista Morán.

bra en el Marjal de Almenara, Castellón, el 21 de diciembre de 2014 (R. Gutiérrez y B. Iglesias).

TREPARRISCOS

Tichodroma muraria

Uno en Oliva de Mérida, Badajoz, el 31 de diciembre de 2014 (J. Elías). Un individuo en el río Guadalfeo, Motril, Granada, el 17 de enero de 2015 (J. M. Fernández).

ALCAUDÓN COMÚN

Lanius senator

Canarias. En Tenerife, un ejemplar cerca de la Cueva del Hermano Pedro, Granadilla de Abona, Tenerife, el 10 de marzo de 2015 (D. Ardizzone).

GRAJA

Corvus frugilegus

Dos aves de segundo año en Puigcerda, Girona, el 22 de febrero de 2015 (A. Degollada). Un individuo en Mollet del Vallés, Barcelona, el 20 de marzo de 2015 (C. López).

CUERVO GRANDE

Corvus corax

Grupo destacado de 24 ejemplares en los Saladares del Guadalentín, Murcia, el 22 de marzo de 2015 (J. Palacios y T. García).

Canarias. En Tenerife, un ejemplar sobrevolando Las Chafiras, San Miguel de Abona, el 6 de marzo de 2015 (J. Carrillo Hidalgo), y una pareja sobrevolando Igueste de Candelaria el 11 de marzo de 2015 (S. Contreras).

ESTORNINO PINTO

Sturnus vulgaris

Canarias. En Fuerteventura, grupo de 23 aves en los campos de golf de Antigua el 16 de febrero de 2014 (M. Cabrera). En Gran Canaria, en la Charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, se observa un ejemplar introducirse en el interior de una palmera canaria el 6 de marzo de 2015 (D. Trujillo). En La Gomera, cuarta cita: dos ejemplares cerca del cementerio de San Sebastián de La Gomera el 29 de enero de 2015 (D. Trujillo).

ESTORNINO NEGRO

Sturnus unicolor

Reproducción tardía: el 27 de octubre de 2014 se localiza un nido con pollos solicitando comida a un adulto; el nido se sitúa dentro de un agujero en una sabina hecho por pico picapinos en Cedillo de la Torre, Segovia, a unos 1.000 m s.n.m. (X. Martín).

TEJEDOR AMARILLO

Euplectes afer

Continúa la expansión hacia el este en los regadíos de las Vegas del Guadiana, en Badajoz: el 30 de noviembre de 2014 se observan siete ejemplares en Guadiana del Caudillo y el 8 de enero de 2015 se ven ocho en Montijo (J. L. Bautista).

VERDERÓN SERRANO

Carduelis citrinella

Concentración de 45-50 ejemplares en los pinares del Puerto La Ragua, Sierra Nevada, el 2 de diciembre de 2013 (F. J. Martín-Iberus Birding). Irrupción de la especie con llegada de ejemplares a algunos lugares fuera del área habitual de



Verderón serrano *Carduelis citrinella*. Piornal (Cáceres). Foto: Javier Prieta.

su distribución o en la que se conocía su presencia (Borrás y Senar, 2003 y 2012). Primera cita para la provincia de Sevilla: capturado un individuo adulto en la Estación de Anillamiento del Refugio de la Serpiente, Estepa, Sevilla, el 25 de octubre de 2014; podría haber llegado a la zona junto a un grupo de jilgueros lúganos (J. F. Pérez, E. Gómez, J. Mercado y E. Rico). Varios registros en la provincia de Málaga: dos machos jóvenes capturados para anillamiento en el Cortijo de los Quejigales, P. N. Sierra de las Nieves, el 25 de octubre de 2014 (A. J. Plaza, R. Haro, J. A. Cortés, M. Domínguez y J. J. Jiménez); tres ejemplares entran a beber junto con un pequeño bando de lúganos en la charca del arroyo Chaperas, zona de Torrijos, Parque Natural de los Montes de Málaga, el 28 de octubre de 2014 (N. Doblas Fernández); también en el P. N. de los Montes de Málaga un bando de verderones serranos con seis individuos que más tarde son capturados para su anillamiento (8 aves, 5 machos y 3 hembras, todas jóvenes) el 31 de octubre de 2014 (A. M. Pérez Ortigosa) y uno en la zona de Torrijos, dentro de este parque el 2 de noviembre de 2014 (I. Gómez Carrasco, M. M. Roca Alonso y J. I. Álvarez Gil); por último en esta provincia, un grupo de unos 20 ejemplares en el entorno del refugio del Juanar, ruta de Pozuelo, Ojén, mezclado con jilgueros, verdicillos y lúganos (A. J. Plaza Bonilla). Un individuo en Ceuta el 31 de octubre de 2014 (J.

Navarrete). En Cáceres: presencia en un pinar del Pico Villuercas, Guadalupe, del 30 de octubre al 30 de diciembre de 2014, con un máximo de 21 ejemplares (M. Kelsey, M. Gálvez, J. Guerra, F. Montaña y otros); en tres pequeños pinares de pino silvestre en Piornal, presencia continua desde el 20 de diciembre de 2014 al 6 de marzo de 2015, con máximos de unas 30 aves en el pinar del pueblo (A. Redondo, G. Rivas, L. Rivas, R. Montero, J. Prieta y otros); diez ejemplares en el puerto de Honduras, Cabezuela del Valle, el 24 de diciembre de 2014, en mosaico de robledal y cultivos de cerezos, en bando mixto con otros fringílicos (R. Montero); tres en el pinar de Tornavacas el 10 de enero de 2015 (J. Prieta), y en Villanueva de la Vera se observa un bando de hasta 50 aves, del 4 al 23 de febrero de 2015, en una aliseda rodeada de robledal y mezclada con otros fringílicos, sobre todo con lúganos (D. Langlois). Tres aves en Nogueira de Muñiz, Lugo, el 27 de marzo de 2015 (J. Fernández Lodeiro). Uno en el parque Ciudadela, Pamplona, Navarra, el 28 de diciembre de 2014 (H. Sarasa).

PARDILLO COMÚN

Carduelis cannabina

Canarias. En Gran Canaria, grupos numerosos: bando de 20-25 ejemplares en Las Cruces, Gáldar, el 7 de enero de 2015, así como de 60-70 aves en



Verderón serrano *Carduelis citrinella*. Estación de Anillamiento del Refugio de la Serpiente, entorno de Estepa (Sevilla). Foto: Fco. Javier Pérez Mata.



Picogordo común *Coccothraustes coccothraustes*. LIC Revolcadores (Murcia). Foto: José F. Calvo.

Lomo Gordo, Telde, y por unos 50 individuos en las proximidades del Barranco de los Corralillos, Agüimes, el 25 de enero de 2015 (D. Trujillo). En Tenerife, bando compuesto por 40-50 ejemplares en La Boruga, La Orotava, el 21 de febrero de 2015 (D. Trujillo).

PICOGORDO COMÚN

Coccothraustes coccothraustes

En Murcia, en 2014, donde es una especie muy escasa y con apenas citas en época estival: una hembra adulta bebiendo en un arroyo en un pinar de *Pinus nigra*, en el LIC Revolcadores, el 9 de junio, y un macho y hembra adultos bebiendo en este arroyo el 8 de julio (M. León-Ortega, C. González Revelles y J. F. Calvo).

ESCRIBANO NIVAL

Plectrophenax nivalis

En Huelva, uno en Almonte, el 7 de octubre de 2014 (H. Valkema) y tres ejemplares en el espigón Juan Carlos I, marismas del Odiel, del 24 de diciembre de 2014 al 12 de enero de 2015, en diciembre de 2013 se observó un ejemplar en el mismo lugar (F. Chiclana, R. García, P. Barrena, J. Pérez-Contreras, J. Rabadán y otros). Un macho en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 4 de diciembre de 2014 (J. L. González). Un ejemplar

en Alcossebre, Valencia, el 22 de diciembre de 2014 (D. Nordera). Segundo registro en Badajoz: un ejemplar en Santa Amalia los días 23 y 26 de enero de 2015 (M. Gálvez, J. Guerra, A. Núñez, F. Montaña, M. Kelsey, V. de Alba y J. A. Román). Dos machos en el puerto de Vegarada, Lugueros, León, los días 26 y 27 de enero de 2015, a una altitud de 1.500 m (M. A. González y J. Purroy).

ESCRIBANO CERILLO

Emberiza citrinella

Una ave en Inazares, Murcia, el 1 de febrero de 2015, integrado en un grupo de escribano montesino, escribano soteño y pinzón vulgar (J. Palacios y T. García).

AGRADECIMIENTOS.—Agradecemos especialmente a todos los colaboradores y personas que envían sus observaciones, facilitando de esta manera la recopilación de los datos de interés. También a Sergio Mayordomo por su labor de recopilación de la mayoría de los registros de Extremadura, como ha hecho en las últimas entregas del Noticario. Además, al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife por el envío de las citas que llegan a este comité. Por último, a Agustín Carretero (SEO/BirdLife) por sus labores de edición y revisión del texto.



Escribano nival *Plectrophenax nivalis*. Espigón Juan Carlos I, marismas del Odiel (Huelva). Foto: Carlos Molina.



Escribano nival *Plectrophenax nivalis*. Espigón Juan Carlos I, marismas del Odiel (Huelva). Foto: Juan Pérez Contreras.

BIBLIOGRAFÍA

- BORRÁS, A. y SENAR, J. C. 2003. Verderón serrano, *Carduelis citrinella*. En, R. Martí y J. C. del Moral (Eds.): *Atlas de las Aves Reproductoras de España*, pp. 578-579. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- BORRÁS, A. y SENAR, J. C. 2012. Verderón serrano, *Carduelis citrinella*. En, SEO/BirdLife: *Atlas de las aves en invierno en España 2007-2010*, pp. 520-521. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente-SEO/BirdLife. Madrid.
- GUTIÉRREZ, R., DE JUANA, E. y LORENZO, J. A. 2012. *Lista de las aves de España*. Edición de 2012. Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Madrid.
- LÓPEZ RODRÍGUEZ, J. 2014. Seguimiento de la migración postnupcial de la pardela cenicienta (*Calonectris diomedea*), desde la punta del Desnarigado, Ceuta. *Revista Alcaudón*, 11: 70-76.
- LORENZO, M. y PLANELLES, P. 2010. *La agachadiza común en España. Población reproductora en 2009 y método de censo*. SEO/BirdLife. Madrid.
- ROMERO, J. L. 2004. Pico garser petit, *Dendrocopos minor*. J. Estrada, V. Pedrocchi, L. Brotons y S. Herrando (Eds.). 2004. *Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002*, pp. 326-327. Barcelona: Institut Català d'Ornitologia (ICO)/Lynx edicions.