



## Noticario Ornitológico

Authors: Molina, Blas, Prieta, Javier, Lorenzo, Juan Antonio, and López-Jurado, Carlos

Source: Ardeola, 58(2) : 481-516

Published By: Spanish Society of Ornithology

URL: <https://doi.org/10.13157/arla.58.2.2011.481>

---

BioOne Complete ([complete.BioOne.org](https://complete.BioOne.org)) is a full-text database of 200 subscribed and open-access titles in the biological, ecological, and environmental sciences published by nonprofit societies, associations, museums, institutions, and presses.

Your use of this PDF, the BioOne Complete website, and all posted and associated content indicates your acceptance of BioOne's Terms of Use, available at [www.bioone.org/terms-of-use](https://www.bioone.org/terms-of-use).

Usage of BioOne Complete content is strictly limited to personal, educational, and non - commercial use. Commercial inquiries or rights and permissions requests should be directed to the individual publisher as copyright holder.

---

BioOne sees sustainable scholarly publishing as an inherently collaborative enterprise connecting authors, nonprofit publishers, academic institutions, research libraries, and research funders in the common goal of maximizing access to critical research.

## NOTICIARIO ORNITOLÓGICO

Blas MOLINA<sup>1</sup>, Javier PRIETA<sup>2</sup>, Juan Antonio LORENZO<sup>3</sup> (Canarias)  
y Carlos LÓPEZ-JURADO<sup>4</sup> (Baleares)

Esta nueva entrega contiene información sobre 185 especies repartidas por toda la geografía nacional. A las citas recibidas habitualmente se han incorporado algunas otras recogidas en distintos foros, así como algunos blogs y páginas web. Con el fin de facilitar la labor de recopilación de datos, se recomienda el envío de las observaciones de interés a la dirección [noticiario@seo.org](mailto:noticiario@seo.org).

### CISNE NEGRO

*Cygnus atratus*

---

Un ejemplar en el paraje de Punta Entinas, El Ejido, Almería, desde noviembre de 2010 hasta abril de 2011 (J. F. Barranco).

### ÁNSAR CARETO

*Anser albifrons*

---

En las lagunas de Villafáfila, Zamora, en 2011: dos aves el 12 de febrero (J. A. Hernández Rodríguez y M. I. Martín Rodrigo); dos individuos el 15 de octubre y siete adultos el día 19 de octubre (A. Rodrigo). Un individuo en la balsa de Zolina, Navarra, el 15 de octubre de 2011 (M. García), quizás sea el mismo visto en Pamplona el día 17 (R. Rodríguez). Uno en Zarautz, Guipúzcoa, el 17 de octubre de 2011 (H. González). Dos en Isla Mayor, Sevilla, el 29 de octubre de 2011 (J. L. Anguita).

### ÁNSAR COMÚN

*Anser anser*

---

Primera cita de reproducción en Extremadura, aunque no se puede asegurar que sean aves silvestres:

tres: un grupo de siete adultos y dos pollos en el embalse de Alqueva, Badajoz, el 11 de mayo de 2011 (Á. Sánchez).

### BARNACLA CANADIENSE

*Branta canadensis*

---

Un adulto en Villaviciosa, Asturias, el 9 de junio de 2011 (A. Villaverde). Un ejemplar en Creixell, Tarragona, el 12 de abril de 2011 (A. Vázquez y J. González). Dos aves en el embalse de la Torre de Abraham, Ciudad Real, el 29 de mayo de 2011 (S. Rubio).

### BARNACLA CARIBLANCA

*Branta leucopsis*

---

Un ejemplar en la balsa de Casas de Hitos, Navavillar de Pela, Badajoz, el 24 de abril (G. Schreur y M. Kelsey) y el 2 de mayo de 2011 (E. Palacios, P. Ramírez, J. Prieta, M. Á. Muñoz y S. Mayor-domo). Trece aves en Salburúa, Vitoria, Álava, el 19 de febrero de 2011 (J. A. Hernández Rodríguez, M. I. Martín Rodrigo y E. D'Hoore). Tres aves en la confluencia del arroyo Ciriano con el río Guadalhorce, Málaga, el 24 de febrero de 2011

---

<sup>1</sup> [noticiario@seo.org](mailto:noticiario@seo.org)

<sup>2</sup> [javierprieta@gmail.com](mailto:javierprieta@gmail.com)

<sup>3</sup> [jalorenzo@seo.org](mailto:jalorenzo@seo.org)

<sup>4</sup> [ornitologia@gobmallorca.com](mailto:ornitologia@gobmallorca.com)

(F. J. Sánchez García). En la albufera de Valencia, donde sólo se conocían algunos registros de mediados del siglo pasado: dos aves en la R. N. de La Pipa, desde el 8 hasta el 13 de abril de 2011 (M. Lassalle y L. Moreno).

*Corrección:* en *Ardeola*, 58(1): 194, la fecha correcta de la observación en La Rioja de 19 aves en el embalse de Leiva es el 1 de enero de 2011 (J. Serradilla).

### **BARNACLA CARINEGRA**

*Branta bernicla*

Siete ejemplares el 10 de enero de 2010 en las marismas de Santoña, Cantabria, el 9 y el 7 de febrero de 2010 (S. Alarcón), y dos el 28 de octubre de 2011 (A. García Herrera). Dos en la playa de La Concha, San Sebastián, Guipúzcoa, el 7 de octubre de 2011 (H. González Arzelus). Ocho individuos en Louro, Pontevedra, el 14 de septiembre de 2011 (M. Figueiras).

### **GANSO DEL NILO**

*Alopochen aegyptiacus*

Segunda localidad de cría en Extremadura: una pareja con tres pollos en el embalse de Valdecañas, Cáceres, el 14 de junio de 2011 (Á. Sánchez, F. Hurtado y M. Flores) y cuatro adultos y 12 juveniles el 28 de julio (Á. Sánchez y Á. L. Sánchez). Tres ejemplares en San Vicente de la Barquera, Cantabria, el 13 de julio de 2011 (M. Alonso Peña, D. Rebotó y M. L. González Díaz).

### **TARRO CANELO**

*Tadorna ferruginea*

Diez aves en el embalse de Los Canchales, Badajoz, el 5 de septiembre de 2011 (E. del Viejo). Un ave en la laguna de La Fuente, Revellinos, León el 22 de febrero de 2011 (J. A. Hernández Rodríguez y M. I. Martín Rodrigo). Siete ejemplares posados en el Castillo de Aulencia, Madrid, el 10 de marzo de 2011, parece ser que llevaban todo el invierno por la zona (J. Fernández García). Una pareja en la gravera de Soto Mozanaque, Algete, Madrid, el 6 de mayo de 2011 (B. Molina). Un ave en la laguna de Barillos, Revellinos, Zamora, el 11 de marzo de 2011 (J. A. Hernández Rodríguez y M. I. Martín Rodrigo).

**Canarias.** En Lanzarote, intento fallido de cría: dos aves presentes en el lago de Janubio, Yaiza, el 22 de marzo de 2011, y con cinco pollos de pocos días el 14 de abril de 2011 (D. Pérez y F. J. García Vargas), aunque el 16 de mayo sólo sobrevivía uno de ellos (G. García Casanova) y el 20 de abril sólo se detectaron los adultos (J. Sagardía), asumiéndose que si no todos, la mayor parte de ellos fueron depredados. Con posterioridad, en esta misma isla, tres ejemplares sobrevolando el campo de golf de Tías el 24 de octubre de 2011 (F. J. García Vargas).

### **TARRO BLANCO**

*Tadorna tadorna*

Primera reproducción en Extremadura: en el embalse de Valdecañas, Cáceres, se observan 18 parejas el 5 de mayo de 2011; el 11 de mayo se localiza una pareja con dos pollos; en junio se cuentan al menos 5 parejas y 21 pollos los días 14, 16 y 20; el 28 de julio se observan 2 adultos y 12 jóvenes, y el 8 de septiembre 5 adultos y 11 juveniles (Á. Sánchez, F. Hurtado, M. Flores, S. Mayordomo, A. L. Sánchez, E. Palacios y J. Prieta). Sexta cita para la provincia de León: un macho adulto en la balsa de Zuares del Páramo el 19 de febrero de 2011; permanece en varias de las balsas de riego del Páramo hasta el 10 de marzo (D. Miguélez).

### **PATO MANDARÍN**

*Aix galericulata*

Segundo caso de reproducción en Extremadura: una hembra con cinco pollos grandes en una charca de Valcorchero, Plasencia, Cáceres, el 26 de junio de 2011 (C. Martín).

### **CERCETA COMÚN**

*Anas crecca*

**Canarias.** En La Gomera, el 5 de octubre de 2011 en el embalse de Cardones, cerca de Antoncojo, Alajeró, dos individuos, uno de ellos juvenil y el otro probable hembra; al día siguiente sólo se encuentra un juvenil, así como el 24 de octubre de 2011 (D. Trujillo). En La Palma, donde hay pocas citas de la década de 1990 y de enclaves del este y norte de la isla, el 12 de diciembre de 1990 se cita una hembra en las graveras del aeropuerto

en Mazo, mientras que el 7 de marzo de 1994 en la laguna de Barlovento se observa un grupo compuesto por ocho hembras y un macho; en este mismo enclave, pero en fecha posterior, el 22 de octubre de 2011, hay un ejemplar (D. Trujillo).

#### CUCHARA COMÚN

##### *Anas clypeata*

Reproducción en Cáceres: una hembra sale de un nido con ocho huevos en el embalse de Valdecañas el 20 de junio de 2011 (S. Mayordomo y J. Prieta). Primeros datos de reproducción en la provincia de León desde los años 90 (Miguélez *et al.*, 2011): en la balsa de Villamañán 1, Villacé, una hembra con cinco pollos de unas tres semanas de edad el 28 de junio de 2011, y otra hembra con nueve pollos de pocos días de edad el 7 de julio de 2011; y en la balsa Villamañán 2, Zuares del Páramo, se observa una hembra con ocho pollos el 28 de junio de 2011 y otra hembra también con ocho pollos el 7 de julio de 2011, ambas polladas de pocos días de vida (D. Miguélez y S. Blanco).

**Baleares.** Se confirma la cría por tercer año consecutivo en la albufera de Mallorca (única localidad de reproducción; López-Jurado *et al.*, 2010), en esta ocasión con cuatro parejas. Se observaron pollos a partir del 22 de junio de 2010 y juveniles el 11 de julio (P. Vicens y N. Riddiford/AOB).

**Canarias.** En Tenerife, una hembra alimentándose en las charcas de Erjos, Los Silos, el 24 de septiembre de 2011 (F. Siverio y M. Siverio). En La Palma, en la laguna de Barlovento, el 12 de septiembre de 2011 se avista un macho en eclipse y una hembra, mientras que el 22 de octubre de 2011 sólo se encontraba un macho (D. Trujillo).

#### CERCETA PARDILLA

##### *Marmaronetta angustirostris*

Reproducción en la albufera de Valencia en la R. N. del Racó de l'Olla: en 2008, un adulto con 10 pollos recién eclosionados, frente al observatorio público, el 4 de abril (J. I. Dies, M. Chardí, L. Verdejo y C. Mompó) y cuatro ejemplares (posiblemente tres machos), uno de ellos seguido por dos pollos, en la laguna norte de la reserva, el 19 de junio (J. I. Dies y M. Chardí); después de la cría en 2008 se vuelve a confirmar la reproducción en

2010 con una hembra seguida de un único pollo recién eclosionado el 15 de junio (J. I. Dies e I. Ruiz) y un segundo registro de cría comprobada con una hembra acompañada por dos pollos recién eclosionados el 25 de junio (J. I. Dies, M. Chardí e I. Ruiz). En el P. N. Tablas de Daimiel, Ciudad Real, 22 ejemplares el 9 de enero y nueve aves el 6 de abril de 2011 (J. Muddeman). Hasta 21 aves en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, el 18 de abril de 2011 (J. L. Anguita).

**Canarias.** En Fuerteventura, un ejemplar en compañía de cercetas comunes en el embalse de Los Molinos, Puerto del Rosario, el 12 de octubre de 2011 (M. Cabrera). Con posterioridad, otro ejemplar en las charcas del campo de golf de Caleta de Fuste, Antigua, el 15 de octubre y aún allí el 17 de octubre de 2011 (C.-J. Palacios y S. Palacios).

#### PATO COLORADO

##### *Netta rufina*

Posible reproducción en Badajoz en 2011: cinco machos y una hembra en un pequeño embalse del norte de la provincia el 24 de abril (Á. Sánchez y Á. L. Sánchez); cinco machos y una hembra en el río Guadiana, Talavera la Real, el 4 de mayo (G. Schreur) y diez machos y dos hembras en el embalse de Alange el 17 de mayo (Á. Sánchez). Reproducción en Sierra Morena: una hembra con cuatro pollos pequeños en el río Viar, El Pedroso, Sevilla, el 8 de junio de 2010 (R. Romero).

#### PORRÓN PARDO

##### *Aythya nyroca*

Dos individuos en el P. N. Tablas de Daimiel, Ciudad Real, el 9 de enero de 2011 (J. Muddeman) y ocho ejemplares el 30 de agosto de 2011 (J. Feliu). Cuatro machos en la laguna del Pueblo, Pedro Muñoz, Ciudad Real, el 14 de mayo de 2011 (R. Velasco). Un macho en el embalse de Carrascosa del Campo, Cuenca, el 8 de Agosto de 2011 (A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente/UAH). Un macho en la laguna de Pétrola, Albacete, el 12 de agosto de 2011 (R. Torralbo). En Cádiz, dos en la laguna Salada de Zorrilla, Espera, el 13 de febrero de 2011 (R. Romero y U. Mellone), un macho en la laguna de La Paja, Chiclana de la Frontera, el 12 de mayo de 2011 (M. Jiménez Cin-

tado) y una pareja en eclipse en la laguna de Medina, Jerez de la Frontera, el 1 de agosto de 2011 (J. J. Diez). En Sevilla, cuatro individuos en la laguna Alcaparrosa, Utrera, el 13 de febrero de 2011 (R. Romero) y ocho en la laguna de Calderón, Osuna, el 4 de septiembre de 2011 (M. Villaécija). Un macho en El Manantío, Aldea del Cano, Cáceres, los días 27 (M. Iglesias) y 29 de septiembre de 2011 (S. Mayordomo).

#### **PORRÓN BASTARDO**

*Aythya marila*

Una hembra en el Sorbal, marismas de Santoña, el 10 de enero de 2011 (S. Alarcón).

#### **EIDER COMÚN**

*Somateria mollissima*

Una hembra en Getxo, Vizcaya, el 16 de noviembre de 2010 (S. Alarcón y J. Badiola).

#### **NEGRÓN COMÚN**

*Melanitta nigra*

Hasta 100 ejemplares en la Flecha del Rompido, Cartaya, Huelva, el 1 de noviembre de 2010 (R. Romero y P. Medina) y seis aves el 2 de agosto de 2011 (F. Chiclana).

#### **NEGRÓN ESPECULADO**

*Melanitta fusca*

Cuatro hembras en Cicero, marismas de Santoña, Cantabria, el 10 de enero de 2010 (S. Alarcón).

#### **PORRÓN OSCULADO**

*Bucephala clangula*

Una hembra en las marismas Blancas, Astillero, Cantabria, los días 9 y 27 de enero y 7 de marzo de 2010 (S. Alarcón).

#### **SERRETA MEDIANA**

*Mergus serrator*

Dos hembras en la playa de La Caleta, Cádiz, el 30 de diciembre de 2010, especie cada vez más escasa como invernante en la bahía de Cádiz (M. Jiménez Cintado).

#### **MALVASÍA CABECIBLANCA**

*Oxyura leucocephala*

Se cuentan 241 ejemplares en la laguna de Pétrola, Albacete, el 17 de octubre de 2011 (R. Torralba).

#### **CODORNIZ COMÚN**

*Coturnix coturnix*

Observaciones en invierno en Murcia: en la Rambla del Albujión, Carmolí, Mar Menor: un ave cantando el 16 de noviembre de 2009 y de nuevo el 24 de noviembre; un individuo en la desembocadura de la rambla el 2 de enero de 2010 y un ave cantando en un campo de alcachofas junto a una balsa de regadío, al sur de esta rambla, el 12 y 13 de febrero de 2010 (A. J. Hernández Navarro). Dos ejemplares en un jaral abierto de Encinasola, Huelva, el 15 de enero de 2010 (R. Romero). Se detecta a la especie en un piornal a gran altitud, entre 2.350 y 2.150 m, en la cara norte del Chullo, Sierra Nevada, Granada, el 21 y 23 de junio de 2011 (I. García Páez, F. Guerrero Ruíz e I. Álvarez Escobar).

#### **COLIMBO CHICO**

*Gavia stellata*

Dos en la ría de Huelva el 14 de diciembre de 2010 (R. Romero, J. Salcedo y J. M. Méndez). Un ave en el puntal de Laredo, Cantabria, el 10 de enero de 2010 (S. Alarcón).

#### **COLIMBO ÁRTICO**

*Gavia arctica*

Un ave, aparentemente de primer invierno, en el litoral de la Devesa, albufera de Valencia, a cierta distancia de la costa en frente de La Malladeta, el 9 de diciembre de 2009; prolonga su estancia hasta el 28 de febrero de 2010. No había nuevos registros desde 1996 (B. Dies). Un ave en el puntal de Laredo, Cantabria, el 10 de enero de 2010 (S. Alarcón). Un ave en Castro Urdiales, Cantabria, el 20 de enero de 2010 (S. Alarcón).

#### **COLIMBO GRANDE**

*Gavia immer*

En las marismas de Santoña, Cantabria, se observan cuatro ejemplares el 10 de enero de 2010, dos

ejemplares el 27 de enero y el 7 de febrero, y uno solo el 17 de febrero (S. Alarcón). Dos ejemplares en Pedreña, Cantabria, el 27 de enero de 2010 (S. Alarcón). Un ejemplar en Getxo, Vizcaya, el 4 y el 31 de diciembre de 2010 (S. Alarcón).

#### ZAMPULLÍN COMÚN

*Tachybaptus ruficollis*

Concentración: 395 ejemplares en la charca de Brozas, Cáceres, el 17 de agosto de 2011 (C. Fernández Díaz).

#### SOMORMUJO LAVANCO

*Podiceps cristatus*

Un ejemplar albino, carece de melanina, incluso en el iris del ojo que es de color rojo rubí, en la charca de Esparragalejo, Badajoz, desde el 22 de agosto (Á. Sánchez) hasta al menos el 24 de septiembre de 2011 (J. Prieta, S. Mayordomo, C. Clemente y J. Mahillo).

**Baleares.** Primera cita de cría en la albufera des Grau, Maó, Menorca: dos parejas con cuatro pollos de al menos un mes el 16 de julio de 2010 (X. Méndez/AOB).

#### ZAMPULLÍN CUELLIRROJO

*Podiceps auritus*

Primer registro realizado hasta la fecha en la albufera de Valencia: un ejemplar en el estany de Pu-

jol, Devesa de El Saler, desde el 21 de febrero hasta el 23 de marzo de 2010 (G. Chaguaceda, B. Martínez y B. Dies).

#### ZAMPULLÍN CUELLINEGRO

*Podiceps nigricollis*

En Madrid, aumenta la población reproductora en la laguna de Meco pasando de 4 y 3 parejas registradas en 2009 y 2010 respectivamente, a 24 parejas en 2011, este aumento puede ser fruto de un elevado nivel del agua (C. Talabante y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente/UAH).

#### PARDELA CAPIROTADA

*Puffinus gravis*

**Canarias.** Durante un viaje pelágico por aguas al norte de Lanzarote, alcanzando el Banco de la Concepción, los días 10 y 11 de septiembre de 2011, se detectan más de 50 aves (J. Sagardía, D. L. Velasco y otros). En un viaje similar pero por aguas del sur de la isla, una el 15 de octubre de 2011 (J. Sagardía y A. Unquiles Cobos).

#### PARDELA SOMBRÍA

*Puffinus griseus*

**Canarias.** Durante un viaje pelágico por aguas al norte de Lanzarote, alcanzando el Banco de la Concepción, tres aves el 10 de septiembre de 2011 (J. Sagardía, D. L. Velasco y otros).



**Pardela capirota** *Puffinus gravis*. Aguas al norte de Lanzarote. Foto: Juan Sagardía.



**Pardela pichoneta** *Puffinus puffinus*. Aguas al norte de Lanzarote. Foto: Juan Sagardía.

**PARDELA PICHONETA***Puffinus puffinus*

**Canarias.** Durante un viaje pelágico por aguas al norte de Lanzarote, alcanzando el Banco de la Concepción, los días 10 y 11 de septiembre de 2011, se observan 10 y 15 ejemplares, respectivamente (J. Sagardía, D. L. Velasco y otros).

**PARDELA MEDITERRÁNEA***Puffinus yelkouan*

**Baleares.** Un ejemplar muerto en Son Real, Santa Margalida, en la bahía de Alcudia, Mallorca, el 7 de enero de 2010 (A. Rodríguez y M. McMinn/AOB).

**PARDELA BALEAR***Puffinus mauretanicus*

Un total de 16.420 aves en paso hacia el norte, en apenas dos horas de observación, desde el cabo de Cullera, Cullera, Valencia, el 12 de diciembre de 2009; se trata del mayor número registrado hasta la fecha en el litoral de la albufera de Valencia y que podría hacer referencia al grueso de la población mundial de esta especie (R. Muñoz, L. Aleixos, M. Aleixos, J. Blasco, V. París, S. Bargues, J. Miralles y B. Dies). Mínimo de 8.000 ejemplares en una gran balsa, muy al norte del cabo de Cullera, aparentemente frente al Perelló, en el litoral de la albufera de Valencia, el 31 de enero de 2010 (L. Aleixos). Aproximadamente unas 8.000 aves en tres horas de observación volando dirección sur frente a la Gola del Perellonet, litoral de la albufera de Valencia, el 17 de enero de 2011 (V. París).

**Baleares.** En Menorca se observan 20 aves de la forma *mauretanicus/yelkouan* pescando junto con 1.100 pardelas cenicientas, gaviotas y cormoranes en la punta de Escullar (Ciutadella) el 29 de marzo de 2010. Entre las pocas pardelas baleares había alguna de la forma *P. yelkouan*, pero dos individuos oscuros de la forma *P. mauretanicus* (M. McMinn/AOB). Un ave volando y posada entre cala Llonga y cala Figuera (Maó) el 2 de julio de 2010 (S. Cardona/AOB). Un mínimo de 400 de la forma *mauretanicus/yelcouan*, muchos de ellos pescando en el cabo de Favàritx (Maó) el 6 de febrero de 2010 (Ll. Julia, J. Florit/AOB, véase López-Jurado *et al.*, 2010).

**PAÍÑO PECHIALBO***Pelagodroma marina*

**Canarias.** Datos de aves capturadas en El Hierro: un ejemplar debilitado en Tamaduste, Valverde, el 20 de agosto de 2004, y con posterioridad, otra en mal estado recogida en La Maceta, La Frontera, el 23 de agosto de 2011 (D. Trujillo y M. Á. Rodríguez).

**PAÍÑO EUROPEO***Hydrobates pelagicus*

**Baleares.** En Mallorca, 55 ejemplares en dos horas y media de navegación en el canal de Menorca el 11 de mayo de 2010, de los cuales un grupo compacto de 33 individuos buscaba alimento en una zona rizada de la superficie marina (M. McMinn y A. Rodríguez/AOB).

**PAÍÑO BOREAL***Oceanodroma leucorhoa*

En el Mediterráneo, donde es accidental (Paterson, 1997 y 2002) y en concreto en el mar de Alborán, donde no hay constancia de que se haya detectado desde finales del siglo XIX (Irby, 1895): el 8 de



**Paíño boreal** *Oceanodroma leucorhoa*. A cinco millas al este de la isla de Alborán. Foto: Diego Moreno.

julio de 2009 se detectaron tres ejemplares a dos millas de la costa frente a cabo Pino, Málaga, y el 29 de septiembre de 2009 se avistaron cuatro aves a seis millas frente al Rincón de la Victoria, Málaga. Posteriormente, el 7 de abril de 2010, se fotografiaron tres ejemplares volando hacia el oeste a 5 millas al E de la isla de Alborán (D. Moreno, A. Barrajón, J. M. Remón y J. de la Rosa-Programa de Medio Marino de Andalucía/Consejería de Medio Ambiente). Dos ejemplares en la playa de la Caleta, Cádiz, el 18 de febrero de 2011 (P. Barrena y M. Jiménez Cintado).

### **CORMORÁN GRANDE**

*Phalacrocorax carbo*

---

Censo de la población reproductora en el embalse de La Serena en la temporada 2011 con un total de 341 parejas reproductoras, repartidas en cinco colonias: la mayor en la provincia de Badajoz con 313 parejas, en dicha provincia hay dos núcleos más con 11 y 3 parejas con nido; en la parte cordobesa se localiza una colonia con 13 nidos y en Ciudad Real 1 nido aislado (X. Piñeiro). Dormidero con 810 ejemplares en el río Guadalquivir, La Algaba, Sevilla, el 19 de noviembre de 2010 (R. Romero).

### **CORMORÁN MOÑUDO**

*Phalacrocorax aristotelis*

---

Durante el seguimiento de las colonias de cormorán moñudo en la costa guipuzcoana (Hendaia, Igeldo y San Antón), se ha podido comprobar una evolución positiva de la población con 23 parejas en 2011, mientras que en 2006 se contabilizaron tan solo 5 (Itsas Enara).

### **AVETORILLO COMÚN**

*Ixobrychus minutus*

---

Datos de invernada en Murcia: en la desembocadura de la rambla del Albujión, Cartagena, un ave en carrizales el 16 de diciembre de 2008, uno el 28 de diciembre de 2009 y una hembra adulta el 2 de enero de 2011 (A. J. Hernández Navarro). Primer dato de cría segura en el norte de Huelva: un macho cebando un pollo en el embalse de Minas, Cala, en junio de 2009 (R. Romero).

**Canarias.** En Lanzarote, donde se conocen pocos datos, uno cerca del campo de golf de Tegui se el 14 de abril de 2011 (F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos), todavía allí el 20 de abril de 2011 (J. Sagardía). En Tenerife, datos de la localidad de cría de Tejina y Bajamar, La Laguna, que complementan el censo efectuado por SEO/BirdLife: un macho adulto el 15 de marzo de 2011 (J. Caddick, R. Barone y C. Caddick) y de nuevo el 23 de septiembre de 2011 (R. Barone, V. R. Cerdeña y J. Vizcaíno) y el 14 de octubre de 2011 (R. Barone y A. Arbelo), así como un individuo, probablemente hembra, en el barranco del Espinal, el 14 de octubre de 2011 (V. R. Cerdeña).

### **MARTINETE COMÚN**

*Nycticorax nycticorax*

---

**Canarias.** En Lanzarote, distintas observaciones en la presa de Mala, Tegui; dos aves el 13 de mayo de 2011 (J. Sagardía) y posteriormente cuatro ejemplares el 22 de mayo de 2011 (F. J. García Vargas, A. Unquiles Cobos y D. Pérez) así como dos el 2 de junio de 2011 (J. Sagardía). En Tenerife, datos que complementan el censo efectuado por SEO/BirdLife. En una charca en El Pinque, Adeje, tres ejemplares (dos adultos y un inmaduro) el 17 de marzo de 2011 (R. Barone, J. Caddick y C. Caddick), y un grupo de 10-11 individuos el 16 de abril de 2011, de los que al menos siete eran inmaduros o juveniles y uno adulto (R. Barone y A. Arbelo). Además, en otro enclave, en la presa de Machado, El Rosario, un adulto el 15 de abril de 2011 (R. Barone, B. Pérez, M. Molina y M. Bohórquez). Datos de la localidad de cría de Tejina y Bajamar, La Laguna, donde el 14 de octubre de 2011 hay unos siete ejemplares (5 adultos, un juvenil y un probable inmaduro) vistos al atardecer abandonando una de las charcas (R. Barone, A. Arbelo, M. Fernández del Castillo y V. R. Cerdeña). En esta misma isla, nuevos enclaves de cría, uno de ellos en el Puerto de la Cruz, donde se detecta un adulto el 14 de agosto de 2011, y un subadulto y un juvenil que apenas vuela el 15 de agosto de 2011 en jardines con estanques cerca del parque Taoro (J. A. Lorenzo y A. B. Frago). El otro en los jardines de un núcleo zoológico en el sector de Chayofa, Arona, donde se recoge un pollo debilitado el 31 de julio

de 2011 que es entregado en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla del Cabildo de Tenerife (C. Méndez), y se detecta un juvenil el 21 de agosto de 2011 (N. Herrera y B. González). Estas últimas fechas de cría son tardías para lo que cabe esperar, y complementan el censo efectuado por SEO/BirdLife dado que se trata de nuevas localidades de reproducción (véase Lorenzo, 2007 y referencias allí dadas). En La Palma, en la primavera y verano de 2011, en sendas charcas de riego de La Costa y Cabrejas, Tazacorte, un ejemplar adulto del 16 al 23 de abril, un adulto y un juvenil el día 24 y un adulto el 29 de abril de 2011; en las mismas charcas, un adulto y juvenil el 9 de mayo, mientras que el 24 de dicho mes se levantan las dos aves y se unen otras dos, alejándose las cuatro hacia la costa; en junio, en varias fechas entre el 6 y el 28, sólo se detecta un juvenil, mientras que en julio, del 2 al 31 se sigue detectando uno, aunque el día 2 de julio de 2011 fueron dos los juveniles presentes en una de las charcas (R. Burton).

#### **GARCILLA CANGREJERA**


##### *Ardeola ralloides*

Reproducción en Extremadura, donde en 2011 se localizan nueve nidos en cinco localidades: embalse de Arrocampo, Cáceres, cuatro parejas (J. Prieta); embalse de Alqueva, Badajoz, dos nidos (E. Costillo); embalse de Montijo, Badajoz, dos nidos (E. Costillo); y embalse de Orellana, Badajoz, una pareja con dos pollos (Á. L. Sánchez, B. Cienfuegos, D. Rivera, P. J. García y P. Gasco). Primera reproducción en Albacete: una pareja en la laguna de Pétrola, del 21 de mayo al 15 de julio de 2011, se observan entradas a la vegetación palustre y en julio cebas al menos a un pollo (R. Torralbo). Un ejemplar en la laguna Grande de Puebla de Beleña, Guadalajara, el 25 de mayo de 2011 (J. Fernández García). Un ejemplar en la balsa de Arkaute, Salburua, Vitoria-Gasteiz, el 29 de mayo de 2011 (B. Torrecilla, I. Fernández de Quincoces y B. Fernández). Un adulto en la laguna de Meco, Madrid, el 3 de junio de 2011 (C. Talabante y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente/UAH). Un ejemplar en la laguna de Lanchares, Campoo de Yuso, Burgos, el 10 de junio de 2011 (Equipo de Guías de la

RENPCAN). Tres aves en vuelo en periodo de reproducción en la laguna de los Prados, Málaga, el 14 de junio de 2011 (E. Alba y J. Alba). Un adulto nupcial posado en la colonia de garcillas bueyeras y martinetes de la laguna Villadangos del Páramo, Villadangos del Páramo, León, el 10 de julio de 2011 (M. Juan y D. Miguélez).

*Corrección:* La cita correspondiente a la laguna de Fuente (*Ardeola*, 58 (1): 200) debería aparecer como un ejemplar en plumaje nupcial en la laguna Fuente, Revellinos, Zamora, el 25 de mayo de 2010 (T. Sanz y J. M. San Román), todavía presente el día 27 de mayo (J. M. San Román).

**Canarias.** Datos del paso prenupcial: en Gran Canaria, el 30 de abril de 2011 en la cola del embalse de la Angostura, Ayagaures de Abajo, San Bartolomé de Tirajana, se detecta un ejemplar adulto (D. Trujillo). En Tenerife, un ejemplar adulto en una de las charcas terrosas de Tejina-Bajamar, La Laguna, el día 21 de abril de 2011 (R. Barone y A. Arbelo). En La Palma, donde ha venido detectándose con regularidad los últimos años (véase *Ardeola*, 57: 521), en sendas charcas de riego de Cabrejas y La Costa, Tazacorte, un



**Garcilla cangrejera** *Ardeola ralloides*. Tazacorte (La Palma). Foto: Robert Burton.

ejemplar los días 15 y 16 de abril, dos aves el 17 de dicho mes y una del 18 al 29 de abril de 2011, viéndose de nuevo allí el 9 de mayo de 2011 (R. Burton). En una de esas charcas se vuelve a observar una del 4 al 29 de junio de 2011, dos aves el 2 de agosto y una el 8 de agosto de 2011, así como por último una en una charca de riego en Dos Pinos, Los Llanos de Aridane, del 18 al 23 de octubre de 2011 (R. Burton).

### **GARCILLA BUEYERA**

#### *Bubulcus ibis*

---

Censo en dormitorio: 4.562 individuos en la Gravera Valdefuentes, Galisteo, Cáceres, el 26 de septiembre de 2011 (J. Prieta).

**Canarias.** En Tenerife, cifra poco habitual en Tejina-Bajamar, La Laguna, contándose un total de 25 ejemplares que llegan al atardecer a una de las charcas el 14 de octubre de 2011 (R. Barone y A. Arbelo). En La Gomera, donde hay pocos datos, un adulto en el parque de la Torre del Conde, San Sebastián de La Gomera, el 28 de junio de 2011 (R. Jorge Díaz). En La Palma, una posada en el muro de una charca de riego en Los Cardonales, Tazacorte, el 8 de septiembre de 2011, y otra en una charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, el 10 de octubre de 2011 (R. Burton).

### **GARCETA GRANDE**

#### *Egretta alba*

---

Un ave en la balsa de Obécuri, condado de Treviño, Burgos, el 13 de diciembre de 2009 (G. Belamendia y A. Sáenz de Santamaría). Cuatro aves en el lucio del Lobo, Doñana, Sevilla, el 11 de junio de 2011 (F. Chiclana). Reproducción en Cáceres: dos parejas con indicios de cría en el embalse de Arrocampo en junio y julio de 2011 (J. Prieta). Concentraciones en Extremadura en 2011: 15 ejemplares en arrozales de Campo Lugar-Palazuelo, Cáceres-Badajoz, el 7 de octubre (S. Fletcher); más de 25 aves en el embalse de Los Canchales, Badajoz, el 9 de octubre (A. Cangas, A. Garrote, Á. Sánchez y E. del Viejo) y 29 ejemplares en Charco Salado, Casatejada, Cáceres, el 13 de octubre, se trata del mayor grupo citado en Extremadura (S. Mayordomo). Concentraciones

destacables en la albufera de Valencia en 2010: hasta 67 aves en las zonas inundadas del marjal entre el barranco de Catarroja y el tancat de La Ratlla, Silla, el 25 de febrero (C. Oltra); al menos 72 aves en zonas inundadas de Catarroja y Silla, el 6 de marzo (D. Hegedüs y B. Dies) y hasta 64 aves en zonas inundadas del marjal de Catarroja (B. Dies). Hasta 22 ejemplares en el arrozal del marjal de Alfafar, albufera de Valencia, el 14 de febrero de 2011 (T. Pérez). Hasta 53 aves en zonas inundadas del marjal de Catarroja, tancat de Naia, albufera de Valencia, el 5 de marzo de 2011 (B. Dies). En Asturias, en la ría de Villaviciosa, 21 aves el 16 de septiembre de 2011 (A. Villaverde). Se cuentan 56 individuos en Plaiaundi, Irún, Guipúzcoa, el 27 de septiembre de 2011 (H. González Arzelus). Hasta 42 ejemplares en el embalse de Ricobayo, Zamora, el 1 de octubre de 2011 (V. Salvador). Diez aves en las marismas de Santoña, Cantabria, el 21 de septiembre de 2011 (A. García Herrera). En Lugo, 13 individuos en la ría de Foz, el 31 de octubre de 2011 (R. Hevia).

### **GARZA REAL**

#### *Ardea cinerea*

---

La mayor colonia registrada en Extremadura: 185 nidos ocupados en la isla del embalse de El Borbollón, Cáceres, el 12 de abril de 2011 (J. Montero, J. Prieta y S. Mayordomo). Nueva colonia de cría en la provincia de León: en una colonia de cigüeña blanca en Burón, en una cola del embalse de Riaño, situada sobre grandes cedros *Cedrus* sp. se instalan tres parejas en 2010, que sacan adelante 3, 2 y 1 pollos respectivamente; en 2011 son al menos cuatro (posiblemente cinco) las parejas que ocupan nido (F. Moreno, F. Carcedo y T. Sanz). Colonia en Boadilla de Rioseco, Palencia, sobre *Populus canescens*, *P. alba* y *Ulmus minor*, en un pequeño soto rodeado de cultivos de cereal y leguminosas de secano. Llevan criando en esta localidad al menos desde el año 2008 y en la temporada 2011 y 2010 se pudieron contabilizar 11 nidos (C. González Villalba). Reproducción en 2011 en la laguna de Bayas, Miranda de Ebro, Burgos: primera colonia de la provincia, con tres nidos que han sacado adelante cuatro pollos el 5 de mayo (D. Martínez Andrade, G. Ruiz del Río y J. L. Lobo).

**GARZA IMPERIAL***Ardea purpurea*

Primera reproducción en la provincia de Burgos: en la laguna de Bayas, Miranda de Ebro, el 24 de julio de 2011 se observa a un joven emplumado pero todavía con las fundas blancas que envuelven las plumas (J. L. Lobo, D. Lobo y A. Lobo).

**Canarias.** En Tenerife, el 13 de abril de 2011, se detectan siete ejemplares que llegan en vuelo y se posan en una charca de riego en Granadilla de Abona (A. Hernández) y ese mismo día se observan cuatro en vuelo con dirección noroeste sobre Adeje (P. Abbott). Esos mismos días, pero en La Palma, en concreto en las charcas de Las Martelas, Los Llanos de Aridane, se observa una entre el 16 y el 20 de abril de 2011, aunque el día 19 se vieron dos ejemplares en dicho lugar (R. Burton). En Tenerife se detecta un adulto en una de las presas de El Pinque, Adeje, el 8 de mayo de 2011 (R. Barone, M. Fernández del Castillo, J. Vizcaíno y V. R. Cerdeña), y un inmaduro en una de las charcas terrosas de Tejina y Bajamar, La Laguna, el 5 de agosto de 2011 (R. Barone y B. Fariña). Con posterioridad, un inmaduro en El Fraile, Arona, el 17 de septiembre de 2011 (N. Trujillo).



**Garza imperial** *Ardea purpurea*. Arona (Tenerife). Foto: Nicolás Trujillo (Endemic Foto).

*Ardeola* 58(2), 2011, 481-516

**CIGÜEÑA NEGRA***Ciconia nigra*

Censo aéreo en Extremadura, días 23 y 24 de septiembre de 2011: total de 90 ejemplares, 8 en el río Aljucén, Badajoz (Á. Fernández), 26 en el río Tiétar, Cáceres y embalse de Rosarito, Ávila (J. Mahillo), 11 en el arroyo Guadarrojo, Cáceres (S. Mayordomo), y 45 en el río Gadiana, embalse de Orellana, Badajoz (C. Clemente). Un ave en Mioño, Cantabria, el 22 de abril de 2010 (S. Alarcón).

**Baleares.** Un ave en la isla de Sa Conillera, Sant Josep de sa Talaia, Ibiza, el 24 de abril de 2010 (A. López/AOB).

**CIGÜEÑA BLANCA***Ciconia ciconia*

En Cáceres, en mayo de 2011: colonia con 130 nidos en el entorno del vertedero de Mirabel, 82 en encinas y 48 en un tendido de alta tensión (J. Prieta) y otra colonia con 150 nidos estimados en el embalse de Valdesalor (J. Jaén).

**IBIS SAGRADO***Threskiornis aethiopicus*

Observaciones en la Comunidad de Madrid: cuatro ejemplares en Sotomayor, Algete, el 5 de abril de 2011 (G. Doval) y quizás los mismos en el embalse de Pedrezuela el 8 de abril de 2011 (J. Salas). Un ejemplar en las lagunas de Belvis del Jarama, Madrid, el 31 de mayo de 2011 (G. Doval).

**MORITO COMÚN***Plegadis falcinellus*

Se confirma la reproducción de al menos tres parejas en la albufera de Valencia en 2010 (en este humedal se llegó a reproducir en 1993 y 1994 con 1-2 parejas): el 21 de julio se observan grupos familiares en diferentes lugares de la Albufera. Así en arrozales se observan grupo de adultos con al menos tres y dos jóvenes y una pareja con un joven alimentándose en los filtros verdes de la R. N. de Milia, Sollana, y a primeras horas de la mañana, grupo de 17 aves sobrevolando el tancat de Zacarés, Sollana (P. Vera, M. Rebassa, M. Gaja,



**Ibis sagrado** *Threskiornis aethiopicus*. Sotomayor, Algete (Madrid). Foto: Guillermo Doval.

B. Dies y A. Guillém). Cifras de interés en la albufera de Valencia: durante el mes de febrero de 2011 se cuentan un número destacable de ejemplares alcanzando el 1 de marzo de 2011 la mayor cifra registrada hasta el momento de 388 ejemplares en 4 grupos a lo largo del Tancat de la Sardina, Catarroja (P. Vera). Dos aves en el saladar de Los Canos, Almería, el 1 septiembre de 2011 (J. L. Pérez Tornell). Observación de 26 individuos en Santander, Cantabria, el 1 de octubre de 2011 (F. González). Grupo de 22 aves en Salburúa, Vitoria, Álava, el 2 de octubre de 2011 (L. Lobo). Un ave en campos de arroz de la Herrerueta, Cáceres, el 1 y 3 de octubre de 2011 (P. Soper). Un individuo en la laguna de Sentiz, Valdepolo, León, el 1 de octubre del 2011 (J. Á. Arriola González).

**Canarias.** En Lanzarote, uno en el campo de golf de Tías el 10 de septiembre de 2011 (F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos).

#### **ESPÁTULA COMÚN** *Platalea leucorodia*

Durante el paso prenupcial un grupo de 21 aves vuelan en dirección norte y hacen intento de cruzar el puerto de Somosierra, Madrid-Segovia, muy nuboso y con viento moderado, el 17 de marzo de 2011 (B. Molina). Se cuentan 700 individuos en Plaiiandi, Irún, Guipúzcoa, el 17 de septiembre de 2011 (J. L. Gómez). Recuento de 128 aves en Castro Urdiales, Cantabria, el 18 de septiembre de 2011 (J. Menéndez). En el seguimiento del paso postnupcial en Santoña, Cantabria, se cuentan en

el mes de septiembre de 2011 un total de 2.500 ejemplares, con el máximo de 410 aves el 17 de septiembre (GRUSEC). Concentraciones en Extremadura, máximos por localidad en el paso postnupcial de 2011: en Charco Salado, Casatejada, Cáceres, 113 ejemplares el 20 de agosto, la mayor concentración conocida en la provincia de Cáceres (C. Clemente y J. Mahillo); 33 individuos en el embalse de Portaje, Cáceres, el 11 de agosto (E. Palacios y S. Mayordomo); en el embalse de Los Canchales, Badajoz, 86 ejemplares el 5 de septiembre (A. Núñez); en El Ancho, Arroyo de la Luz, Cáceres, 80 aves el 11 de septiembre (R. Parra); 44 ejemplares en la Laguna Grande de La Albuera, Badajoz, el 15 de septiembre (J. Guerra y M. Gálvez) y 42 aves en el embalse de Talaván, Cáceres, el 16 de septiembre (S. Mayordomo). Nuevas localidades de cría en la provincia de Cáceres: una colonia con 12 nidos estimados en alcornoques en el valle del Tiétar, el 4 de mayo de 2011 (J. Prieta), otra con tres nidos ocupados en el valle del Alagón el 20 de mayo de 2011, aunque en visitas posteriores se aprecia que no inician la cría (C. Clemente, J. Mahillo y S. Mayordomo), y una tercera con un nido ocupado por dos adultos en el embalse de El Borbollón el 8 de junio (J. Prieta, S. Mayordomo, J. Martín, J. Mahillo y J. Montero). Nuevo lugar de cría en la provincia de Cádiz: se observan dos pollos de unas cuatro semanas de edad ya fuera del nido que eran alimentados por uno de los padres en el interior de una colonia de ardeidas (martinetes, garcillas bueyeras y garceta común) el 2 de junio de 2011; la pareja de espátulas se encontraban en un tarajal situado en medio del cauce del río Guadalete, rodeado de eucaliptos en los márgenes, en la Barca de la Florida, Jerez de la Frontera (F. Hortas, M. Barcel y J. R. Benítez). Dos individuos en la laguna Grande de Puebla de Beleña, Guadalajara, el 25 de mayo de 2011 (J. Fernández García).

**Canarias.** En Tenerife, un ejemplar inmaduro en vuelo sobre la zona de Tejina y Valle de Guerra, La Laguna, el 21 de abril de 2011 (R. Barone y A. Arbelo), podría corresponder a una de las aves presentes en esa zona en los meses invernales previos (*Ardeola*, 58: 201-202). En las islas más occidentales, donde no es tan regular su presencia: en La Gomera, en bajíos de playa del Inglés, Valle Gran Rey, el 29 de septiembre de 2011 se observa un

ejemplar juvenil alimentándose en charcos de la zona intermareal (C. González), mientras que en La Palma, en las Salinas de Fuencaliente, se citan dos ejemplares el 19 de octubre de 2011 (R. Burton).

#### FLAMENCO COMÚN

##### *Phoenicopterus roseus*

---

Pequeño influjo en Extremadura, entre agosto y octubre de 2011: un adulto en el embalse de Arrocampo, Cáceres, el 23 de agosto (J. Prieta); un joven en el embalse de Valdecañas, Cáceres, el 8 de septiembre (E. Palacios y S. Mayordomo), donde semanas después se encuentra el cadáver de un flamenco en la orilla (Á. Sánchez); en el embalse de Los Canchales, Badajoz, dos aves el 9 de septiembre (E. del Viejo), tres el 24 de septiembre (Á. Sánchez, D. Rivera y J. Fernández) y una el 9 de octubre (A. Cangas, A. Garrote, Á. Sánchez y E. del Viejo); en la charca de Torrealba, Torremocha, Cáceres, tres juveniles el 26 y uno el 30 de septiembre, el 1 de octubre y el 5 de octubre (S. Mayordomo, J. P. Prieto, A. Maestre y J. J. Espinigoitia); el 1 de octubre se observan dos individuos en Sierra de Fuentes, Cáceres (A. Maestre y J. J. Espinigoitia); cuatro aves en El Ancho, Arroyo de la Luz, Cáceres, el 6 de octubre (R. Parra); y un ejemplar en Robledillo de Trujillo, Cáceres, el 8 de octubre (S. Fletcher). Un ave en el embalse de El Pardo, Madrid, el 25 de septiembre de 2011 (J. Ortega y J. L. Blas). Un juvenil en el río Ebro, a su paso por Zaragoza capital, el 15 de septiembre de 2011 (R. Pérez). En el embalse de Rosarito, Ávila-Toledo, 13 aves (12 juveniles y un adulto) el 21 de agosto, cinco aves el 9 de septiembre y sólo dos el 20 de septiembre de 2011 (J. P. Resino, S. Langlois y D. Langlois). En la laguna de Pétrola, Albacete, 800 ejemplares el 12 de abril y 329 el 13 de agosto de 2011 (R. Torralba). Un ejemplar en Alcañiz, Teruel, el 8 de abril de 2011 y días anteriores (F. J. Márquez).

#### ELANIO COMÚN

##### *Elanus caeruleus*

---

En Cataluña, tras el excelente año de 2010, en la primavera de 2011 sólo se localizan algunos ejemplares sin territorio hasta el 12 de abril de 2011 (M. Gálvez). Un ejemplar en la laguna de

Fuente de Piedra, Málaga, el 1 de octubre de 2011 (J. M. González Cachinero).

#### **BUITRE LEONADO**

*Gyps fulvus*

---

**Baleares.** En Mallorca resultó una media de 53 ejemplares según el censo realizado en la sierra de Tramuntana los días 13 y 14 de noviembre de 2010 (J. Muntaner, C. Viada, Natura Parc, BVCF y GOB/AOB).

#### **BUITRE NEGRO**

*Aegypius monachus*

---

Avistamientos en la provincia de León: uno en Noceda de Cabrera el 19 de mayo de 1999 (J. García); un ejemplar en Teijeira el 23 de mayo de 2000 (J. García); un ave en Mirantes de Luna, León, el 27 de junio de 2002 (J. García) y un ave en Marañá el 2 de julio de 2002 (J. García). Se recoge un ejemplar desnutrido, deshidratado y exhausto en el aeropuerto de Bilbao el 5 de septiembre de 2011 (F. Pinto, Á. de Pazo y L. Bilbao/Servicio de Control de Fauna del Aeropuerto de Bilbao).

#### **CULEBRERA EUROPEA**

*Circaetus gallicus*

---

**Baleares.** Donde es un migrante raro, se registraron cinco observaciones en Mallorca durante el paso prenupcial en 2010: la primera observación tuvo lugar el 28 de marzo en Sineu (M. Rebas-sa/AOB) y la última en Son Bugadelles, Calvià, el 21 de abril (G. Bernat/AOB). Durante el paso postnupcial de 2010 hubo 11 observaciones con un total de 22 ejemplares. El primer avistamiento fue un ave en la sierra de Na Burguesa, Palma, el 5 de julio (M. Cabalga/AOB) y el último un ave en Artà el 13 de noviembre (P. Vicens/AOB). Destacó la cifra de un grupo de siete aves en Calvià el 17 de julio (P. A. Garnett/AOB) y otro de tres ejemplares en el llano de Lanzell, Vilafranca, el 6 y 8 de septiembre (L. Ventoso/AOB).

#### **AGULUCHO LAGUNERO OCCIDENTAL**

*Circus aeruginosus*

---

Nueva localidad de cría y primera de la cuenca del Alagón, Cáceres: una pareja saca adelante al

menos a un joven en la laguna de Galisteo, vistos el 27 de julio de 2011 (S. Mayordomo).

#### **BUSARDO RATONERO**

*Buteo buteo*

---

Durante la primavera de 2011 se detectaron dos parejas nidificando en una misma línea de alta tensión; los nidos estaban distanciados unos 5 km, instalados en un área muy deforestada y dominada por los cultivos cereales de secano entre las provincias de Zamora y Valladolid. Una de las parejas se instaló en un nido viejo de cuervo durante varias semanas, pero sin éxito reproductor su nido fue finalmente aprovechado por una pareja de cernícalos vulgares. En el segundo nido, del cual se desconoce si era una antigua plataforma arreglada, se observaron dos pollos muy desarrollados el 28 de mayo; al menos una pareja podría haber criado en temporadas anteriores (J. Talegón).

**Baleares.** En Mallorca, donde hay indicios desde hace cuatro años de reproducción en la zona de Esporles: se observa un máximo de cinco ejemplares en el Pa de Figa de Son Antic, el 23 de marzo de 2010, al menos dos de ellos defendiendo territorio frente a unos cuervos, donde previamente la semana anterior se pudo observar a la pareja copulando (J. Adrover y J. M. Tapia/AOB); mientras que en la zona del monte de Galatzó, se avista un joven el 15 de agosto de 2010 (G. Rius/AOB).

#### **ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA**

*Aquila adalberti*

---

Un inmaduro en Candanos, Huesca, el 1 de junio de 2011, corresponde a un área con abundancia de conejo (A. Bueno), al final del día se vuelve a localizar en un paraje cercano a la carretera de Ontiñena a Candanos; las observaciones en Aragón se han incrementado en los últimos años (Bueno, 2010). Dos juveniles en el paraje Entrerríos, Mijas-Costa, Málaga, el 23 de septiembre de 2011 (B. López). Un ave cerca de Villalpando, Valladolid, el 30 de septiembre de 2011 (J. Sagardía). Un joven entre Villarrín de Campos y Villafafila, Zamora, el 6 de octubre de 2011 (A. Rodrigo). Un ejemplar del año en Carrascosa de la Sierra, Cuenca, el 15 de octubre de 2011 (D. Molina).

**AGUILILLA CALZADA***Hieraetus pennatus*

Un individuo integrado en un grupo de milanos reales en los alrededores de Cuéllar, Segovia, el 25 de enero de 2009 (Y. Borremans).

**ÁGUILA PESCADORA***Pandion haliaetus*

Un individuo adulto en el río Ebro, en Zambrana, Álava, el 26 de junio de 2011 (J. M. Fernández García y N. Ruiz de Azua).

**CERNÍCALO PRIMILLA***Falco naumanni*

Censos en dormideros premigratorios en Extremadura: en un dormidero de La Vera, Cáceres, se censan 368 aves el 3 de agosto de 2011 y 483 el día 24 de agosto (J. Prieta) y se estiman 1.000 ejemplares a mediados de agosto (P. Gómez); en un dormidero del centro de la provincia de Badajoz se censa un mínimo de 2.950 ejemplares y se estiman 3.500-4.000 el 30 de agosto de 2011 (Á. Sánchez y 15 colaboradores de DEMA y Junta de Extremadura). Un juvenil colisiona con una aeronave en las pistas del aeropuerto de Bilbao, Vizcaya, el 31 de julio de 2010; hasta esa fecha fueron capturados cuatro juveniles (F. Pinto, Á. de Pazo y L. Bilbao/Servicio de Control de Fauna del Aeropuerto de Bilbao).

**Baleares.** En Menorca, 11 ejemplares posados sobre un cable eléctrico en Lluriac Vell, Es Mercadal, el 26 de abril de 2010 (R. Triay/AOB). En Mallorca, en el paso prenupcial se observan en Maria de la Salut, el 12 de mayo de 2010, 7 ejemplares, y el 24 de mayo, 2 ejemplares (M. Rebassa, J. Manchado, C. Artigues y A. Muñoz/AOB) y un máximo de 4 machos y 4 hembras los días 20 y 21 de mayo (J. Amengual y M. Rebassa/AOB). Un ejemplar en el llano de Lanzell, Vilafranca, el 7 de septiembre de 2010 (J. J. Bazán/AOB).

**CERNÍCALO PATIRROJO***Falco vespertinus*

Una hembra en As Pontes, A Coruña, del 21 al 30 de mayo de 2011 (J. L. Vizoso). En Zamora, un

macho de segundo año en Villafáfila, Zamora, del 30 de abril al 3 de mayo de 2011 (A. Rodrigo, F. Pereira, J. A. Hernández Rodríguez y M. I. Martín) y un macho en una zona esteparia en Peñausende, el 9 de julio de 2011 (J. J. Ramos Encalado). En Palencia, una hembra de segundo año en Celadillo del Río, el 4 de junio de 2011 (R. Félix y H. Félix) y un ave en Autilla de Campos el 22 de julio de 2011 (F. Jubete). En Burgos, un macho de segundo año en Guadilla de Villamar el 21 de abril de 2011 (D. González) y un macho en Hontoria del Pinar el 17 de mayo de 2011 (L. E. Molina). Una hembra de segundo año en Almenar de Soria, Soria, el 15 de mayo de 2011 (J. L. Hernández). Un ejemplar en Las Bárdenas, Navarra, el 14 de mayo de 2011 (M. Escudero). En Albacete, una hembra en Alpera, el 23 de mayo de 2011 (D. Cañizares) y seis ejemplares (dos machos, dos hembras y dos inmaduros) en Higuera, entre el 18 y el 23 de mayo de 2011 (R. Torralbo). Una hembra de segundo año en La Puebla, Ciudad Real, los días 24 de mayo (F. Mougueiocit) y 12 de junio de 2011 (M. J. Valencia). Un macho en Sagunto, Valencia, el 10 de septiembre de 2011 (V. Beltrán).

**ESMEREJÓN***Falco columbarius*

**Baleares.** Datos de invernada en la albufera de Mallorca en 2010: un ejemplar el 12 de enero, un macho el 27 de febrero, un ave el 6 de diciembre y una hembra el 29 de diciembre (J. Muntaner, M. Rebassa, P. Vicens, N. Riddiford, L. Ventoso, S. Quintanilla y M. Vara/AOB). En Menorca, un ave vista en Lluriac, Es Mercadal, el 24 de enero de 2010 (S. Catchot/AOB). Un macho adulto en el cabo de Ses Salines, Santanyí, Mallorca, el 13 de marzo de 2010 (M. Rebassa y L. Ventoso/AOB). En Menorca, una hembra vista en Lluriac, Es Mercadal, el 28 de marzo (A. Pons/AOB). En la albufera de Mallorca, un ave el 30 de marzo de 2010 (J. Muntaner, M. Rebassa, P. Vicens, N. Riddiford, L. Ventoso, S. Quintanilla y M. Vara/AOB). Durante el paso postnupcial, un ejemplar el 29 y 30 de septiembre, un individuo el 8, 10, 12 y 21 de octubre (J. Muntaner, M. Rebassa, P. Vicens, N. Riddiford, L. Ventoso, S. Quintanilla, M. Vara/AOB) y una hembra del 15 al 27 de oc-

tubre (L. Ventoso, S. Quintanilla y M. Vara/AOB). Un ave en cabo de Ses Salines, Santanyi, Mallorca, el 13 de octubre de 2010 (L. Ventoso, S. Quintanilla y M. Vara/AOB). En Cabrera, un ejemplar los días 13, 15 y 26 de octubre de 2010 (E. Amengual y D. Cuenca/AOB). Un ejemplar observado en el aeropuerto, Maó, Menorca, entre el 23 de noviembre y el 24 de diciembre de 2010 (B. Esteban/AOB). Un ejemplar en el Prat de Sant Jordi, Palma, el 12 de diciembre de 2010 (L. Ventoso, S. Quintanilla y G. Bernat/AOB). Un ejemplar cazando una *Calandrella brachydactyla* en el llano de Lanzell, Vilafranca, el 19 de diciembre de 2010 (L. Ventoso y S. Quintanilla/AOB).

#### ALCOTÁN EUROPEO

*Falco subbuteo*

**Canarias.** En Lanzarote, uno en los llanos de Famara, Teguiuse, el 2 de junio de 2011 (J. Sagardía). En Fuerteventura, un inmaduro en la Rosa de Catalina García, Tuineje, el 18 de mayo de 2011, y un adulto en el Llano de la Vega Vieja, Antigua, el 27 de mayo de 2011 (M. Cabrera).

#### HALCÓN DE ELEONORA

*Falco eleonora*

En Matamala de Almazán, Soria, hasta 22 ejemplares entre el 19 de junio y el 3 de julio de 2011 (D. Fernández-Alonso, J. Ruiz y J. L. Hernández). En Portillo, Valladolid, 16 ejemplares el 19 de junio y 40 aves el 20 de junio de 2011 (J. Sagardía). Hasta 19 ejemplares en Chillarón, Cuenca, el 16 de junio de 2011 (M. Santa Cruz). Primera observación en la provincia de León: dos adultos de morfo oscuro en el arroyo Valcabadiello, Ocejo de la Peña, León, el 13 de junio de 2011 (J. García). Un ave de morfo oscuro en Almeida de Sawayo, Zamora, el 10 de julio de 2011 (J. J. Ramos Encalado). Un ejemplar de morfo claro sobre un melojar al sureste del azud de la Aldehuela, Narros de Matalayegua, Salamanca, el 13 de julio de 2011 (J. J. Ramos Encalado). Un ejemplar en Albacete del 1 al 19 de octubre de 2011 (Á. Díaz Pastor, R. Torralbo y M. Llorente).

**Canarias.** En El Hierro, donde aparece con regularidad: adulto de fase oscura en San Andrés, Valverde, el 16 agosto 2011 (M. Díaz).

#### HALCÓN PEREGRINO

*Falco peregrinus*

En un nido de halcón peregrino en un tendido eléctrico se observa un pollo de cernícalo vulgar criado por ambos halcones, en Puente Genil, Córdoba en el año 2011 (F. Muñoz).

#### POLLUELA PINTOJA

*Porzana porzana*

En Asturias, un ave en El Cierrón, Villaviciosa, el 3 de abril de 2011 (J. Zaldívar) y otro en Tapia de Casariego, Asturias, el 10 y el 13 de abril de 2011 (G. Sánchez Jardón y P. Fernández). Durante el paso postnupcial un ejemplar en Villadún, Castropol, los días 28 y 29 de octubre de 2011 (J. M. Alonso). En Cantabria, un individuo en Joyel, Arnuero, el 16 de abril de 2011 (E. Villodas) y otro en Cuchía el 17 de abril de 2011 (F. J. Portillo). En Sevilla, en el Brazo del Este, Puebla del Río, un ejemplar el 10 de abril de 2011 (F. Chiclana) y una hembra o juvenil el 26 de julio de 2011 (A. Savijn y D. Muñoz).

**Canarias.** En Lanzarote, una en el campo de golf de Tías el 15 de abril de 2011 (F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos), y otra el 14 de septiembre (D. Pérez) así como el 16 de septiembre (F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos) y el 19 de septiembre de 2011 (A. Unquiles Cobos); este ejemplar estaba aún allí los días 23 y 28 de octubre de 2011 (F. J. García Vargas).

#### POLLUELA BASTARDA

*Porzana parva*

Un macho en la laguna de Sariñena, Huesca, el 3 de abril de 2011 (J. Lavedán). Un individuo en el río Gargáligas, Badajoz, el 8 de abril (J. Muddeman) y el 13 de abril de 2011 (S. Fletcher). Uno en el Brazo del Este, Sevilla, el 29 de julio de 2011 (R. Romero). Una pareja en los Aiguamolls del Ampurdán, Girona, el 9 de abril de 2011 (A. Rodríguez y L. Hernández). Tres ejemplares en la isla de Buda, delta del Ebro, Tarragona, el 15 de mayo de 2011 (D. Bigas). Un juvenil en Villa Bráquina, Valladolid, el 2 de octubre de 2011 (C. Osorio). Un macho en las Tablas de Alarcos, Ciudad Real, el 1 de mayo de 2011 (X. Piñeiro).

**Baleares.** Un macho en la albufera del Grau, Maó, Menorca, el 25 de marzo de 2010 (J. Florit/AOB). Un macho en las lagunas de Lluriac y Tirant, Es Mercadal, Menorca, los días 2, 4 y 5 de abril de 2010 (A. Pons/AOB).

#### POLLUELA CHICA

##### *Porzana pusilla*

Dos machos en Tablas de Alarcos, Ciudad Real, el 29 de junio de 2011 (X. Piñeiro). Un individuo en Almeida de Sayago, Zamora, el 10 de julio de 2011 (J. J. Ramos Encalado). En Sevilla, en Puebla del Río, un individuo en el Brazo del Este, el 6 de agosto de 2011 y un joven del año en los arrozales de Isla Menor, el 3 de septiembre de 2011 (F. Chiclana).

**Baleares.** Un individuo desorientado en la plaza del Born, Ciutadella, Menorca, el 3 de octubre de 2009; es entregado al Centre de Recuperació de la Fauna Silvestre del GOB (P. Pons/AOB).

#### GALLINETA COMÚN

##### *Gallinula chloropus*

**Canarias.** En Tenerife, nueva localidad de cría, en jardines de un núcleo zoológico en el sector de Chayofa, Arona, donde el 11 de agosto de 2011 hay una pareja construyendo un nido (J. L. Rodríguez Luengo). En La Gomera, nuevas localidades de cría: el 15 de agosto de 2010 en la presa de Los Tiles, El Cedro, Hermigua, se observa un pollo de pocos días y un adulto; el 16 de agosto de 2010 en la presa de Cardones, Alajeró, hay cuatro adultos, dos juveniles y un pollo de dos semanas, y en la presa del mirador del Santo, Arure, se detecta un pollo bastante crecido solicitando alimento a un adulto; en este mismo embalse, el 6 de agosto de 2011 se observa un adulto con cuatro pollos de cuatro o cinco días y un juvenil. Por último, el 6 de agosto de 2011 en el embalse de Mulagua y en el de Cañada de la Vieja, Hermigua, se observan, respectivamente, un adulto con un pollo de mediano tamaño y dos adultos con un pollo de unos 10 días (D. Trujillo). En esta misma isla se detecta un comportamiento inusual el 6 de agosto de 2011 en el embalse de Arure, Quintana, cuando dos pollos de unos 10 días son alimentados por un adulto de esta especie y por una focha

común (D. Trujillo). Además, durante un censo otoñal entre el 24 y 26 de octubre de 2011 se cuentan un total de 94 ejemplares repartidos de la siguiente forma: La Encantadora, 13 aves; Macayo, dos; Las Rosas, Amalahuigue, ocho; la Atalaya, uno; La Palmita, Agulo, cuatro; Mulagua, dos; Cañada de la Vieja, cuatro; Lomo Fragoso, siete; Chejelipes, siete; Izcagüe, ocho; Palacios, nueve; La Laja, dos; Cardones, 10; Antoncojo, 10; montaña Farián, uno; mirador del Santo, Arure, dos, y Arure, Quintana, cuatro aves (D. Trujillo). En La Palma, nueva localidad de cría fuera del área tradicional de Tazacorte y Los Llanos de Aridane; el 20 de julio de 2011 en un estanque de La Estrella, Breña Alta, se observa un adulto con dos pollos grandes y seis pollos recién nacidos, mientras que el otro miembro de la pareja se encuentra en un nido ubicado en un escalón de dicho depósito incubando un huevo a punto de eclosionar (D. Trujillo).

#### CALAMÓN COMÚN

##### *Porphyrio porphyrio*

Nuevas localidades de cría en la provincia de Cáceres: primera observación en el embalse de Talaván, un ejemplar el 30 de abril de 2011 (J. Guerra y M. Gálvez) y en Charco Salado, Casatejada, se observan dos adultos y dos pollos grandes el 26 de julio de 2011 (S. Mayordomo).

#### FOCHA COMÚN

##### *Fulica atra*

**Canarias.** En Gran Canaria, nueva localidad de cría: en el embalse del Parralillo, Artenara, el 1 de mayo de 2011 se observan cuatro adultos, uno de ellos incubando en un nido ubicado entre cañas y el otro miembro de esta pareja aportando material vegetal para la confección del nido (D. Trujillo). En Tenerife, dos parejas criando en las charcas de Cigüaña Alta, Granadilla de Abona, una de ellas con cuatro pollos de una semana como máximo y la otra ligada a un nido probablemente con huevos el 8 de mayo de 2011 (R. Barone, V. R. Cerdeña, M. Fernández del Castillo y J. Vizcaíno). En La Gomera, nueva localidad de cría: el 22 de mayo de 2011 en el embalse de Mulagua, Hermigua, se observan cinco adultos, dos pollos de mediano tamaño y un tercero más pequeño que

los anteriores que está siendo alimentado por un adulto (D. Trujillo). En esta misma isla, durante un censo otoñal entre el 24 y 26 de octubre de 2011 se cuentan un total de 102 individuos repartidos por presas y embalses de la siguiente manera: La Encantadora, 32 aves: Macayo, 7; Las Rosas, Amalahuigue, 13; La Palmita, Agulo, 2; Mulagua, 7; Cañada de la Vieja, 1; Chejelipes, 4; Izcagüe, 12; Palacios, 11; Cardones, 10; Antoncojo, 1, y Arure, Quintana, 2 aves (D. Trujillo). En La Palma, donde la mayor parte de los datos proviene de estanques y presas del área de Tazacorte y Los Llanos de Aridane (véase *Ardeola*, 57: 528-529), se detectan aves en la laguna de Barlovento, en concreto el 18 de octubre de 2011 hay siete aves, y seis cuatro días después (D. Trujillo).

#### FOCHA MORUNA

##### *Fulica cristata*

---

Un ejemplar en el río Vélez, Málaga, el 18 de julio de 2011 (F. Botella). Hasta cinco ejemplares en la laguna de Pétrola, Albacete, del 31 de agosto al 31 de octubre de 2011 (R. Torralba).

#### GRULLA COMÚN

##### *Grus grus*

---

Un individuo posado en el saladar de la Marina del Carmolí, Cartagena, Murcia, el 1 de febrero de 2011 (A. J. Hernández Navarro).

#### SISÓN COMÚN

##### *Tetrax tetrax*

---

Concentraciones en Extremadura en 2011: 250 ejemplares en un campo de alfalfa en Santa Amalia, Badajoz, el 6 de octubre (F. Yuste), 80 en Belén, Trujillo, Cáceres, el 25 de octubre (SEO-Cáceres) y 120 aves en Zorita, Cáceres, el 31 de octubre (Martin Kelsey).

#### OSTRERO EUROASIÁTICO

##### *Haematopus ostralegus*

---

En Cáceres, un ejemplar en el embalse de Arrocampo y posteriormente en Charco Salado, Casatejada, el 12 de octubre de 2011 (J. L. Guisado, M. García del Rey, P. Goñi y S. Mayordomo).

Tres aves (dos adultos y un juvenil) en el embalse de Ricobayo, Zamora, el 30 de agosto de 2011 (A. Rodrigo).

#### CIGÜEÑUELA COMÚN

##### *Himantopus himantopus*

---

**Canarias.** En La Palma, cuatro aves en una charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, entre el 15 y el 24 de abril de 2011, permaneciendo sólo dos de ellas entre el 29 de abril y el 9 de mayo de 2011 (R. Burton).

#### CANASTERA COMÚN

##### *Glareola pratincola*

---

Colonia de cría más septentrional de Extremadura: en el embalse de Valdecañas, Cáceres, se censan 43 adultos y 22 pollos el 20 de junio de 2011 (S. Mayordomo y J. Prieta). Un ejemplar en el embalse de Navalcán, Toledo, el 19 de junio de 2011 (J. P. Resino). Cinco individuos en la laguna Salina Grande, R. N. de las lagunas de Villafáfila, Zamora, el 15 de mayo de 2011 (J. A. Hernández Rodríguez y M. I. Martín Rodrigo).

#### CHORLITEJO CHICO

##### *Charadrius dubius*

---

**Canarias.** En La Palma, el 10 de septiembre de 1990 se detecta un ave en las graveras próximas al aeropuerto de la isla en Mazo, y en el mismo lugar, el 13 de abril de 1994 se censan 10 ejemplares, aunque sólo queda uno de ellos dos días después. El 11 de abril de 1994 en un estanque de Las Martelas, Los Llanos de Aridane, se observan dos aves, y al día siguiente, en otro estanque de riego entre las montaña de Todoque y La Laguna, Tazacorte, un individuo. Por último, el 15 de abril de 1994 en un pequeño charco de Tazacorte se detecta un ave (D. Trujillo). En esta misma isla, pero en fechas más recientes, en abril de 2011, en una charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, se cuentan seis aves el 15 de abril, dos el día 17 y cuatro el 18 de dicho mes (R. Burton). Estas últimas citas complementan anteriores datos de dicho lugar (*Ardeola*, 58: 206). En El Hierro, el 2 de junio de 2011 se observa un ejemplar en la balsa de Frontera (D. Trujillo).

**CHORLITEJO PATINEGRO***Charadrius alexandrinus*

En arrozales de Campo Lugar-Palazuelo, Cáceres-Badajoz, 62 ejemplares el 7 de octubre de 2010 (S. Fletcher). Nueva localidad de cría, la más importante conocida hasta ahora en Extremadura: en el embalse de Valdecañas, Cáceres, se observan varias parejas con pollos el 14 de junio y se censa un mínimo de 47 parejas el 20 de junio de 2011 (Á. Sánchez, F. Hurtado, J. Prieta, S. Mayordomo y M. Flores).

**Canarias.** En La Palma, el 12 de abril de 1994 en las salinas de Fuencaliente se detecta un macho, y en el mismo enclave, el 2 de septiembre de 1995 se observan tres ejemplares de los cuales uno podría ser juvenil (D. Trujillo). Ya por esas últimas fechas se citaron tres aves en dicho lugar (*Ardeola*, 45: 122).

**CHORLITO CARAMBOLO***Charadrius morinellus*

Siete ejemplares entrando desde el mar en Cabo Mayor, Santander, Cantabria, el 27 de agosto de 2011 (C. Álvarez). Un ejemplar en pastizal con pional bajo a 1.780 m de altitud en Robregordo, pico Colgadizos, Madrid, el 25 de septiembre de 2011 (Á. L. Sánchez, B. García-Cernuda, J. Laia, I. Draper y B. Sánchez.). Un joven en un terreno recién labrado, en Alhaurín de la Torre, Málaga, los días 19 y 20 de septiembre de 2011 (E. Alba, A. Tamayo y J. A. Angulo). Se cuentan 92 ejemplares en Las Bárdenas Reales, Navarra, el 15 de septiembre de 2011 (J. Ardaiz y R. Rodríguez). Concentraciones migratorias en Albacete: en el término municipal de Albacete se conoce la sedimentación de esta especie entre agosto y octubre; en el año 2011 se han localizado dos zonas principales, en la primera se cuentan 41 ejemplares el 21 de agosto y un máximo de 134 el 10 de septiembre; en la segunda zona se estiman 300 ejemplares el 5 de octubre (R. Torralba y D. Cañizares). **Baleares.** En Mallorca, uno en el Prat de Sant Jordi, Palma, descansando dentro de un bando de 300 chorlitos dorados el 29 de enero de 2010 (M. Rebassa/AOB), y un joven de primer año en el Caragolí, en monte el Teix, Valldemossa, Mallorca, el 24 de agosto de 2010 (J. M. González/AOB). Cuatro adultos y siete jóvenes en el Caragolí en monte

el Teix, Valldemossa, Mallorca, el 14 de septiembre de 2010 (A. Bauçà/AOB y González *et al.*, 2010). **Canarias.** En La Gomera, un ejemplar adulto en plumaje de invierno en el Alto de Garajonay, Parque Nacional de Garajonay, entre los días 7 y 23 de octubre de 2011 (F. Guijarro, C. D. Plasencia y Ó. Yus).

**CHORLITO DORADO EUROPEO***Pluvialis apricaria*

**Baleares.** Concentración invernal con 2.400 ejemplares en el llano de Lanzell, Vilafranca, Mallorca, el 17 de enero de 2010 (M. Rebassa/AOB).

**CORRELIMOS GORDO***Calidris canutus*

Se observan 20 ejemplares en la desembocadura del Guadiana, Ayamonte, Huelva, el 4 de enero de 2010 (R. Romero).

**CORRELIMOS TRIDÁCTILO***Calidris alba*

Un ejemplar en Santa Amalia, Badajoz, el 8 de septiembre de 2011 (F. Yuste). Un ave en la laguna de Torremejía, Badajoz, el 11 de mayo de 2011 (M. Kelsey). Un adulto en Magallón, Zaragoza, el 22 de octubre de 2011 (J. Train).

**CORRELIMOS DE TEMMINCK***Calidris temminckii*

Un individuo en Alday, Camargo, Cantabria, entre el 9 y el 13 de septiembre de 2010 (S. Alarcón y C. Mateos).

**CORRELIMOS OSCURO***Calidris maritima*

En la bahía de Cádiz, donde su presencia es muy escasa, dos ejemplares en la playa de la Caleta, desde el 13 de marzo al 22 de abril de 2011 (M. Jimenez Cintado).

**COMBATIENTE***Philomachus pugnax*

**Canarias.** En La Palma, el 7 de septiembre de 1990 en las salinas de Fuencaliente se observa

un macho; el 11 de abril de 1994 en estanques de Triana, Los Llanos de Aridane, se registran tres aves, nueve el 15 de abril de 1994, y tres el 30 de agosto de 1995; el 12 de abril de 1994 en estanques de Las Martelas, Los Llanos de Aridane, se avistan dos aves. Por último, entre el 18 y 22 de octubre de 2011 en la laguna de Barlovento, se observa un macho y una hembra (D. Trujillo). En esta misma isla, de nuevo en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, se cita un ave del 1 al 6 de septiembre, aunque el día 3 de dicho mes se vieron dos ejemplares, y de nuevo uno el 9 de octubre de 2011 (R. Burton). En La Gomera, donde hay pocas citas, un ejemplar en la presa La Quintana, Acardece, Arure, los días 9 y 10 de octubre de 2011 (R. Jorge Díaz).

#### AGACHADIZA CHICA

*Lymnocyptes minimus*

Un ejemplar en la balsa de Obécuri, condado de Treviño, Burgos, el 13 de diciembre de 2009 (G. Belamendia y A. Saénz de Santamaría). Entre el 3 de diciembre 2010 y el 1 de febrero de 2011, seis observaciones con un total de 11 aves, en la desembocadura de la Rambla del Albuñón, Cartagena, Murcia (A. J. Hernández Navarro).

#### AGACHADIZA COMÚN

*Gallinago gallinago*

Nueva localidad de cría: un macho en vuelo de cortejo en el puerto de Peñanegra, P.K. 16, Ávila, el 12 de junio de 2011 (S. Langlois y D. Langlois). **Canarias.** En La Palma, donde se conocen escasas citas en el noreste de la isla, en la laguna de Barlovento se observa un ave el 22 de octubre de 2011 (D. Trujillo).

#### CHOCHA PERDIZ

*Scopax rusticola*

**Canarias.** En Tenerife, nueva localidad donde podría criar con éxito: en El Pinque, Adeje, a unos 75 m de altitud, dos o tres ejemplares adultos reclamando y realizando vuelos territoriales y relacionados con el cortejo sobre una zona de cultivos de plataneras *Musa acuminata*, los días 19 de marzo y 16 de abril de 2011 (R. Barone, J. Vizcaíno, V. R. Cerdeña, J. P. Castro y A. Arbelo). En este

tipo de ambientes ya se conocía en las islas de Tenerife y La Palma, aunque de momento hay muy poca información al respecto (véase Lorenzo, 2007 y referencias allí dadas).

#### AGUJA COLIPINTA

*Limosa lapponica*

Un joven en el embalse de Talaván, Cáceres, entre los días 6 y 15 de septiembre de 2011 (J. Guerra, M. Gálvez, M. Kelsey y S. Mayordomo). Una hembra en plumaje estival en la balsa de Casas de Hitos, Navalvillar de Pela, Badajoz, el 21 de abril de 2011 (M. Kelsey).

#### ARCHIBEBE OSCURO

*Tringa erythropus*

Observación de 47 ejemplares en los arrozales de Campo Lugar-Palazuelo, Cáceres-Badajoz, el 7 de octubre de 2011 (S. Fletcher).

#### ARCHIBEBE COMÚN

*Tringa totanus*

**Baleares.** Un adulto con dos pollos a punto de volar en las Salines de Sa Vall, Ses Salines, Mallorca, el 19 de junio de 2010, primera cita de cría en esta localidad (J. Adrover/AOB).

**Canarias.** Citas de islas occidentales, donde hay pocos datos, y en fechas de paso. En La Gomera, un ejemplar en la presa La Quintana, Acardece, Arure, los días 9 y 10 de octubre de 2011 (R. Jorge Díaz). En El Hierro, en La Restinga, El Pinar, un adulto el 13 agosto 2011 (M. Díaz).

#### ARCHIBEBE FINO

*Tringa stagnatilis*

Un individuo en arrozales de Casas de Hitos, Navalvillar de Pela, Badajoz, el 2 de mayo de 2011 (E. Palacios, P. Ramírez, J. Prieta, M. Á. Muñoz y S. Mayordomo). Uno en Los Arenales, Cáceres, el 28 de septiembre de 2011 (S. Mayordomo). Dos aves en campos de arroz de la Herrerueta, Cáceres, el 1 de octubre de 2011 (P. Soper). Un adulto en la laguna de Pétrola, Albacete, el 13 de septiembre de 2011 (R. Torralbo). Un ejemplar en la laguna de La Veguilla, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 12 de septiembre de 2011 (R. Vega).

Cuatro aves en la marisma de Trebujena, Cádiz, el 22 de septiembre de 2011 (F. Chiclana).

**Baleares.** En Menorca, un ave en las salinas de Addaia, Es Mercadal, el 14 de marzo de 2010 (X. Méndez/AOB). En la albufera de Mallorca, un ejemplar el 30 de marzo de 2010 y en el paso postnupcial un individuo entre el 5 y 26 de agosto de 2010 (P. Vicens, N. Riddiford, M. Rebassa, J. J. Bazán y F. Paniagua/AOB). Uno en el Salobrar de Campos, Mallorca, el 11 y 13 de agosto de 2010 (M. Rebassa, J. J. Bazán y A. Bazán/AOB).

#### ANDARRÍOS BASTARDO

*Tringa glareola*

Un ave en la desembocadura de la Rambla del Albujón, Cartagena, Murcia el 30 de agosto de 2009 y dos el 2 de marzo de 2010 (A. J. Hernández Navarro). Cifras destacadas en los marjales de Sueca, albufera de Valencia, durante el paso postnupcial: en 2010 hasta 218 ejemplares en varios campos baldíos recién fangueados cerca del camí d'Utxana, el 19 de agosto (B. Dies); hasta 341 aves en zonas baldías fangueadas de Ribalmarg y La Socarrà, el 22 de agosto (B. Martínez y B. Dies) y se cuentan, al menos, 178 ejemplares en arrozales baldíos de La Socarrà, la Partideta, Ribalmarg y la mota de Sant Pau, el 28 de agosto (B. Dies). Aproximadamente 145 aves entre la R. N. de La Ratlla, Silla, y arrozales fangueados de La Foia, Sollana, y el tancat de Caro, Sueca, albufera de Valencia el 28 de septiembre de 2011 (B. Dies, E. Gómez y J. García).



**Págalo pomarino** *Stercorarius pomarinus*. Yaiza (Lanzarote). Foto: Francisco Javier García Vargas.

#### VUELVEPIEDRAS COMÚN

*Arenaria interpres*

Un joven en el embalse de Valdesalor, Cáceres, el 9 de septiembre de 2011 (C. Fernández Díaz). Un ave en el embalse de Los Canchales, Badajoz, el 24 de septiembre de 2011 (C. Clemente, J. Mahillo, J. Prieta y S. Mayordomo). Un adulto en Alarcos, Ciudad Real, el 9 de agosto de 2011 (X. Piñeiro).

#### FALAROPO PICOGRUESO

*Phalaropus fulicarius*

Dos en la laguna del Portil, Cartaya, Huelva, el 14 de diciembre de 2009 (R. Romero, J. Salcedo y J. M. Fernández). Un individuo invernante en la laguna de Calatilla, Odiel, Huelva, el 18 de enero de 2010 (R. Romero). Un individuo nadando en el puerto junto a la Casa de los Náufragos, Getxo, Vizcaya, el 16 de noviembre de 2010 (S. Alarcón).

#### PÁGALO POMARINO

*Stercorarius pomarinus*

**Canarias.** Durante un viaje pelágico por aguas al norte de Lanzarote, alcanzando el Banco de la Concepción, los días 10 y 11 de septiembre de 2011 se detectan uno y tres ejemplares, respectivamente (J. Sagardía, D. L. Velasco y otros). En un viaje similar pero por las aguas del sur de esta isla, tres ejemplares el 15 de octubre de 2011 (J. Sagardía y A. Unquiles Cobos). Otra cita en esta misma isla es de un juvenil descansando en la orilla de Janubio, Yaiza, el 24 de octubre de 2011 (F. J. García Vargas). En aguas próximas a Gran Canaria, un ejemplar el 26 de octubre de 2011 (S. Dunstan).

#### GAVIOTA CABECINEGRA

*Larus melanocephalus*

Registro más numeroso para Extremadura: en el embalse de Valdecañas, Cáceres, se observan 15 adultos el 12 de julio de 2011 (Á. Sánchez, J. A. Guerrero y M. Flores) y dos adultos el día 28 (Á. Sánchez y Á. L. Sánchez). Reproducción en Albacete: una pareja con dos pollos grandes en la laguna de Pétrola el 20 de junio de 2011 (R. To-

rralbo). Un adulto en la laguna Salina Grande, Otero de Sariegos, R. N. de las lagunas de Villafáfila, Zamora, el 13 marzo y el 24 de abril de 2011 (J. A. Hernández Rodríguez y M. I. Martín Rodrigo). Al menos cinco parejas en el seno de una colonia de gaviota reidora en las lagunas de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 16 de abril de 2011, observando construcción de nido, cópulas y territorialidad (B. Molina).

#### **GAVIOTA ENANA**

*Larus minutus*

---

Un ave de primer invierno en el espigón del Odiel, Huelva, el 18 de enero de 2010 (R. Romero).

#### **GAVIOTA REIDORA**

*Larus ridibundus*

---

Reproducción en Cáceres: en el embalse de Valdecañas se observan 31 ejemplares y se localizan tres nidos con aves incubando el 20 de junio de 2011 (J. Prieta y S. Mayordomo). Reproducción en Badajoz: 20 parejas con comportamiento reproductor en el embalse de Alange durante mayo de 2011 (Á. Sánchez).

#### **GAVIOTA DE AUDOUIN**

*Larus audouinii*

---

Un juvenil en Calahorra, La Rioja, desde 7 al 20 de agosto de 2011 (I. Gámez, S. Vela y J. Ucha). Dos aves en la laguna de Pétrola, Albacete, el 31 de octubre de 2011 (R. Torralbo). En el vertedero de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, un juvenil el 3 de septiembre y otro el 15 de octubre de 2011 (G. Martín). Un juvenil en el vertedero de Colmenar Viejo, Madrid, los días 27 de agosto y 3 de septiembre de 2011 (J. Marchamalo). Un juvenil en Oleiros, A Coruña, el 14 de agosto de 2011 (S. Paris). Alrededor de 650 ejemplares en el espigón Juan Carlos I, Huelva, el 2 de agosto de 2011 (F. Chiclana).

#### **GAVIOTA DE DELAWARE**

*Larus delawarensis*

---

Un adulto en la playa de la Bola, Getxo, Vizcaya, el 4 de enero de 2010 (S. Alarcón). Dos adultos y

dos jóvenes en la playa de Ereaga, Getxo, Vizcaya, el 2 de febrero de 2010 (S. Alarcón). Un ave de segundo año en Culleredo, A Coruña, los días 13 y 14 de agosto y el 1 de septiembre de 2011 (X. Varela). Un ave de tercer año en la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, los días 1 y 4 de abril de 2011 (A. Tamayo).

#### **GAVIOTA CANA**

*Larus canus*

---

Cuatro juveniles en Salburúa, Vitoria, Álava, el 18 de marzo de 2011 (Serafín Alarcón).

#### **GAVIOTA ARGÉNTEA EUROPEA**

*Larus argentatus*

---

Un ave de segundo año en el vertedero de Colmenar Viejo, Madrid, el 28 de agosto de 2011 (J. M. Ruiz).

**Baleares.** En Mallorca, observaciones de ejemplares en el puerto de Palma en el muelle Vell en 2010: un ave de primer año con características de la subespecie *argentatus* reconocida por detalles del plumaje y la muda, los días 5, 10, 23 y 26 de marzo, ejemplar que pasó una buena temporada en la isla, seguramente de enero a marzo, y por tanto se puede considerar una invernada; un ejemplar de cuarto año de calendario con características de



**Gaviota argétea** *Larus argentatus argentatus*. Puerto de Palma (Mallorca). Foto: Maties Rebassa.

la subespecie *argentatus* el 11 y 27 de noviembre y un ave de segundo año de calendario el 3 de mayo (M. Rebassa/AOB).

#### GAVIOTA PATIAMARILLA

*Larus michahellis*

Reproducción en Cáceres: cuatro nidos en el embalse de Valdecañas el 5 de mayo de 2011, un mínimo de 58 ejemplares de todas las edades el 20 de junio (Á. Sánchez, F. Hurtado, J. Guerrero, J. Prieta, S. Mayordomo y M. Flores) y 42 aves el 23 de agosto (J. Prieta). Una pareja regenta un nido, uno de ellos incubando, en la laguna Larga de Villacañas, Toledo, el 16 de abril de 2011 (B. Molina). Reproducción en la provincia de León: especie presente todo el año en el embalse de Riaño desde hace varios años; en 2011 una pareja ocupa un nido abandonado y semiderruido de cigüeña blanca sobre un poste de madera en una isleta junto al viaducto de Riaño; el día 14 de junio tenía dos pollos grandes (T. Sanz, I. Rodríguez, B. Fuertes y D. Miguélez). Cuatro juveniles en la balsa de San Martín del Camino, León, el 7 de julio de 2011 (D. Miguélez).

**Canarias.** En Gran Canaria, nueva localidad de cría: el 16 de junio de 2011 en el embalse del Caidero de la Niña, Tejeda, se observa una pareja de adultos y un pollo bastante desarrollado que evita

los rayos del sol ocultándose en una pequeña cavidad próxima al muro de contención de la presa (D. Trujillo).

#### GAVIÓN ATLÁNTICO

*Larus marinus*

Un adulto en el espigón de Huelva, Huelva, el 17 de julio de 2011 (J. P. Sencianes).

#### PAGAZA PICONEGRA

*Sterna nilotica*

Un adulto en la balsa de Santa Cristina del Páramo, León, el 22 de junio de 2011 (D. Miguélez). **Canarias.** En La Palma, un ejemplar de primer invierno en charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, los días 10 y 11 de septiembre de 2011 (R. Burton).

#### PAGAZA PIQUIRROJA

*Sterna caspia*

Un ave en la isla de Oreim, embalse de Ullivarrigamboa, Álava, el 15 de junio de 2010 (G. Belamendia). Observaciones en el río Guadalquivir, interior de Sevilla: cuatro aves en Las Cabezas de San Juan el 23 de abril de 2009, y en La Algaba dos aves el 9 de abril de 2011 y un ejemplar el



**Gaviota patiamarilla** *Larus michahellis*. Embalse de Riaño (León). Foto: David Miguélez.



**Pagaza piconegra** *Sterna nilotica*. Los Llanos de Aridane (La Palma). Foto: Robert Burton.

19 de marzo de 2011 (R. Romero). Cuatro ejemplares en la playa de La Jara, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, el 9 de junio de 2011 y siete el día 10 de julio de 2011 (F. Chiclana).

**Baleares.** Dos adultos en la albufera de Mallorca el 20 de septiembre de 2010 (M. Rebassa/AOB).

#### CHARRÁN PATINEGRO

*Sterna sandvicensis*

---

Cinco individuos en la desembocadura del Guadiana, Ayamonte, Huelva, el 30 de diciembre de 2009 (R. Romero y P. Medina).

#### CHARRÁN COMÚN

*Sterna hirundo*

---

Reproducción en Cáceres en 2011: en el embalse de Valdecañas se observan seis ejemplares, incluyendo una pareja incubando, el 16 de junio (M. Flores), la pareja es vista de nuevo ocupando nido el 20 de junio (J. Prieta y S. Mayordomo) y el día 12 de julio se observan cinco ejemplares (Á. Sánchez, J. A. Guerrero y M. Flores). Cuatro aves en el embalse de Sierra Brava, Cáceres, el 8 de abril de 2011 (J. Muddeman). Uno en el embalse de Valdesalor, Cáceres, el 19 de junio de 2011 (S. Mayordomo). Un individuo en el río Duero, Zamora capital, el 23 de abril de 2011 (J. A. Hernández Rodríguez) y de nuevo un ave el 15 de junio de 2011 (E. D'Hoore, J. A. Hernández Rodríguez y M. I. Martín Rodrigo).

**Canarias.** En Tenerife, en Los Gigantes, Santia-go del Teide, una pareja en la base del acantilado, uno posado en tierra y otro cerca volando, el 25 de junio de 2011 (M. Quintana Becerra y C. O. Ania).

#### CHARRANCITO COMÚN

*Sterna albifrons*

---

**Canarias.** En Lanzarote, en el litoral de Arrecife, uno el 27 de octubre de 2011 (S. Dunstan).

#### FUMAREL CARIBLANCO

*Chlidonias hybrida*

---

Observación invernada: cinco ejemplares en el P. N. Tablas de Daimiel, Ciudad Real, el 5 de diciembre de 2010 (R. Romero y P. Medina). Un ave

en el embalse de Los Canchales, Badajoz, el 5 de febrero de 2010 (J. C. Paniagua, S. Mayordomo y T. Álvarez). En Madrid, laguna de Mecó: la población reproductora pasa de 9 parejas en el año 2010 a 17 parejas en 2011 (C. Talabante y A. Aparicio/Cátedra de Medio Ambiente/UAH).

**Canarias.** En Lanzarote, uno en el campo de golf de Tías el 13 de abril de 2011 (F. J. García Vargas).

#### FUMAREL COMÚN

*Chlidonias niger*

---

**Canarias.** Durante un viaje pelágico por aguas al norte de Lanzarote, alcanzando el Banco de la Concepción, los días 10 y 11 de septiembre de 2011 se observan dos y un ejemplares, respectivamente (J. Sagardía, D. L. Velasco y otros).

#### FUMAREL ALIBLANCO

*Chlidonias leucopterus*

---

Una ave en la laguna de Pétrola, Albacete, los días 21 y 23 de mayo de 2011 (R. Torralba y R. Howard). Uno en la laguna de Boada de Campos, Palencia, el 13 de agosto de 2011 (I. Sarabia). Uno en el río Nervión-Ibaizabal, Bilbao, Vizcaya, el 30 de septiembre de 2010 (S. Alarcón y C. Mateos). Grupo de 20 ejemplares en arrozales recién inundados de Torres de Barbués, Los Monnegros, Huesca, el 8 de mayo de 2011 (J. Gómez de Valenzuela).

#### FRAILECILLO ATLÁNTICO

*Fratercula arctica*

---

**Baleares.** En Cabrera, un individuo en el canal el 5 de marzo de 2010 (B. Servera, S. Ferragut y T. Sunyer/AOB). Un ave el 16 de marzo de 2010 (J. M. González/AOB) y otro en el canal el 11 de abril de 2010 (B. Belmar y J. Salva/AOB).

#### GANGA ORTEGA

*Pterocles orientalis*

---

Primera observación reciente en la albufera de Valencia: el 18 de enero de 2010 se recoge una hembra con síntomas de desnutrición en las dunas litorales de la Devesa, en La Garrofera. Sólo se conocía una cita previa de un ave cazada en enero

de 1960 en Sueca. Ese registro antiguo coincide, curiosamente, con un periodo de nevadas intensas en el interior de la península Ibérica similar al registrado en la semana previa en esta ocasión. Las localidades de presencia más cercana de esta especie se localizan en Albacete, Cuenca y Teruel (Centre de Protecció de Fauna de “La Granja” de El Saler/Conselleria de Medi Ambient).

#### PALOMA TURQUÉ

*Columba bollii*

**Canarias.** En El Hierro, el 4 de junio de 2011 se observa un ejemplar en un pequeño barranco con monte verde próximo a la Loma de los Cardos, Valverde (D. Trujillo). Se trata de una localidad alejada de su área de distribución conocida hasta el momento (véase Martín *et al.*, 2000 y Lorenzo, 2007).

#### TÓRTOLA TURCA

*Streptopelia decaocto*

**Canarias.** En El Hierro, un ave en La Restinga, El Pinar, el 23 de agosto de 2011 (M. Díaz), constatándose su permanencia en dicha localidad en los últimos años (véase *Ardeola*, 51: 554); se trata del enclave más suroccidental donde se cita, y se considera plenamente establecida en el conjunto del archipiélago canario.

#### TÓRTOLA SENEGALESA

*Streptopelia senegalensis*

**Canarias.** En Tenerife, adulto observado en la charca de El Fraile, Arona, el 10 de octubre de 2011 (N. Trujillo).

#### CRÍALO EUROPEO

*Clamator glandarius*

Un adulto posado en un pino en Gaztelugatxe, Vizcaya, el 29 de marzo de 2010 (S. Alarcón y C. Mateos).

**Baleares.** Presencia invernal accidental de un ejemplar en la Mola, Formentera, el 15 de enero de 2010 (S. Costa/AOB).

**Canarias.** En Gran Canaria, en la misma área de San Agustín, un ejemplar en fechas bien distantes, el primero en marzo de 1995 y el segundo en abril de 2011 (M. L. Fishman).



**Búho real** *Bubo bubo*. Madrid. Foto: Fernando Serrano.

#### BÚHO REAL

*Bubo bubo*

Observaciones en zonas urbanas en Madrid: una pareja saca adelante pollos en una jardinera en la segunda planta de un chalet en la localidad de Sevilla la Nueva, temporada 2011; segundo año de cría en este lugar (H. Sánchez Mateos), y un individuo en el barrio de Moratalaz, el 1 de septiembre de 2011, posado en el alfeizar de una terraza alrededor de dos horas en el último piso de un bloque de 10 plantas; no estaba anillado (F. Serrano).

#### BÚHO CAMPESTRE

*Asio flammeus*

Un ejemplar en un olivar de San Sebastián de los Ballesteros, Córdoba, el 15 de octubre de 2010 (A. Cuesta).



**Chotacabras cuellirojo** *Caprimulgus ruficollis*.  
Can Marroig (Formentera). Foto: J. Bonnín.

#### CHOTACABRAS CUELLIROJO *Caprimulgus ruficollis*

**Baleares.** En Formentera, una hembra adulta es capturada para anillamiento en Can Marroig, el 5 de mayo de 2009 (J. Bonnín/AOB). Se captura para anillamiento un individuo en la isla de Sa Conillera, Sant Josep, Ibiza, el 24 de abril de 2010 y posteriormente se captura otro el 26 de abril de 2010 (A. López/AOB). En Mallorca, se encuentra un individuo muerto en la carretera de circunvalación de Capdepera el 27 de abril de 2010 (C. Artigues y A. Muñoz/AOB).

#### VENCEJO PÁLIDO *Apus pallidus*

**Baleares.** En Mallorca, se localiza por primera vez una colonia de cría en el interior en las islas: se trata de un pequeño grupo reproductor en un tejado del casco antiguo de Inca, que comparte con vencejo común, donde se observaron tres individuos que entraban y salían el 25 de junio de 2010, jóvenes a partir del 4 de julio y un máximo de nueve aves el 17 de agosto (P. Vicens/AOB).

#### VENCEJO REAL *Apus melba*

Un ejemplar entra a cebar a una grieta en Cerro del Hierro, P. N. Sierra Norte, Sevilla, el 21 de julio de 2007 (R. Romero).

#### VENCEJO CAFRE *Apus caffer*

Observaciones en Extremadura en 2011: en la provincia de Cáceres se localizan cuatro nidos diferentes en el P. N. de Monfragüe, (SEO-Cáceres); cuatro ejemplares en Canchos de Ramiro, Cachorrilla, el 22 de mayo y un ave el 25 de junio (C. Clemente); una pareja entrando a un nido en el casco urbano de Guijo de Santa Bárbara, el 12 de junio (J. Calle); tres ejemplares en el Pico de Miravete, el 23 de junio (Godfried Schreur) y un ejemplar en Casas de Millán, el 29 de junio (G. Schreur y P. López); en la provincia de Badajoz se registraron dos aves en Helechal, el 28 de abril (J. Porras) y una en Puerto Peña, Talarrubias, el 6 de junio de 2011 (J. Porras). Dos aves en el embalse del Celemín, La Janda, Cádiz, el 27 de septiembre de 2009 (R. Romero y A. Savijn). Registros en la provincia de Huelva: una pareja ocupando nido en un puente de Nerva, el 22 de junio de 2009, dos ejemplares en la Peña de la Virgen, Puebla de Guzmán, el 19 de mayo de 2009 y dos aves en la ribera de Alcalaboza, Rosal de la Frontera, el 14 de junio de 2010 (R. Romero). En Jaén: tres individuos en la Cascada de la Cimbarra, Aldeaquemada, el 22 de junio de 2010 y tres aves en Los Órganos, P. N. Despeñaperros, el 22 de junio de 2010 (R. Romero). En Ciudad Real, dos aves en Herencia, desde mayo hasta el 31 de agosto de 2011; en esta localidad ya crió en 2010 (P. Bustamante) y una en el Boquerón del Estena, Navas de Estena, P. N. de Cabañeros, el 15 de septiembre 2011 (J. Muddeman). Un ejemplar en los Arribes del Duero, Salamanca, el 13 de septiembre de 2011 (G. Hernández).

#### CARRACA EUROPEA *Coracias garrulus*

Avistamientos en la provincia de León: un ave en Santas Martas, el 24 de julio de 2002 (J. García, C. Zumalacárregui y N. Rodríguez) y un ave en Camposagrado, el 5 de julio de 2005 (J. García). Un ave en el Parque Natural de Gorbeia, en el municipio de Zigoitia, Álava, el 2 de agosto de 2011 (A. Tirados y R. Martínez). Un juvenil en Erreterria, Guipúzcoa, el 16 de agosto de 2011 (A. Herrero).



**Torcecuello euroasiático** *Jynx torquilla*. Yaiza (Lanzarote). Foto: Francisco Javier García Vargas.

#### **TORCECUELLO EUROASIÁTICO**

##### *Jynx torquilla*

---

Observaciones en invierno en Asturias: un ave en una finca de frutales en la campiña costera en Ería de Las Nieves, Llanes, el 7 de diciembre de 2009 y otra en una zona de campiña costera en los alrededores de la ría de Poo, Llanes, el 29 de noviembre de 2010 (F. Nieto).

**Baleares.** Una pareja desplaza a otra de *Parus major* de una caja nido en Son Real, Santa Margalida, Mallorca, pone siete huevos a finales de mayo y finalmente vuelan cuatro pollos el 30 de junio de 2010 (J. Sunyer/AOB).

**Canarias.** En Lanzarote, se detecta paso inusual con avistamientos en varias localidades: uno en Uga, Yaiza, el 8 de octubre de 2011 (F. J. García Vargas), mientras que el 10 de octubre de 2011 hay cuatro aves en jardines de El Cable, Arreci-

fe, dos aves en el campo de golf de Tías y una en Montaña Blanca, Tías (J. Sagardía).

#### **PITO NEGRO**

##### *Dryocopus martius*

---

Observación de tres pollos emplumados en la entrada del nido y de los adultos cebando en un hayedo de Aralar, Guipúzcoa, el 23 de mayo de 2011; es la primera vez que se localiza un nido activo con pollos en el País Vasco (N. Ruiz de Azua).

#### **PICO MENOR**

##### *Dendrocopos minor*

---

En la Sierra de Hornachuelos, Córdoba: en un arroyo una hembra y un ejemplar escuchado, y otra hembra en una chopera el 29 de marzo de 2011 (R. Romero).

**GOLONDRINA COMÚN***Hirundo rustica*

**Baleares.** Inusual invernada de ejemplares en el 2010, así en Mallorca: dos aves en el Salobrar de Campos el 16 de enero (M. Montier/AOB); una entre aviones roqueros en el Prat de Sant Jordi, Palma, el 24 de diciembre (D. Jaume/AOB); un individuo en la albufera de Mallorca los días 26, 27 y 30 de diciembre (L. Ventoso, S. Quintanilla, P. Vicens y N. Riddiford/AOB); y un ave en mal estado en la balsa de Can Guidet, Palma, el 30 de diciembre (L. Ventoso/AOB). En Ibiza: un ejemplar en las Feixes de Talamanca el 27 de enero de 2010 (L. A. García/AOB). Por último, en Menorca: tres ejemplares en la cala Porter, Alaior, el 12 de diciembre de 2010 (F. de Pablo/AOB).

**GOLONDRINA DÁURICA***Hirundo daurica*

Un nido con dos adultos cebando pollos bajo un puente de carretera en Valderrey, León, el 4 de junio de 2011 (J. García).

**Canarias.** En El Hierro, donde hay pocas citas, el 22 de marzo de 2011 sobre estanques y una granja de cerdos de Frontera se observan dos



**Golondrina dáurica** *Hirundo daurica*. Frontera (El Hierro). Foto: Domingo Trujillo.

ejemplares cazando insectos junto a un avión común (D. Trujillo).

**BISBITA DE RICHARD***Anthus richardi*

Un ave en cabo Quintres, Ajo, Cantabria, el 4 de noviembre de 2010 (S. Alarcón).

**BISBITA CAMPESTRE***Anthus campestris*

**Canarias.** En Lanzarote, un ejemplar en una playa cerca de Órzola, Haría, el 24 de agosto de 2011 (E. J. Alblas). En Tenerife, un individuo en campo de golf en San Miguel el 8 de octubre de 2011 (R. Barone, V. R. Cerdeña y J. Vizcaíno).

**BISBITA ARBÓREO***Anthus trivialis*

**Canarias.** En La Palma, el 10 de abril de 1994, cerca de montaña Colorada, El Paso, se observa un ave; al día siguiente en Tacande de Arriba, El Paso, se detecta otro individuo; el 13 de abril de 1994 en Las Indias, Fuencaliente, hay tres ejemplares y otras tres en El Porvenir, Breña Alta, donde sólo queda una a los dos días posteriores de la



**Bisbita arbóreo** *Anthus trivialis*. Puntallana (La Palma). Foto: Domingo Trujillo.

primera visita. Por último, el 22 de octubre de 2011 en Martín Luis, Puntallana, se observa y fotografía un ejemplar (D. Trujillo).

#### BISBITA GORGIRROJO

*Anthus cervinus*

---

Máximo número de aves registrado hasta la fecha en la albufera de Valencia: siete en zonas baldías en el Malvinar, Sueca, Valencia, el 7 de abril de 2011 (B. Dies). Un ejemplar en los Aiguamolls del Ampurdán, Girona, el 20 de abril de 2011 (M. Sánchez y P. Feliú). Un juvenil en el río Vélez, Málaga, el 9 de septiembre de 2011 (S. Peregrina). Uno en Castropol, Asturias, el 28 de octubre de 2011 (D. L. Velasco, P. Fernández e I. Castelao).

**Baleares.** En Mallorca, un ejemplar al llano de Lanzell, Vilafranca, el 25 de abril de 2010 (X. Llabrés y C. Herrero/AOB). Dos aves en la albufera de Mallorca el 2 de mayo de 2010 (P. Vicens y N. Riddiford/AOB).

#### LAVANDERA BOYERA

*Motacilla flava*

---

Registro invernial: 18 individuos en Cantarita, Isla Mayor, Sevilla, el 26 de enero de 2009 (R. Romero). Un macho de raza ibérica en La Puebla de los Infantes, Sierra Morena, Sevilla, el 3 de junio de 2010 (R. Romero).

Reproducción probable en Badajoz: en arrozales de Casas de Hitos, Navalvillar de Pela, varios machos cantando el 2 de mayo (E. Palacios, P. Ramírez, J. Prieta, M. Á. Muñoz y S. Mayordomo) y un macho el 14 de mayo de 2011 (M. Kelsey).

**Baleares.** En Mallorca, presencia invernial de un individuo en el Prat de Sant Jordi, Palma, el 16 y 23 de enero de 2010 (D. Jaume/AOB).

#### LAVANDERA CASCADEÑA

*Motacilla cinerea*

---

**Canarias.** Dato de cría en Gran Canaria, a 1.550 m de altitud, en el embalse de los Hornos, Tejeda, el 17 de mayo de 2009 se halla un nido con pollos, y el 9 de julio de 2011, en el mismo lugar, se observa una pareja alimentando a dos pollos colicortos (D. Trujillo).

#### LAVANDERA BLANCA

*Motacilla alba*

---

**Baleares.** En Mallorca, un ejemplar de la subespecie *yarrellii* en el Prat de Sant Jordi, Palma, el 12 de diciembre de 2010 (L. Ventoso, S. Quintanilla y G. Bernat/AOB).

#### ALZACOLA ROJIZO

*Cercotrichas galactotes*

---

**Baleares.** Un adulto es capturado para anillamiento en la isla Sa Conillera, Sant Josep, Ibiza, el 11 de mayo de 2010 (Ó. Martínez/AOB).

#### PETIRROJO EUROPEO

*Erithacus rubecula*

---

**Baleares.** En Mallorca, nueva localidad de cría: observación de dos ejemplares cantando en la fuente de Son Creus, Banyalbufar, el 28 de mayo de 2010 (S. Nicoll/AOB); posteriormente se escucha un adulto cantando y se ve un juvenil, con el plumaje totalmente moteado, en el camino de dicha fuente, el 13 de julio de 2010 (X. Llabrés y C. Fiol/AOB).

#### RUISEÑOR PECHIAZUL

*Luscinia svecica*

---

*Corrección:* en *Ardeola*, 57: 542 se incluye por error la cita indicada como capturas mediante anillamiento de ejemplares adultos y del año en el Parque Natural de la Sierra de Alhama, Tejeda y Almijara, en Granada, el 22 de septiembre de 2010, cuando en realidad corresponden a aves en pleno paso postnupcial.

#### COLIRROJO TIZÓN

*Phoenicurus ochruros*

---

Una hembra ceba a tres pollos en el Cerro del Hierro, P. N. Sierra Norte, Sevilla, el 21 de julio de 2007 (R. Romero).

#### COLIRROJO REAL

*Phonichuros phoenicuros*

---

**Canarias.** En La Gomera, donde se conocen escasas citas, el 5 de octubre de 2011 en los jardi-

nes del parque Las Eras, Tecina, San Sebastián de La Gomera, se observa un ejemplar hembra (D. Trujillo).

#### TARABILLA NORTEÑA

*Saxicola rubetra*

---

Un ejemplar en prados de la campiña costera en La Collada, Asturias, el 4 de noviembre de 2010 (F. Nieto).

**Canarias.** En La Gomera, donde hay pocos datos, el 7 de octubre de 2011 en las proximidades del aeropuerto de la isla en Alajeró se observa un ejemplar (D. Trujillo y J. Leralta).

#### MIRLO COMÚN

*Turdus merula*

---

**Canarias.** En Lanzarote, ejemplar en las inmediaciones del campo de golf de Teguisse todo el mes de abril y al menos hasta el 6 de mayo de 2011 (F. J. García Vargas). Tal y como comunica el observador, se trata del mismo ejemplar mencionado allí en diciembre y agosto de 2010 (véase *Ardeola*, 58: 215).

#### BUSCARLA UNICOLOR

*Locustella luscinioides*

---

Reproducción probable en la laguna de El Deseo, Fuentes de Nava, Palencia: un macho cantando los días 18 y 20 de abril de 2011 (C. González Villalba).

**Baleares.** En Mallorca, un juvenil capturado para anillamiento en el P. N. de La Albufera el 24 de agosto de 2008, se sospecha que podría haber criado (C. Fiol y J. L. Martínez/AOB).

#### CARRICERÍN REAL

*Acrocephalus melanopogon*

---

Un ejemplar en el río Guadiana, Puente Viejo, Badajoz, el 2 de abril de 2011 (J. C. Paniagua).

#### CARRICERÍN CEJUDO

*Acrocephalus paludicola*

---

En Estany de Palau, Aiguamolls del Ampurdà, Girona, uno el 1 de abril (M. A. Fuentes) y dos aves el 15 de abril de 2011 (O. Clarabuch, P. Fe-

liú y E. Robleño). En Marjales de Silla, albufera de Valencia, Valencia, un ejemplar el 12 de abril (B. Dies) y tres capturados para anillamiento el 23 de abril de 2011 (J. Badillo, P. Marín y M. Piera). Un ejemplar en Colindres, Cantabria, los días 19 y 20 de agosto, y otro ejemplar el 20 de octubre de 2011 (E. Villodas). Un ejemplar en las lagunas de Gayangos, Merindad de Botija, Burgos, el 24 de agosto de 2011 (M. Alonso). En Asturias: un ave en El Cierrón, Villaviciosa, el 21 de agosto de 2011 (X. Cortés); uno en la ría de Ribadesella el 25 de agosto de 2011 (L. Carrera) y uno de primer año en Villadún, Castropol, el 25 de agosto de 2011 (P. Fernández). Nueva localidad de paso migratorio postnupcial en la provincia de Palencia: en las graveras del Páramo de La Cueva, se captura para anillamiento científico tres ejemplares (dos jóvenes y un adulto) durante los días 29 y 30 de agosto, Villotilla, término municipal de Villaturde el 5 de septiembre de 2011 (C. González Villalba). Dos aves en la laguna de Fuente-cantos, Soria, los días 2 y 6 de septiembre de 2011 (J. L. Hernández, V. Salvador y otros). Un ejemplar en la laguna de Pétrola, Albacete, el 4 de septiembre de 2011 (R. Torralba).

#### ZARCERO BEREBER

*Hippolais opaca*

---

Segundo registro de cría, probable, en Extremadura: se capturan para anillamiento tres individuos (un joven y dos adultos) en el río Guadiana, Badajoz capital, los días 18 y 19 de julio de 2011 (A. D. Pérez). En Alcoy, Alicante, un macho cantando el 7 de junio de 2011 y un ave anillada el 22 de junio (M. Morganti). Reproducción probable en Sierra Morena: un macho cantando en un arroyo con adelfas y zarzas en Rosal de la Frontera, Huelva, en junio de 2010 (R. Romero). Un ejemplar en el delta del Ebro, Tarragona, el 10 de mayo de 2011 (P. Arcos). Un macho en Altea, Alicante, el 14 de mayo de 2011 (G. Mayor y J. Merayo). Un ejemplar cantando en un soto del río Ebro a su paso por Lapuebla de Labarca, Álava, el 5 de julio de 2011 (J. A. Gainzarain). Un ejemplar en Mañón, A Coruña, el 20 de agosto de 2011 (A. Sandoval). **Baleares.** En Cabrera, un ejemplar adulto es capturado para anillamiento el 24 de abril de 2010 (E. Amengual y D. Cuenca/AOB). En la isla

de Sa Conillera, Sant Josep, Ibiza, un ejemplar adulto es anillado el 10 de mayo de 2010 y otro ejemplar adulto el 11 de mayo de 2010 (Ó. Martínez/AOB).

#### **CURRUC A TOMILLERA**

*Sylvia conspicillata*

Se captura para su anillamiento un individuo joven en un saladar-carrizal del interior de El Hondo, Alicante, el 23 de mayo de 2011. Es la primera vez que se tiene constancia de su anillamiento en El Hondo en 20 años. En los saladares de los Parques Naturales de La Mata y Torrevieja y Salinas de Santa Pola, así como otras zonas de matorral del sur de la provincia de Alicante, se reproduce escasamente (I. García Peiró). Desde el 8 junio de 1991 no se tenían citas de reproducción en el Hondo (Ballesteros y Damián-Navarro, 1997).

#### **CURRUC A MIRLONA**

*Sylvia hortensis*

**Baleares.** El paso migratorio de este migrante es más frecuente en primavera que en otoño. En

Formentera, un macho adulto es capturado para anillamiento en Can Marroig el 4 de mayo de 2010 (S. Nicoll y J. Bonnín/AOB). En Ibiza, se captura para anillamiento en isla de Sa Conillera, Sant Josep de la Talaiá: un macho adulto el 2 de mayo de 2009 (A. López/AOB); y en 2010, en el mes de mayo, una hembra de segundo año el 7, una hembra adulta el 8 y un macho de segundo año el día 9 (Ó. Martínez/AOB). En Cabrera, se captura para anillamiento un macho de segundo año el 17 de abril de 2010 (E. Amengual/AOB) y otro macho adulto el 25 de septiembre de 2010 (J. M. González/AOB).

#### **CURRUC A ZARCERA**

*Sylvia communis*

**Canarias.** En La Gomera, donde hay pocos datos, observaciones de aves en paso: el 6 de octubre de 2011 se detecta un ejemplar en los jardines de la Torre del Conde, San Sebastián de La Gomera, y al día siguiente se observan dos aves –adulto y juvenil– en vegetación anexa al aeropuerto, así como otro ejemplar en jardines de casa de La Roseta en Alajeró (D. Trujillo y J. Leralta).



**Mosquitero silbador** *Phylloscopus sibilatrix*. Vila-Seca (Tarragona). Foto: Ricardo Rodríguez.

**CURRUC A MOSQUITERA***Sylvia borin*

Dos aves en fechas tardías aquerenciados en la vegetación arbustiva de la orilla del río Júcar, Murcia, el 21 de mayo de 2011 (M. Santa-Cruz). **Canarias.** En Lanzarote, una cerca del campo de golf de Tegui se el 16 de mayo de 2011 (J. Sargardía).

**MOSQUITERO SILBADOR***Phylloscopus sibilatrix*

Paso importante por la costa de Tarragona, en Vila-Seca, el 21 de abril de 2011: tras una fuerte tormenta el día anterior, en unas dos horas se pudieron observar varias decenas de ellos (no menos de 50 ejemplares) en poco más de 300 metros lineales sobre pinos y otros arbustos (R. Rodríguez y M. Grande).

**Canarias.** En La Gomera, donde hay pocos datos, el 5 de octubre de 2011 en el caserío de Benchijigua, San Sebastián de La Gomera, se observa un individuo (D. Trujillo).

**MOSQUITERO IBÉRICO***Phylloscopus ibericus*

Un macho cantor en La Garganta, Cáceres, el 5 de junio de 2011 (R. Montero). Un macho cantando en el puerto de Miravete, Cáceres, el 24 de mayo de 2011 (M. Kelsey). En época de reproducción en Sierra Morena central y oriental: dos machos cantan en una umbría de pinos en Villaviciosa de Córdoba el 29 de abril de 2010; dos machos cantan en el barranco de Valdeazores, P. N. Despeñaperros, Jaén, el 22 de junio de 2010; y un ejemplar visto y oído en el río Guadalupe, Villaviciosa de Córdoba, el 31 de marzo de 2011 (R. Romero).

**MOSQUITERO COMÚN***Phylloscopus collybita*

En Cáceres: un macho cantando en encinas junto al Arroyo Fresnedoso, Talayuela, Cáceres, el 4 de mayo y otro macho cantor en el pinar de la Dehesa de Abajo de Tornavacas, Cáceres, el 10 de mayo de 2011 (J. Prieta). Un macho canta en

un pinar de la Sierra de las Nieves, Málaga, el 11 de junio de 2009 (R. Romero, J. Salcedo, A. Savijn y otros).

**MOSQUITERO MUSICAL***Phylloscopus trochilus*

**Canarias.** Citas en el sector occidental del archipiélago, donde hay pocos datos. En La Gomera, el 5 de octubre de 2011 se observan seis ejemplares en los jardines del parque Las Eras, Tecina, San Sebastián de La Gomera; al día siguiente, en los jardines de la Torre del Conde, en la capital de la isla, se detectan cuatro aves. Con posterioridad, el 7 de octubre de 2011, en el caserío de Benchijigua, San Sebastián de La Gomera, hay dos individuos, y otros dos en matorrales cercanos al aeropuerto de la isla en Alajeró (D. Trujillo y J. Leralta).

**REYZUELO SENCILLO***Regulus regulus*

Tres aves en retamas y pinos en Palos de la Frontera, Huelva, el 5 de diciembre de 2008 (R. Romero y P. Medina). Un ejemplar en lentiscos y encinas de río Grande, Baños de la Encina, Jaén, el 24 de febrero de 2011 (R. Romero).



**Mosquitero musical** *Phylloscopus trochilus*. San Sebastián de La Gomera (La Gomera). Foto: Domingo Trujillo.



**Papamoscas gris** *Muscicapa striata*. San Sebastián de La Gomera (La Gomera). Foto: Domingo Trujillo.

#### PAPAMOSCAS GRIS

*Muscicapa striata*

**Canarias.** En La Gomera, el 5 de octubre de 2011 se observa un ejemplar en Sardina, Loma de Tecina, y dos en los jardines del parque Las Eras, Tecina, San Sebastián de La Gomera. Al día siguiente se detectan tres aves en los jardines de la Torre del Conde, en la capital de la isla. Por último, el 7 de octubre de 2011 se avista un individuo en jardines de casa de La Roseta en Alajeró (D. Trujillo y J. Leralta).

#### PAPAMOSCAS CERROJILLO

*Ficedula hypoleuca*

**Canarias.** En La Gomera, citas de aves en paso: el 5 de octubre de 2011 se contabilizaron 17 ejemplares desde el inicio de la pista de entrada al caserío de Benchijigua hasta la galería de la casa de los Castaños, San Sebastián de La Gomera. En la misma fecha, en Sardina, Loma de Tecina, se observan cuatro individuos, y en los jardines del parque Las Eras, Tecina, San Sebastián de La Gomera, se cuentan 15-20 aves. Con posterioridad, el 6 de octubre de 2011, se observa un individuo en jardines de la Torre del Conde, en la capital de

la isla, dos en Valle Gran Rey y uno en las cercanías del mirador de Vallehermoso, Parque Nacional de Garajonay, mientras que el 7 de octubre de 2011 se observa uno en las proximidades del aeropuerto en Alajeró (D. Trujillo y J. Leralta).

#### BIGOTUDO

*Panurus biarmicus*

Se confirma la reproducción en Extremadura, en una localidad donde se consideraba probable los últimos años: en el observatorio nº 4 del embalse de Arrocampo, una hembra entra con ceba a un mazo de espadañas el día 3 de junio de 2011 (J. Hawkins); en la localidad había citas previas en 2011 de un ejemplar los días 3 y 8 de abril, y dos el 23 de abril de 2011 (M. Kelsey).

#### PÁJARO MOSCÓN

*Remiz pendulinus*

*Corrección:* en *Ardeola*, 57: 545 la fecha correcta de la cita de un individuo en el río Genil, Cuevas Bajas, Málaga, es el 15 de mayo de 2010.

#### CARBONERO COMÚN

*Parus major*

Un ejemplar comiendo sobre un ratón aplastado en la carretera hacia la localidad de Aldeacentenera, Cáceres, el 3 de marzo de 2011 (A. Ortega).

#### TREPARRISCOS

*Tichodroma muraria*

Una pareja cría a 700 m de altitud en Teverga, Asturias, en el año 2011 (M. Alonso).

#### ALCAUDÓN DORSIRROJO

*Lanius collurio*

En Salamanca, una pareja en la subida a la estación de esquí de La Covatilla, a 1.300 m, el 19 de junio de 2011 (R. Montero) y una pareja a 1.100 m en Candelario, el 6 de agosto de 2011 (R. Montero). Observaciones en la provincia de Ávila en 2011: una pareja en el puerto de Peñanegra, a 1.900 m, el 12 de junio (S. Langlois y D. Langlois) y el día 20 de julio se observa un juvenil en el mismo lu-

gar (J. Prieta); un adulto en una zona de pastizal alternando con pironales, a 1.550 m de altitud, en el término municipal de Becedas, en la cara norte de la subida al puerto de El Tremedal, el 12 de junio y un juvenil junto a un adulto en el mismo punto el 25 de julio (R. Bueno); un macho en la sierra de la Paramera, a 1.670 m de altitud, bajo el Pico Zapatero, Sotalvo, el 15 de junio de 2011 (J. Yepes y R. Sánchez Sánchez). Un ejemplar en Retuerta del Bullaque, Cabañeros, Ciudad Real, el 17 de septiembre de 2011 (X. Piñeiro y J. Muddeman). **Baleares.** En Mallorca, un ejemplar de primer invierno en Ses Planes, Calvià, el 1 de septiembre de 2010 (P. A. Garnett/AOB). Un ave de primer año en la albufera de Mallorca el 3 de septiembre de 2010 (M. Rebassa/AOB). En Cabrera, un joven es capturado para anillamiento el 15 de septiembre de 2010 y otro al día siguiente (J. Adrove y J. M. González/AOB), posteriormente se vuelve a ver otro juvenil diferente el 18 de septiembre de 2010 (J. M. González/AOB). En la isla del Aire, Sant Lluís, un joven es anillado el 30 de septiembre de 2010 (Ó. García, A. Pioli y E. Garriga/AOB).

#### URRACA

*Pica pica*

Un ave observada en el Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 24 de diciembre de 2010 (J. Alba y E. Alba).

#### CHOVA PIQUIRROJA

*Phyrrocorax phyrrocorax*

**Canarias.** En Tenerife, dos aves sobrevolando La Fortaleza en Las Cañadas, en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide, el 28 de mayo de 2011 (H. Wilkens y U. Strecker). De esta especie ya se incluyeron dos citas previas de dos aves vistas en dos localidades distantes, una de ellas también en el Parque Nacional de Las Cañadas del Teide (véase *Ardeola*, 57: 546).

#### CUERVO

*Corvus corax*

**Canarias.** En La Gomera, donde se encuentra en serio declive y ha desaparecido de muchos enclaves: el 25 de octubre de 2011 en el vertedero de

El Revolcadero, en San Sebastián de La Gomera, se contabilizan 20 ejemplares posados en cables de un tendido (D. Trujillo).

#### ESTORNINO NEGRO

*Sturnus unicolor*

**Baleares.** En Cabrera, un ave en un bando de estorninos pintos el 9 de octubre de 2010 (D. Cuenca/AOB). En Mallorca, un ejemplar en un bando de estorninos pintos en Llubí el 4 de diciembre de 2010 (M. Rebassa/AOB). En Menorca, dos ejemplares sobre una torre eléctrica y ocho aves volando ambos en la carretera de Artrutx, Ciutadella, el 12 de diciembre de 2010 (J. Florit y D. Coll/AOB).

#### GORRIÓN MOLINERO

*Passer montanus*

Primeros datos de presencia en la sierra de Aracena, Huelva: un ejemplar en Cañaveral de León, el 17 de marzo de 2010 y dos aves en meses posteriores (R. Romero).

#### GORRIÓN ALPINO

*Montifringilla nivalis*

**Baleares.** Un ejemplar en el monte de Massanel·la, Escorca, Mallorca, el 10 de enero de 2009 (E. Olivieri/AOB).



**Gorrión alpino** *Montifringilla nivalis*. Puig del Masanella (Mallorca). Foto: Eduardo Olivieri.

**OBISPO CORONIGUALDO***Euplectes afer*

Mayor cifra registrada en Extremadura: en el Puente de Palmas, río Guadiana, Badajoz, se observan 12 aves el 18 de septiembre de 2011 y 20 ejemplares el día 24 (J. C. Paniagua).

**ESTRILDA COMÚN***Estrilda astrild*

Nueva localidad de cría: en la Ribera de los Limonetes-Nogales, Torre de Miguel Sesmero, Badajoz, se observan nueve ejemplares el 15 de septiembre de 2011; siete, uno de ellos con material para el nido, el día 18 y tres, uno con material, el día 20 (J. Guerra y M. Gálvez).

**Canarias.** En Gran Canaria, el 16 de octubre de 2011 en Tafira Alta, junto al cauce del barranco de Guinguada, Las Palmas de Gran Canaria, se observa un bando compuesto por 50-70 ejemplares

que se refugia en vegetación anexa a cultivos de maíz (A. Delgado y O. Navarro).

**PINZÓN REAL***Fringilla montifringilla*

Concentración en un gran dormitorio de casi un millón de aves en el Alto de Barazar, Vizcaya, donde el 30 de noviembre de 2010 se estimaron 902.022 ejemplares; el dormitorio estuvo frecuentado hasta marzo de 2011 (G. Belamendia, J. A. Isasi, I. Zuberogoitia, J. Arizaga, J. Zabala, A. Crespo y A. Iraeta/Sociedad de Ciencias Aranzadi).

**VERDERÓN SERRANO***Serinus citrinella*

En Sierra Nevada, Granada, se detecta su presencia en una nueva zona a unos 2 km hacia el este del Puerto de la Ragua, único enclave conocido reproductor, en pinares de pino silvestre



**Pinzón real** *Fringilla montifringilla*. Alto de Barazar (Vizcaya). Foto: Ramón Arambarri.

tre y pino negro (a 2.100 m de altitud) el 22 y 23 de enero de 2011 (I. García Páez, F. Guerrero Ruíz e I. Álvarez Escobar). Hasta 14 ejemplares en Mondoñedo, Lugo, el 19 de abril de 2011 (L. J. Salaverri). Una pareja en Oourol, Lugo, el 25 de abril de 2011 (R. Hevia). Varios ejemplares en Candelario, Salamanca, el 29 de julio de 2011 (J. P. Prieto).

#### **JILGUERO LÚGANO**

*Carduelis spinus*

Un ave en un pinar de pino silvestre en la Sierra de Malagón, Madrid, el 15 de mayo de 2011 (R. Martínez). Un macho cantando y otro ejemplar más en la Sierra de Francia, Tornadizos, Salamanca, el 17 de mayo de 2011 (J. Gayo). Una hembra en una zona de campiña pero con pinares muy próximos, cerca de Cofiñal, Puebla de Lillo, León, el 21 de junio de 2011 (F. Roviralta).

#### **PIQUITUERTO COMÚN**

*Loxia curvirostra*

Segunda localidad y segundo registro de cría segura en Extremadura: en el pinar de la Dehesa de Abajo, Tornavacas, Cáceres, un macho cantando a 1.520 m s.n.m. el 10 de mayo de 2011 (J. Prieta) y se observa un joven volantón el 24 de mayo (I. Solana y J. Prieta). Reproducción probable en Sierra Morena, donde no hay datos previos: en la primavera de 2010 se localiza una población de varias decenas de aves en pinares de los Montes Comunales de Adamuz, Córdoba; posteriormente en dicho lugar se observan hembras, machos y jóvenes (R. Romero).

#### **CAMACHUELO TROMPETERO**

*Bucanetes githagineus*

Una hembra en Cariño, A Coruña, el 16 de mayo de 2011 (J. M. Alonso).



**Pinzón real** *Fringilla montifringilla*. Alto de Barazar (Vizcaya). Foto: Ramón Arambarri.

**Baleares.** En Cabrera, un adulto capturado para anillamiento el 30 de abril de 2010 (E. Amengual y D. Cuenca/AOB). En Mallorca, una hembra adulta es capturada y anillada en un abrevadero, presentaba placa incubatriz en regresión y signos de muda activa en el cuerpo, en la Trapa, Andratx, el 4 de julio de 2010 (X. Llabrés/AOB). Un individuo de primer año en Cabrera, visto desde el 1 al 14 de octubre de 2010, que fue capturado para anillamiento el 2 de octubre (E. Amengual, D. Cuenca, C. Álvarez y B. Servera/AOB).

#### CAMACHUELO COMÚN

##### *Pyrrhula pyrrhula*

Un ave capturada para anillamiento en el arroyo del Infierno, Ceuta, el 14 de noviembre de 2010 (J. Navarrete y F. J. Gaona). Observación estival en Cáceres: dos ejemplares en Villanueva de la Vera el 5 de junio de 2011 (D. Langlois).

#### ESCRIBANO NIVAL

##### *Plectrophenax nivalis*

Un macho en Roncesvalles, Navarra, del 26 al 28 de octubre de 2011 (G. Gorospe). Uno en Gijón, Asturias, el 30 de octubre de 2011 (J. Menéndez). **Baleares.** En Menorca, un macho en el aeropuerto, Maó, desde el 11 al 13 de noviembre de 2010 (B. Esteban/AOB).

#### ESCRIBANO HORTELANO

##### *Emberiza hortulana*

Se encuentran poblaciones densas al este del área conocida en Sierra Nevada, en piornal (2.200-2.300 m) entre la vertiente noreste del Chullo y los Peñones del Mediodía, Granada y Almería, el 22 de junio de 2011 (I. García Páez, F. Guerrero Ruíz e I. Álvarez Escobar).

#### BIBLIOGRAFÍA

BALLESTEROS, G y DAMIÁN-NAVARRO, J. D. 1997. Curruca tomillera *Sylvia conspicillata*. *Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana*: 94.

BUENO, A. (Coord.). 2010. Águila imperial ibérica, *Aquila adalberti*. Rocín Vol VI. *Anuario Ornitológico de Aragón 2004-2007*: 239.

GONZÁLEZ, J. M., REBASSA, M., VENTOSO, L., LÓPEZ-JURADO, C., GARRIGA, E., DE PABLO, F., ESCANDELL, R., MÉNDEZ, X. y MARTÍNEZ, Ó. 2011. Registros Ornitológicos 2010. *Anuari Ornitològic de les Balears 2010*: 95-227.

IRBY, L. H. 1895. *The ornithology of the Straits of Gibraltar* (2ª edición.). Taylor & Francis. Londres.

LÓPEZ-JURADO, C, GARCÍA, Ó., MARTÍNEZ, O., MUNTANER, J., NICOLLS, S., REBASSA, M. y HERRERO, C. 2011. Homologació de Rareses Ornitològiques a Balears 2010. *Anuari Ornitològic de les Balears, 2010*. Volum 25: 77-93.

LORENZO, J. A. 2007 (Ed.). *Atlas de las aves nidificantes en el archipiélago canario (1997-2003)*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SEO/BirdLife. Madrid.

MARTÍN, A., HERNÁNDEZ, M. A., LORENZO, J. A., NOGALES, M. y GONZÁLEZ, C. 2000. *Las palomas endémicas de Canarias*. Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y SEO/BirdLife.

MIGUÉLEZ, D., ZUMALACÁRREGUI, C. y ACEBES, A. 2011. Gansos, patos y porrones. En, J. García, N. Rodríguez, D. Miguélez y M. de Gabriel, 2011. *Guía de las aves de la provincia de León*. Diputación de León-Grupo Ibérico Anillamiento. León.

PATERSON, A. 1997. *Las aves marinas de España y Portugal*. Lynx Ediciones. Barcelona.

PATERSON, A. 2002. *Las aves marinas de la península Ibérica, Baleares y Canarias*. Edilexa. León.

AGRADECIMIENTOS.—En especial a todos aquellos colaboradores que envían sus observaciones. Agradecer a Sergio Mayordomo por su colaboración en la recopilación de la mayoría de los registros de Extremadura, así como a Nacho Dies y Ricard Gutiérrez del Comité de Rarezas de SEO/BirdLife el envío de algunas citas que llegan a este comité.