



Noticario Ornitológico

Authors: Molina, Blas, Prieta, Javier, and Lorenzo, y Juan Antonio

Source: Ardeola, 60(1) : 151-188

Published By: Spanish Society of Ornithology

URL: <https://doi.org/10.13157/arla.60.1.2012.151>

BioOne Complete (complete.BioOne.org) is a full-text database of 200 subscribed and open-access titles in the biological, ecological, and environmental sciences published by nonprofit societies, associations, museums, institutions, and presses.

Your use of this PDF, the BioOne Complete website, and all posted and associated content indicates your acceptance of BioOne's Terms of Use, available at www.bioone.org/terms-of-use.

Usage of BioOne Complete content is strictly limited to personal, educational, and non - commercial use. Commercial inquiries or rights and permissions requests should be directed to the individual publisher as copyright holder.

BioOne sees sustainable scholarly publishing as an inherently collaborative enterprise connecting authors, nonprofit publishers, academic institutions, research libraries, and research funders in the common goal of maximizing access to critical research.

NOTICARIO ORNITOLÓGICO

Blas MOLINA¹, Javier PRIETA² y Juan Antonio LORENZO³ (Canarias)

Como en anteriores entregas, a las citas recibidas habitualmente se han incorporado otras recogidas en distintos foros, así como en algunos blogs y páginas web. Agrupan información de 186 especies repartidas por toda la geografía nacional. Con el fin de facilitar la labor de recopilación de datos, se recomienda el envío de las observaciones de interés a la dirección noticiario@seo.org.

CISNE VULGAR

Cygnus olor

Intento de reproducción: una pareja en la balsa de Zolina, Navarra, que llega a construir nido en mayo de 2012, aunque sin éxito; en 2013 aparecen de nuevo el 23 de febrero hasta tres ejemplares y la primavera de 2013 se vuelve a ver construir de nuevo un nido (M. García Valentín). Tres ejemplares en las marismas Blancas, Astillero, Cantabria, el 12 de marzo de 2010 (L. M. Arce, B. Alonso y F. J. Portillo). Dos aves en las marismas de Santoña, Cantabria, el 19 de diciembre de 2010 (L. M. Arce). Seis aves en el embalse de Pedrezuela, Guadalix de la Sierra, Madrid, el 9 de enero de 2013 (A. H. Ortega, J. Alcoba y J. Gómez Esteban) y de nuevo el 7 de abril (D. Fernández). Seis en el embalse de Navalcán, Toledo, el 16 de marzo de 2013 (M. Fernández Tizón). Uno en el embalse de Montijo, Mérida, Badajoz, el 19 de marzo de 2013 (F. Crystal).

ÁNSAR CARETO

Anser albifrons

En Sevilla, dos aves en Veta la Palma, Coria del Río, el 16 de noviembre de 2011 (I. Sanmartín), 12 individuos en Los Caracoles, Aznalcázar, el 5

de diciembre de 2012 (I. San Martín) y uno el 7 de enero de 2013 (F. Chiclana) y 26 aves en la marisma Gallega, Hinojos, el 18 de enero de 2013 (J. A. Sarrón). Dos adultos en el embalse de Castrejón, Toledo, el 2 de noviembre de 2012 (A. Nicolau). Durante la invernada 2012-2013 las cifras más destacadas en el embalse del Ebro, Cantabria-Burgos, son 18 ejemplares el 2 de diciembre, 23 el 11 de diciembre y 24 aves el 23 de diciembre (M. Estébanez, G. Rodríguez, D. González, M. E. Carballal y otros). Durante la invernada 2012-2013 las cifras más destacadas en la laguna de La Nava, Palencia, son 27 ejemplares el 17 de noviembre, 63 el 3 de enero, 44 el 22 de enero y 94 el 22 de enero (Junta de Castilla y León; J. Sagardía, D. González, M. E. Carballal y otros). Durante la invernada 2012-2013 las cifras más destacadas en la laguna de Boada de Campos, Palencia, son 7 ejemplares el 5 de noviembre y 12 el 4 de diciembre (F. Jubete, J. Otal, D. González, D. Santamaría y otros), 27 aves el 17 de noviembre, 63 el 3 de enero, 44 el 22 de enero y 94 el 22 de enero (Junta de Castilla y León; J. Sagardía, D. González, M. E. Carballal y otros). Durante la invernada 2012-2013 las cifras más destacadas en Villafáfila, Zamora, son 13 ejemplares el 19 de noviembre, 27 el 6 de enero y 26 el 31 de enero (C. Osorio, C. Villaverde, A. Rodrigo, J. J.

¹ noticiario@seo.org; bmolina@seo.org

² javierprieta@gmail.com

³ jalorenzo@seo.org



Ánsar careto *Anser albifrons*. Laguna de La Nava (Palencia). Foto: Delfín González.

Orduña y otros). Dos ejemplares en la laguna del Oso, Ávila, el 27 de diciembre de 2012 (J. M. Herranz). Un ejemplar en Inurritza, Zarautz, Guipúzcoa, el 2 de enero de 2013 (H. González). En la provincia de Cáceres: máximo de diez individuos en el embalse de Valdecañas, entre el 11 de noviembre de 2012 y el 3 de febrero de 2013 (SEO-Cáceres), y dos aves en el embalse de El Borbollón, entre el 10 de diciembre de 2012 y el 11 de febrero de 2013 (G. Naharro, F. Salas, A. Torrijo y otros). En Badajoz, uno en Moheda Alta, Navalvillar de Pela, el 1 de diciembre de 2012 (M. García del Rey, J. R. Suárez y D. Cuenca); uno el 8 de enero de 2013 en Vegas Altas, Badajoz (J. Guerra y M. Gálvez) y otro el 8 de enero de 2013 en el embalse de Los Canchales, (F. Montaña, J. Vázquez y J. Delgado). Dos aves en la laguna de Zolina, Navarra, el 5 y 7 de febrero de 2013 (A. Bertolo y M. García Valentín). Dos aves en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, Ciudad Real, el 13 de febrero de 2013 (J. M. Herranz Fernández).

ÁNSAR COMÚN

Anser anser

En enero de 2013 se censan 23.175 ejemplares en Extremadura, siendo las localidades más importantes Vegas Altas, Badajoz y Cáceres, con 18.800 aves, y el embalse de Valdecañas, Cáceres, con 2.950 ejemplares (SEO/BirdLife y Junta de Extremadura). Cuatro aves en El Rocío, Huelva, el 8 de mayo de 2012 (A. Domínguez). Una pareja con tres pollos en el delta del Llobregat, Barcelona, el 5 de abril de 2013 (F. López) y una segunda pareja con pollos el 21 de abril (E. Ramon). Corresponde al cuarto año consecutivo que se reproduce esta especie en este delta. Ya en el mes de abril de 2010, dos parejas se reprodujeron con éxito por primera vez, aunque uno de ellos correspondía a un ejemplar escapado; en 2011 este individuo desapareció pero el resto de individuos volvieron a reproducirse en las siguientes temporadas (F. López). Por segundo año consecutivo se reproduce una pareja en la balsa de Arkaute,

Salburúa, Álava: el 23 de marzo de 2013 se observa una pareja con al menos 5 pollos de pocos días. Los indicios apuntan a ejemplares reproductores silvestres (L. Lobo).

ÁNSAR INDIO

Anser indicus

Uno, probablemente juvenil, en la laguna de La Nava, Palencia, el 19 de febrero de 2012 (L. M. Arce y otros/SEO-Asturias); estaba presente el 8 de febrero (F. Jubete). En Cáceres, uno en Vega Zorzalejos, Logrosán, Cáceres, el 11 de noviembre de 2012 (S. Mayordomo y L. Salguero) y uno en La Trebolosa, Madrigalejo, el 9 de diciembre de 2012 (S. Mayordomo). Un ejemplar en Villafáfila, Zamora, entre el 23 de noviembre de 2012 y el 26 de enero de 2013 (C. Osorio, X. Piñeiro, J. Portillo, J. Barrueso, T. Sanz, M. Novo y otros). En Huelva, uno en la Escupidera, Parque Nacional de Doñana, Huelva, el 4 de enero de 2013 (D. Peinazo) y un ejemplar en la marisma Gallega, Hinojos, entre el 7 y el 18 de enero de 2013 (F. Chiclana y J. A. Sarrón).

BARNACLA CANADIENSE GRANDE


Branta canadensis

Un ejemplar en Vega Zorzalejos, Logrosán, Cáceres, el 4 de noviembre de 2012 (L. Salguero y J. Á. Sánchez). Uno en las lagunas de Torremejía, Badajoz, entre el 24 de noviembre de 2012 y el 27 de enero de 2012 (F. Crystal, A. Cangas, V. de Alba y otros). Dos aves en la laguna de Pitillas, Navarra, el 31 de marzo de 2013 (H. Sarasa).

BARNACLA CARIBLANCA

Branta leucopsis

Un ejemplar en Escalante, marismas de Santoña, Cantabria, el 19 de diciembre de 2010 (L. M. Arce). Un ave en Oyambre, Cantabria, entre el 16 de noviembre de 2012 y el 18 de febrero de 2013 (A. Rincón). Uno en el río Urumea, barrio de Loyola, Donostia-San Sebastián, Guipúzcoa, los días 5 y 6 de enero de 2013 (J. Serradilla). Un ejemplar en la laguna de Pitillas, Navarra, el 31 de marzo de 2013 (H. Sarasa). En Palencia, tres aves en la laguna de La Nava, Fuentes de Nava,



Barnacla cariblanca *Branta leucopsis*. Graveras de Suzana (Burgos). Foto: David Martínez Andrade.

el 29 de enero de 2012 (S. Alarcón y C. Mateos), y 13 ejemplares en la laguna de Boada de Campos, el 4 de diciembre de 2012 (J. Otal, D. González y D. Santamaría) y durante la invernada 2012-2013 las cifras más destacadas en la laguna de La Nava fueron tres ejemplares el 17 de noviembre, siete el 4 de diciembre y 23 los días 2 y 31 de enero (J. Sagardía, J. M. Román, J. J. Orduña, J. A. Casado, J. Otal, D. González y otros). En Villafáfila, Zamora, dos ejemplares el 12 de noviembre de 2012 (C. Osorio) y uno el día 23 de noviembre (T. Sanz, M. Novo, M. Á. García Matellanes y J. A. Casado). Un ave de primer invierno en la laguna de Suzana, Burgos, el 20 de noviembre de 2012 (D. Martínez). Un ejemplar en un bando de 3.000 grullas próximo a la laguna Honda, Campillo de Dueñas, Guadalajara, el 11 de noviembre de 2012 (A. Torrijo y S. Martínez Ordas). Un ave de primer invierno en la isla de Buda, delta del Ebro, Tarragona, entre el 7 de diciembre de 2012 y el 1 de enero de 2013 (M. Illa, M. Vall Llosera y otros). En Cáceres: un ave

en Vega del Haza, Malpartida de Plasencia, entre el 19 de noviembre de 2012 y el 11 de enero de 2013 (J. Prieta, A. Redondo, S. Mayordomo y J. M. Diu), un individuo en el embalse de Valdecañas, entre el 2 de diciembre de 2012 y el 15 de enero de 2013 (V. Risco, J. Briz, S. Mayordomo, R. Montero y J. Prieta), uno en el embalse del Salor, entre el 30 de diciembre de 2012 y el 9 de febrero de 2013 (C. Fernández, M. Cardalliaguet, F. J. Caballero, C. Clemente y S. Mayordomo) y dos aves en el embalse de Portaje, Cáceres, el 17 de enero de 2013 (S. Mayordomo). Un ave en la Rianzuela, Puebla del Río, Sevilla, el 10 de junio de 2012 (A. Domínguez). Tres ejemplares en Isla Mayor, Sevilla, el 7 de noviembre de 2012; se sigue observando uno de ellos el 18 de enero de 2013 (J. L. Anguita y J. A. Sarrón).

BARNACLA CARINEGRA

Branta bernicla

Un ejemplar en Villaviciosa, Asturias, el 7 de diciembre de 2012 (P. Galiano, J. M. Paraíso, J. A.

Ximenis y R. Fernández). Observaciones en las marismas de Santoña: en 2012, 6 ejemplares el 4 de enero, 25 aves el 25 de enero, 28 individuos el 10 de febrero y 25 ejemplares el 17 de febrero (S. Alarcón); tres aves el 9 de diciembre (S. Alarcón y C. Mateos), 6 el 19 de diciembre (S. Alarcón y C. Mateos); en 2013, 12 aves el 5 de enero (S. Alarcón), 37 ejemplares el 27 de enero (A. G. Herrera), 33 aves el 31 de enero (S. Alarcón), 29 el 27 de febrero (C. Álvarez Usategui) y 22 aves el 10 de marzo (A. García Herrera). Siete aves en Raos, bahía de Santander, Cantabria, el 26 de febrero de 2012 (S. Alarcón). Un ejemplar en el Puerto de Hondarribia, Guipúzcoa, el 29 de noviembre de 2012 (R. Rodríguez y J. Ardaiz). Cuatro ejemplares en Urdaibai, Vizcaya, el 31 de enero de 2013 (K. de Dios). Un ejemplar en Plaiaundi, Irún, Guipúzcoa, el 22 de febrero de 2012 (D. Calleja). Siete aves en la desembocadura del río Arillo, San Fernando, bahía de Cádiz, entre el 28 de enero y el 4 de febrero de 2013 (J. M. Rubio, D. Agüero, J. Ruiz y otros).



Ganso del Nilo *Alopochen aegyptiacus*. Río Tajo, ciudad de Toledo. Foto: Eulogio Novillo.


GANSO DEL NILO*Alopochen aegyptiacus*

Entre 8 y 11 ejemplares presentes durante todo el mes de octubre de 2012 en el embalse del Cubilar, Logrosán, Cáceres (W. Haworth, S. Mayordomo, M. García del Rey, J. Mahillo, E. Peña, E. Palacios y C. Clemente). Se encuentra un ave muerta por causas desconocidas en el Caserío de Henares, San Fernando de Henares, Madrid, el 26 de abril de 2012 (J. López Septiem). Tres aves en el Parque de Valdebernardo, Madrid, el 23 y 24 de diciembre de 2012 (F. Álamo). Uno en el río Tajo, ciudad de Toledo, durante las dos primeras semanas de enero de 2013 (E. Novillo). Dos aves en el río Manzanares, Madrid-Río, el 25 de enero de 2013 (M. Martínez) y de nuevo una hembra el 11 de marzo de 2013 (M. Martínez y M. Fernández Lamadrid). Uno en la Cañada de las Norias, Almería, el 25 de marzo de 2013 (J. Contreras). Un ejemplar en la balsa del Sapo, Las Norias, Almería, el 29 de marzo de 2013 (R. Tarifa, A. Tarifa y M. Á. Baeza). Cinco aves

en el Puerto de A Guarda, Pontevedra, el 7 de abril de 2013 (S. Altiber).

TARRO CANELO*Tadorna ferruginea*

Cuatro aves en el azud de Riolobos, Salamanca, el 9 de junio de 2012 (M. Rodríguez). Dos aves en los humedales de Salburúa, Vitoria, Álava, el 15 de junio de 2012 (G. Belamendia). Dos en el embalse del Guadalén, Úbeda, Jaén, el 30 de octubre de 2012 (J. F. Grahn y E. Vidmark). Seis individuos en la laguna La Ballestera, La Lantejuela, Sevilla, el 31 de diciembre de 2012 (F. Chiclana). En Madrid: 16 aves en el embalse de Santillana, Manzanares El Real, el 18 de enero de 2013 (A. H. Ortega Morejón), uno en Valdetorres del Jarama, el 16 de febrero de 2013 (J. Kerstiens y R. Kerstiens), y dos parejas en la ruinas del castillo de Villanueva de la Cañada, el 25 de febrero de 2013 (D. Merritt). Un ejemplar en la marisma Gallega, Doñana, Sevilla, los días 29 y 30 de enero de 2013 (J. A. Sarrón). Uno en el embalse



Tarro canelo *Tadorna ferruginea*. Tías (Lanzarote). Foto: Francisco Javier García Vargas.

de El Vicario, Ciudad Real, el 9 de marzo de 2013 (M. J. Valencia y J. Tolosa).

Canarias. En Lanzarote, nuevos datos de cría: se constata su nidificación con éxito otra vez en las Salinas de Janubio, Yaiza, donde se observan de nuevo dos aves, macho y hembra, el 9 de octubre de 2012, y el 15 de abril de 2013 tienen 10 pollos, los cuales se observan más crecidos el 1 de mayo de 2013 (F. J. García Vargas). Además, en esta misma isla, nuevo enclave de cría: dos aves, macho y hembra, en el campo de golf de Tías desde el 6 de diciembre de 2012, y el 31 de marzo de 2013 en compañía de 12 pollos, de los cuales sobreviven 10, el 21 de abril de 2013, y se comprueba que están bastante más crecidos el 24 de abril de 2013 (F. J. García Vargas). En Fuerteventura, en el islote de Lobos, La Oliva, primera cita: tres adultos en los encharcamientos junto al faro el 28 de octubre de 2012 (G. Tejera). En Tenerife, de nuevo se constata su presencia en el sur de la isla, en este caso se trata de un ejemplar adulto visto el 18 de marzo de 2013 en la presa de Bernardino, Granadilla de Abona (A. Acedo, C. García y A. Díaz Toledo) y de nuevo allí el 21 de marzo de 2013 (A. Hernández); posterior-

mente, dicho ejemplar se cita en una de las charcas de Amarilla Golf, San Miguel de Abona, los días 30 de marzo y 10 de abril (A. Acedo, C. García y A. Díaz Toledo), así como el 14 de abril de 2013 (A. Acedo, A. Díaz Toledo, R. Barone, V. R. Cerdeña, R. Larsson, M. Fernández del Castillo y J. Vizcaíno).

PATO MANDARÍN


Aix galericulata

Una hembra en Villaviciosa, Asturias, el 6 de diciembre de 2012 (A. Villaverde y X. Cortés). Dos machos y tres hembras en el río Miño, Lugo, entre el 9 y el 18 de enero de 2013 (D. Calleja).

ÁNADE FRISO

Anas strepera

Canarias. En Tenerife, datos de invernada: macho en estanques de El Polvillo, Los Silos, del 15 de noviembre de 2012 al 10 de marzo de 2013 (B. Rodríguez), y en la charca de El Fraile, Arona, uno el 12 de noviembre de 2012 y dos ejemplares desde el 19 de noviembre de 2012 hasta



Ánade friso *Anas strepera*. Los Silos (Tenerife). Foto: Beneharo Rodríguez.

el 28 de enero de 2013, así como en la presa de Armeñime, Adeje, dos aves el 8 de marzo de 2013 (M. B. Lancaster).

CERCETA COMÚN

Anas crecca

Cifra destacada de 10.255 ejemplares censados en el embalse de Sierra Brava, Cáceres, el 12 de enero de 2013 (J. Prieta y E. Palacios).

Canarias. Datos de invernada en distintas islas. En Lanzarote, grupo de siete aves en el campo de golf de Tías el 29 de octubre de 2012, quedando tres aves el 30 de octubre, las cuales permanecen en el lugar hasta el 28 de noviembre de 2012 (F. J. García Vargas). En Tenerife, grupo de seis aves en el mar, en aguas frente a Taganana, Santa Cruz de Tenerife, el 29 de octubre de 2012 (A. Hernández). En esta misma isla, el 4 de noviembre de 2012 en la balsa de La Cruz Santa, Los Realejos, se observan 10 ejemplares entre los que hay al menos dos machos, y 12 aves el día 12 del mismo mes, así como 13 individuos entre el 23 y el 30 de noviembre de 2012, pero ya no están presentes el 5 de diciembre de 2012, puesto que la balsa está vacía por trabajos de impermeabilización (D. Trujillo). En La Gomera, un macho en el embalse Arure, Quintana, Valle Gran Rey, y otro en muda junto a una hembra en la presa de Antoncojo, Alajeró, el 2 de enero de 2013 (D. Trujillo).

ÁNADE AZULÓN

Anas platyrhynchos

Reproducción en invierno: una hembra con 11 pollos en un pequeño parque urbano de la ciudad de Vitoria, Álava, el 5 de enero de 2013, que podrían ser silvestres; en la zona en primavera ya han criado algunos ejemplares silvestres (L. Elorza y C. R. F. Martioda).

ÁNADE RABUDO

Anas acuta

Se censan 10.065 individuos en el embalse de Sierra Brava, Cáceres, el 12 de enero de 2013 (J. Prieta y E. Palacios).

Canarias. En Tenerife, una hembra en una de las charcas de un campo de golf en San Miguel

de Abona el 8 de noviembre de 2012 (R. Barone y S. Greif).

CERCETA CARRETONA

Anas querquedula

Canarias. En Tenerife, macho adulto en plumaje de eclipse en la balsa de San Antonio, La Matanza de Acentejo, el 9 de noviembre de 2012, junto a 10 cercetas comunes (S. Greif y R. Barone).

CUCHARA COMÚN

Anas clypeata

Se cuentan 16.355 aves en el embalse de Sierra Brava, Cáceres, el 12 de enero de 2013 (J. Prieta y E. Palacios). Unos 14.000 ejemplares en la Dehesa de Abajo, Puebla del Río, Sevilla, el 29 de noviembre de 2012 (F. Chiclana). Reproducción en la provincia de Málaga: una hembra con dos pollos en la desembocadura del río Guadalhorce el 13 y 15 de junio de 2012 (E. Alba y J. Alba).

Canarias. En La Palma, un ejemplar en una charca de riego de La Costa, Tazacorte, los días 1, 2, 5, 18 y 31 de diciembre 2012, así como un macho en la misma charca el 26 de enero y, de nuevo, el 9 de febrero 2013 (R. Burton).

CERCETA PARDILLA

Marmaronetta angustirostris

Siete aves en la Dehesa de Abajo, Puebla del Río, Sevilla, el 29 de noviembre de 2012 (F. Chiclana).

PORRÓN EUROPEO

Aythya ferina

Un macho con características de híbrido con porrón pardo en el delta del Llobregat, Barcelona, el 29 de marzo de 2013 (S. Alarcón y C. Mateos).

PORRÓN PARDO

Aythya nyroca

En Navarra, en la laguna de Pitillas, se observan hasta dos adultos entre el 22 de diciembre 2012 y el 4 de febrero de 2013 (J. C. Lorenzo, M. García) y uno en la laguna de Lor, Cascante, el 28 de diciembre de 2012 (F. Orduña). En la provincia

de Burgos: dos aves, un primer invierno y un macho adulto, en la balsa de Arrieta, Treviño, entre el 21 de enero y el 24 de febrero de 2013 (D. Martínez, S. Alarcón, J. A. García y otros) y uno en la laguna de Gayangos, el 10 de febrero de 2013 (M. Alonso y J. A. de la Torre). Tres ejemplares en la balsa de Candasnos, Huesca, el 23 de febrero de 2013 (O. Baena). Observaciones en Extremadura: presencia en la charca de Atalaya, Aldea del Cano, Cáceres, desde octubre de 2012 hasta el 17 de febrero de 2013, con máximo de seis aves el 25 de octubre (M. Iglesias, J. Solana y SEO-Cáceres); tres ejemplares en el embalse de Cubilar, Logrosán, Cáceres, el 18 de noviembre de 2012 (SEO-Badajoz), y un macho en Moheda Alta, Navalvillar de Pela, Badajoz, el 28 de octubre y el 9 de noviembre de 2012 (S. Mayordomo, M. García del Rey, J. Mahillo, E. Palacios y C. Clemente). Un ejemplar en la Junta de los Ríos, Rivas-Vaciamadrid, Madrid, el 30 de enero de 2013 (B. Gómez). Tres ejemplares en los charcones de Miguel Esteban, Toledo el 29 de marzo de 2013 (J. García de los Ríos). Un adulto en la laguna de Navaseca, Daimiel, Ciudad Real, entre el 13 de febrero y el 29 de marzo de 2013 (J. M. Herranz y A. Olabarria). Dos aves en Prado Ancho, Tablas de Daimiel, Ciudad Real, el 11 de abril de 2013 (B. Molina). Avistamiento de un grupo de seis ejemplares compuesto por tres machos adultos, dos hembras adultas y un juvenil en una laguna somera del Salar de los Carros, Vera, Almería, el 3 de agosto de 2012 (R. Aparicio; véase *Ardeola*, 59: 415). En la Dehesa de Abajo, Puebla del Río, Sevilla, tres aves el 22 de noviembre de 2012 (F. Chiclana) y dos desde el 27 de diciembre de 2012 al 18 de enero de 2013 (J. A. Sarrón). Un macho y una hembra adultos en la laguna Juncosa, Puerto de Santa María, Cádiz, el 23 de febrero de 2013 (R. García). Un macho y una hembra adultos en la laguna de la Paja, Chiclana de la Frontera, Cádiz, el 16 de marzo de 2013 (R. García). En Málaga, nueve aves en la laguna Dulce de Campillos, el 4 de febrero de 2012 (J. Alba y E. Alba), y un macho el 6 de octubre de 2012 (G. Lage, F. Botella y otros), y siete ejemplares, tres machos adultos, tres hembras adultas y un macho joven, en la desembocadura del Guadalhorce, el 6 de octubre de 2012 (A. Tamayo, M. Araújo y M. García).

PORRÓN MOÑUDO

Aythya fuligula

Reproducción en Burgos: varias parejas en 2012 en la laguna de Atapuerca (J. Otal). Una hembra con ocho pollos en el humedal de Salburúa, Vitoria, Álava, el 6 de julio de 2012 (S. Alarcón). Cifras destacadas en el censo de aves acuáticas de enero de 2013 en Extremadura: 99 ejemplares en la charca de Brozas, Cáceres, el 5 de enero (C. Fernández); 52 en Charco Salado, Casatejada, Cáceres, el 20 de enero (D. Langlois, J. Briz, M. García del Rey, M. Kelsey y S. Langlois), y 212 aves en el embalse de Orellana, Badajoz, el 24 de enero (Á. Sánchez y Á. L. Sánchez). Un ejemplar con características de híbrido con *A. marila* en la ría del Eo, Castropol, Asturias, el 16 de enero de 2010 (L. M. Arce y otros).

Canarias. En Tenerife, un macho en la balsa de La Tabona, La Guancha, desde el 12 de noviembre de 2012 hasta el 12 de febrero de 2013 (D. Trujillo), visto también en dicho lugar el 16 de diciembre de 2012 (R. Larsson y R. Barone) y de nuevo el 28 de enero de 2013 (D. Trujillo, R. Barone y M. Masing). Otro macho en uno de los estanques escalonados del barranco del Espinal, entre Tejina y Valle de Guerra, La Laguna, los días 12 de enero y 9 de febrero de 2013 (R. Barone, V. R. Cerdeña, J. Vizaño y M. Fernández del Castillo), aunque estaba allí desde el día 6 de diciembre de 2012 (B. Rodríguez), y también se cita el 8 de febrero de 2013 (A. Betoret). En La Palma, en charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, dos aves a principios de noviembre 2012, aumentando a un grupo de un total de 12-13 ejemplares a partir del 2 de diciembre de 2012, y que permaneció allí durante enero y febrero 2013, si bien el 2 de marzo de 2013 ya sólo quedaban cuatro aves, y a partir del día 10 del mismo mes ninguna (R. Burton).

PORRÓN BASTARDO

Aythya marila

Tres adultos, un macho y dos hembras, en la ensenada de La Linera, ría del Eo, Castropol, Asturias, el 16 de enero de 2010 (L. M. Arce y otros) y cuatro hembras el 15 de enero de 2011 (L. M. Arce y P. Fernández). En las marismas de San-

toña: un macho adulto en Colindres, el 18 de diciembre de 2010 (L. Marce y otros), una hembra el 9 de diciembre de 2012 (S. Alarcón y C. Mateos), una hembra el 1 de marzo de 2013 (S. Alarcón) y un macho y una hembra adultos el 3 de marzo de 2013 (J. M. Domínguez). Una hembra en el embalse de Urrunaga, Villarreal-Legutiano, Álava, el 19 de enero de 2013 (J. Á. Nuevo/IAN). En León, una hembra en el embalse de Selga de Ordas, el 3 de enero de 2013 (T. Sanz) y una hembra de primer invierno en Santa Cristina del Páramo, entre el 22 de febrero y el 9 de marzo de 2013 (I. Fernández y J. A. Fernández). Un macho de segundo año en Villafáfila, Zamora, entre el 13 de diciembre de 2012 y el 30 de marzo de 2013 (C. Osorio, J. Barrueso y otros). Una hembra en Charco Salado, Casatejada, Cáceres, entre el 12 de enero y el 3 de febrero de 2013 (P. Gómez Correa y SEO-Cáceres). Una hembra en la finca Valdelagrana, término de Badajoz, el 12 de febrero de 2013 (Á. Sánchez y J. M. Rama). En Sevilla: una hembra de primer invierno en Veta la Palma, Coria del Río (R. Rodríguez Olivares) y otra en el lucio Rianzuela, Puebla del Río, Sevilla, el 22 de diciembre de 2012 (J. Garzón y J. J. Jiménez). Una hembra en la laguna del Soto de las Juntas, Rivas Vaciamadrid, Madrid, desde el 15 de noviembre de 2012 (V. Mayo).



Porrón bastardo *Aythya marila*. Soto de las Juntas, Rivas Vaciamadrid (Madrid). Foto: Vicente Mayo.

EIDER COMÚN

Somateria mollissima

Un macho y una hembra en la ensenada de Insúa, A Coruña, el 3 de enero de 2013 (C. D. Romai). En las marismas de Santoña, Cantabria: una pareja el 4 de enero y el 17 de febrero de 2012 (S. Alarcón), un macho en Montehano, los días 20 y 21 de octubre de 2012, y al parecer una pareja lleva en la zona un año (Gran Reto 2012), uno el 4 de enero de 2013 (D. Calleja, R. Rodríguez y otros), y una el 31 de enero (S. Alarcón) y el 10 de marzo de 2013 (A. García Herrera). Dos ejemplares en la albufera de Valencia, Valencia, los días 19 y 20 de noviembre de 2012 (B. Dies, T. Alcocer y otros).

PATO HAVELDA

Clangula hyemalis

Una hembra de primer invierno en Rianxo, A Coruña, el 5 de enero de 2013 (C. D. Romai y J. Portillo). Un individuo desde la Punta de la Vaca, Asturias, el 12 de octubre de 2012 (E. García Sánchez). Un macho de primer invierno en la ría de Tinamenor, Cantabria, entre el 6 y el 16 de noviembre de 2012 (F. J. Portillo, A. Ruiz Elajalde y otros). Uno en Betanzos, A Coruña, entre el 17



Pato havelda *Clangula hyemalis*. Dehesa de Abajo (Sevilla). Foto: César Sánchez Alonso-Misol.

de noviembre de 2012 y el 14 de enero de 2013 (X. Varela, D. Calleja y otros). Uno en el embalse de San Andrés, Gijón, Asturias, entre el 20 de noviembre de 2012 y el 30 de marzo de 2013 (M. Quintana, M. Fernández, X. Cortés y otros). Un macho en las marismas de El Rocío, Almonte, Huelva, el 12 de diciembre de 2012 (R. Galea). Un macho de primer invierno en la Dehesa de Abajo, Puebla del Río, Sevilla, entre el 12 de diciembre de 2012 y el 10 de marzo de 2013 (BirdLife-Malta, F. Chiclana, R. Romero, C. Sánchez Alonso-Misol, L. García y otros). Este ejemplar finalmente se estuvo viendo en este humedal en un periodo que abarcó desde el 12 de diciembre de 2012 al 8 de abril de 2013 (F. Chiclana).

NEGRÓN ESPECULADO

Melanitta fusca

Dos hembras adultas en paso hacia el oeste en el cabo Lastres, Colunga, Asturias, el 13 de septiembre de 2009 (L. M. Arce y B. Alonso). Un ejemplar en la ría de Ribadeo, Lugo-Asturias, entre el 4 y el 13 de enero de 2013 (P. Fernández y D. Calleja). En A Coruña, un joven en paso hacia el oeste en Estaca de Bares, Mañón, el 8 de octubre de 2011 (Luis Mario Arce y otros/SEO-Asturias), ocho aves en paso frente a este cabo el 27 de noviembre de 2012 (R. Hevia) y dos en el puerto de Camariñas, del 27 de diciembre de 2012 al 3 de enero de 2013 (Ó. Llama y C. D. Romai). Una hembra o joven en O Grove, Pontevedra, el 1 de diciembre de 2012 (C. D. Romai). Dos hembras en las marismas de Santoña, Cantabria, el 9 de diciembre de 2012 (S. Alarcón y C. Mateos), y 8 ejemplares el 22 de enero de 2013 (A. G. Herrera). Un juvenil en el embalse de la Loteta, Zaragoza, el 2 de diciembre de 2012 (F. J. Sampietro). Dos machos y cuatro hembras en la marina de Carmolí, Mar Menor, Cartagena, Murcia, entre el 5 de enero y el 23 de febrero de 2013 (R. Howard).

PORRÓN OSCULADO

Bucephala clangula

Un ave en las marismas Blancas, Astilleros, Cantabria, el 12 de marzo de 2010 (L. M. Arce, B. Alonso y F. J. Portillo). Una hembra en una pe-

queña laguna en Guadalmina, Marbella, Málaga, el 13 de febrero de 2013 (P. Read).

SERRETA MEDIANA

Mergus serrator

Sólo 19 ejemplares censados, una cifra muy baja, en el Mar Menor, Murcia, el 12 de enero de 2013 (A. J. Hernández, A. Nieto, F. Sánchez Solana y P. López Barkero).

MALVASÍA CABECIBLANCA

Oxyura leucocephala

Se cuentan 60 ejemplares en la laguna Dulce de Campillos, Málaga, el 6 de octubre de 2012 (G. Lage, F. Botella y otros). Un macho y una hembra en la laguna de Meco, Meco, Madrid, el 24 de abril de 2013, que no se vuelven a localizar al día siguiente (A. Aparicio y C. Talabante).

CODORNIZ COMÚN

Coturnix coturnix

Un ave en Pardevacas, Salteras, Sevilla, el 14 de enero de 2012 (A. Domínguez).

FAISÁN VULGAR

Phasianus colchicus

En Ceceda, Nava, Asturias, un vecino de la localidad comunica la observación de una hembra con pollos en septiembre de 2010, en una zona de campiña donde es conocida la presencia de la especie (B. Alonso).

COLIMBO CHICO

Gavia stellata

En las marismas de Santoña, Cantabria: uno en la desembocadura del río Asón, el 7 de diciembre de 2009 (L. M. Arce, E. García Sánchez y D. Álvarez Fernández); una hembra el 11 de diciembre de 2011 (L. M. Arce y otros/SEO-Asturias); tres aves el 27 de enero (A. García Herrera) y 17 de febrero de 2012 (S. Alarcón); dos aves el día 9, seis el día 15 y solo una el 19 de diciembre de 2012 (J. M. Domingues, S. Alarcón y C. Mateos); en 2013, un ave el 5 de enero, el 20 de enero y

el 31 de enero, y dos ejemplares el 4 de febrero (S. Alarcón) y un ejemplar el 27 de febrero (C. Álvarez Usategui). Un ave en la bahía de Santander, Cantabria, el 1 de marzo de 2013 (S. Alarcón). Un ave en la playa de las Arenas, Getxo, Vizcaya, el 9 de enero de 2013 (S. Alarcón). Un individuo en Isla Canela, Ayamonte, Huelva, el 24 de febrero de 2013 (J. L. Anguita y J. A. Sarrón). Un ejemplar en Almuñécar, Granada, del 2 al 6 de diciembre de 2012 (J. Garzón, J. F. Jiménez y J. del Valle). Dos ejemplares, uno adulto, en la albufera de Valencia, Valencia, el 6 de diciembre de 2012 (P. Ruiz, J. Armero y B. Dies). Un ave de primer invierno en la marina de Carmolí, Mar Menor, Cartagena, Murcia, entre el 5 y el 23 de febrero de 2013 (R. Howard).

COLIMBO GRANDE

Gavia immer

En Asturias, tres aves en la ría del Eo, Castropol, el 16 de enero de 2010 (L. M. Arce y otros) y un ejemplar de primer invierno en esta ría en Ribadeo, cerca de del muelle Mirasol, el 25 de noviembre de 2012 (E. Samp Pedro, P. Miki García, L. M. Arce y otros), y un ave en la ría de la Villa, Villaviciosa, el 8 de enero y 6 de febrero de 2011 (L. M. Arce). Diversas observaciones en las marismas de Santoña, Cantabria: en 2009, seis ejemplares, entre ellos tres adultos y dos de primer invierno, el 7 de diciembre (L. M. Arce, E. García Sánchez y D. Álvarez Fernández); en 2010, uno de primer invierno en la ría de Escalante, el 18 de diciembre (L. M. Arce); en 2012, tres individuos el 4 de enero, un ejemplar el 25 de enero, dos el 10 y el 17 de febrero (S. Alarcón), dos el 9 de diciembre y tres el 19 de diciembre (S. Alarcón y C. Mateos); finalmente en 2013, cuatro aves el 5 de enero, tres individuos el 31 de enero, dos el 4 de febrero y uno el 1 de marzo (S. Alarcón). En la bahía de Santander, Cantabria: un ave en Raos, el 11 de enero de 2012 (S. Alarcón y C. Mateos), dos aves en Raos, el 17 y 26 de febrero de 2012, y dos aves el 1 de marzo de 2013 (S. Alarcón). Un ave en las marismas Blancas, Cantabria, el 11 de enero de 2012 (S. Alarcón y C. Mateos). Un juvenil supuestamente herido es recogido en el polígono industrial de Almendrajejo, Badajoz, el 3 de diciembre de 2012, siendo

liberado al día siguiente (J. Sánchez e I. González). Uno en cabo Roche, Conil de la Frontera, Cádiz, el 2 de febrero de 2012 (R. García, M. Jiménez y J. J. Díaz). Dos ejemplares en Isla Cristina, Huelva, el 24 de febrero de 2013 (J. L. Anguita y J. A. Sarrón).

SOMORMUJO LAVANCO

Podiceps cristatus

Se censan 2.009 ejemplares en Extremadura en enero de 2013 (SEO/BirdLife y Junta de Extremadura).

ZAMPULÍN CUELLIRROJO

Podiceps auritus

Uno en la ría de Ortigueira, A Coruña, el 5 de diciembre de 2012 (R. Hevia). Uno entre la ensenada de Vilavella y Ribadeo, ría del Eo, Asturias-Lugo, el 15 de enero de 2011 (L. M. Arce, V. M. Vázquez y otros). Un ejemplar en la playa del Arbeyal, Gijón, Asturias, entre el 3 de enero y el 21 de marzo de 2013 (Y. Marcos, J. L. Álvarez, J. Villar y otros). En las marismas de Santoña, Cantabria: en 2009, tres aves el 7 de diciembre (L. M. Arce, E. García y D. Álvarez); en 2010, uno el 18 de diciembre (L. M. Arce); en 2011, dos aves en Montehano, el 11 de diciembre (L. M. Arce, J. A. García Pérez, S. Hernández Sande y otros/SEO-Asturias); en 2012, cuatro el 4 de enero y el 17 de febrero (S. Alarcón); tres entre el 15 de diciembre de 2012 y el 5 de enero de 2013 (J. M. Domínguez, J. L. Pacheco, R. Rodríguez, S. Alarcón y otros), y en 2013, un individuo el 31 de enero (S. Alarcón) y cuatro aves el 27 de febrero (C. Álvarez Usategui). Uno con plumaje casi nupcial en la bahía de Astillero, Santander, Cantabria, el 12 de marzo de 2010 (L. M. Arce y B. Alonso). Seis aves en la bahía de Santander, Cantabria, el 26 de febrero de 2012 (S. Alarcón). Uno en los Aiguamolls del Ampurdán, Girona, entre el 2 de noviembre y el 16 de diciembre de 2013 (G. Saguer, O. Clarabuch, P. Feliú y otros). Un ave en la playa de la Bola, Getxo, Vizcaya, el 7 y el 15 de noviembre de 2012 (S. Alarcón). Dos aves en la barra del Trabucador, delta del Ebro, Tarragona, entre el 31 de enero y el 18 de febrero de 2013 (C. Durá, M. Bosch y otros).

ZAMPULLÍN CUELLINEGRO*Podiceps nigricollis*

Se cuentan 1.048 ejemplares en el Mar Menor, Murcia, el 12 de enero de 2013 (A. J. Hernández, A. Nieto, F. Sánchez Solana y P. López Barkero). **Canarias.** En Lanzarote, datos de invernada en las Salinas de Janubio, Yaiza: 7 aves el 10 de septiembre de 2012, 8 ejemplares el 5 de octubre, 9 el 22 de octubre, 10 aves el 30 de octubre y máximo de 16 individuos el 28 de diciembre de 2012, así como 15 aves el 10 de febrero y sólo 5 ejemplares el 6 de marzo de 2013 (F. J. García Vargas). En Fuerteventura, uno en el campo de golf de Caleta de Fustes, Antigua, el 2 de noviembre de 2012 (A. Hachenberg). En Tenerife, desde el 10 de enero hasta el 9 de marzo de 2013 en la balsa de La Tabona, La Guancha, estuvo presente un ejemplar que casi con toda seguridad es el mismo citado en la cercana balsa de La Florida, Icod de Los Vinos (véase *Ardeola*, 59: 416) aunque prolongó su estancia hasta al menos el 4 de diciembre de 2012 (D. Trujillo). Este mismo individuo también se cita en la balsa de La Tabona el 16 de diciembre de 2012 (R. Barone y R. Larsson) y de nuevo el 28 de enero de 2013 (D. Trujillo, R. Barone y M. Masing).

FULMAR BOREAL*Fulmarus glacialis*

Un ejemplar desde Getaria, Guipúzcoa, el 2 de febrero de 2013 (H. González).

PAÍÑO BOREAL*Oceanodroma leucorhoa*

Un ejemplar muerto en Miajadas, Cáceres, el 21 de enero de 2013, al chocarse contra unas naves de una fábrica, probablemente desorientada por el mal tiempo reinante en los días anteriores (V. M. Quintana). Cinco ejemplares en la bahía de Almería, frente a Torregarcía, Almería, el 25 de enero de 2013, se vuelven a avistar dos el día 26 (R. Martín).

Canarias. En Tenerife, varios ejemplares accidentados tras la incursión de borrascas en 2012: uno deslumbrado recogido el 9 de noviembre en la Punta del Hidalgo, La Laguna, liberándose al



Paíño boreal *Oceanodroma leucorhoa*. Miajadas (Cáceres). Foto: Víctor Manuel Quintana.

día siguiente en la misma zona (A. Betoret), dos en el muelle de Santa Cruz de Tenerife, el primero de ellos el 5 de noviembre y el segundo el 12 de diciembre, así como un ejemplar en Los Cristianos, Arona, el 22 de noviembre (C. Méndez, Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahnilla, del Cabildo de Tenerife).

ALCATRAZ ATLÁNTICO*Morus bassanus*

Canarias. Tras fuertes rachas de viento del suroeste se constata la presencia en aguas del archipiélago, y en especial en las islas e islotes orientales, de un importante número de aves, muchas de ellas exhaustas; no han podido recopilarse sino una parte de todas las citas, que se detalla a continuación. En Lanzarote, un juvenil sobrevolando el litoral de La Santa, Tinajo, y nueve –dos adultos y siete juveniles– en Playa Blanca el 31 de octubre de 2012, así como en torno a 15-20 aves –cinco adultos y el resto juveniles– el 1 de noviembre de 2012 en Órzola, Haría, y tres juveniles en aguas cercanas el muelle de Playa Blanca el 2 de noviembre de 2012 (G. Tejera). En esta misma isla, el 1 de noviembre de 2012 se observan entre 10 y 15 aves de todas las edades en la zona de Playa Chica y en el pueblo pesquero de Puerto del Carmen, algunas de ellas incluso sobrevolando las calles del pueblo (F. J. García Vargas). El mismo día se observa un inmaduro desde la costa de Los Cocoteros y se

cuentan unas 10 o 15 aves desde Costa Tegui, así como alrededor de 20 aves en Arrecife (F. J. García Vargas). El día 2 de noviembre de 2012 hay un adulto y dos subadultos posados en el mar muy cerca de la costa del litoral de Arrecife (F. J. García Vargas). Con posterioridad, un adulto en aguas frente a Los Ajaches, Yaiza, el 23 de febrero de 2013 (G. Tejera y J. J. Moreno), un adulto muerto en la playa de Famara, Tegui, el 3 de marzo de 2013 (G. Tejera, J. J. Moreno, L. Gangoso y C. Armas), así como un adulto en vuelo con dirección norte en La Santa, Tinajo, el 1 de mayo de 2013 (F. J. García Vargas). En Fuerteventura, un juvenil en aguas junto a Costa Calma el 27 de diciembre de 2012 (E. Möller). En Tenerife, el 1 de diciembre de 2012, en la playa de Alcalá, Guía de Isora, un juvenil a menos de 100 m de la costa (R. Jorge Díaz y D. de León), y un adulto recogido en La Barranquera, La Laguna, el 8 de enero de 2013 (J. Hernández), aunque acaba muriendo a los pocos días (C. Méndez, Centro de Recuperación de Fauna Silvestre La Tahonilla, del Cabildo de Tenerife). Además, dos inmaduros en vuelo por la franja costera de El Cabezo en El Médano, Granadilla de Abona, el 28 de diciembre de 2012 (J. A. Lorenzo). En La Palma, uno visto desde la punta de Fuen-caliente los días 24 y 25 de diciembre de 2012, y dos aves en el mismo lugar el 30 de diciembre de 2012 (R. Burton), así como uno en vuelo por Los Cancajos, Breña Baja, el 13 de enero de 2013 (A. Moore).

CORMORÁN GRANDE *Phalacrocorax carbo*

En el interior de Galicia, donde es raro: 53 ejemplares descansando en el río Ulla, Subcira, concello de Boqueixón, A Coruña, el 12 de febrero de 2005 (J. Taboada). Primera reproducción confirmada en la provincia de Palencia: un nido ocupado en una colonia mixta con ardeidas en el río Pisuerga, Dueñas, durante la temporada 2012 (C. A. Camazón y C. González Villalba).

Canarias. En Lanzarote, un adulto posado en repisa de acantilado marino en Los Ajaches, Yaiza, los días 12 y 20 de enero de 2013 (G. Tejera). En Tenerife, un ejemplar en la charca del Fraile, Arona, los días 23 y 29 de noviembre así como el



Cormorán grande *Phalacrocorax carbo*. San Sebastián de La Gomera. Foto: Domingo Trujillo.

3 de diciembre de 2012, y después en la cercana costa de Las Galletas, Arona, grupo de ocho aves, atribuidas a la forma continental, *P. c. sinensis*, vistas desde el 1 de enero de 2013 hasta el 22 de febrero de 2013, cuando siguen siete de ellas en dicho lugar (M. B. Lancaster). Estas ocho aves son vistas en ese sitio el 7 de enero de 2013 (R. Fernández Febles), y en números inferiores, dado que se dispersan por la costa cercana, por ejemplo, tres el 20 de enero de 2013 (R. Barone, V. R. Cerdaña, J. Vizcaíno, M. Fernández del Castillo, R. Larsson y R. Jorge Díaz), y el 14 de abril de 2013 un único ejemplar en vuelo (R. Barone, V. R. Cerdaña, R. Larsson y M. Fernández del Castillo). Además, se atribuye al mismo grupo un ejemplar volando por la punta del Guincho, playa de Las Américas, Arona, el 29 de noviembre de 2012, y más adelante, el 7 de diciembre de 2012, durante varios momentos de la mañana un ejemplar sobrevolando los bajíos de playa Honda, en la misma localidad (R. Jorge Díaz). En esta isla, pero en la costa norte: un ejemplar desde finales de diciembre de 2012 hasta al menos el 7 de enero de 2013 en aguas entre Bajamar y la Punta del Hidalgo, La Laguna (A. Betoret), y el 15 de enero de 2013 un ejemplar posado en bajíos costeros de La Caleta de Interián, Los Silos, así como el 20 de enero de ese mismo año, en la playa de San Marcos, Icod de Los Vinos, un ave posada en el mar (D. Trujillo y C. González). En La Gomera, donde los únicos dos datos previos datan de febrero de 2002 y octubre de 2011

(*Ardeola*, 50: 152 y 59: 173), tercera cita: el 24 de marzo de 2013 en acantilados marinos próximos a la playa del Cabrito, San Sebastián de La Gomera, se observa un adulto (D. Trujillo, P. Romero y A. Jerez).

AVETORO COMÚN

Botaurus stellaris

Un ejemplar en La Veguilla, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 1 de abril de 2013 (R. Torralba). Uno en el humedal de Salburúa, Álava, el 29 de febrero de 2012 (S. Alarcón). En Urdaibai, Vizcaya, se observa un ejemplar los días 3 de enero (K. de Dios), 13 de enero (J. Cañadas), 20 de febrero (S. Alarcón) y 2 de marzo de 2013 (J. L. Pacheco). Uno en la laguna de Fuente de Piedra, Málaga, el 12 y el 14 de abril de 2012 (J. L. Postigo, A. Tamayo, A. Molina Triviño y P. Macaulay). En el embalse de Arrocampo, Cáceres, se observa un ejemplar varias veces entre el 19 de octubre de 2012 y el 18 de marzo de 2013 (SEO-Cáceres) y tres aves el 23 de diciembre de 2012 (J. Ceballos y A. Ceballos). En Galisteo, Cáceres, uno en el arrozal el 23 de diciembre de 2012 (J. Prieta) y otro en la gravera de Valdefuentes los días 26 y 28 de enero de 2013 (C. Clemente, J. Mahillo y S. Mayordomo). Dos individuos en La Janda, Vejer de la Frontera, Cádiz, el 8 de diciembre de 2012 (J. Elorriaga, Y. Seminario y J. M. González) y un ave el 10 de diciembre (J. J. Díaz). Un ejemplar en el Corredor Verde del Guadiamar, Aznalcázar, Sevilla, el 7 de enero de 2013 (F. Chiclana). Uno en Oyambre, Cantabria, entre el 25 de enero y el 30 de marzo de 2013 (M. Mazorra, A. Rincón y otros). Uno en La Veguilla, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 1 de abril de 2013 (R. Torralba).

AVETORILLO COMÚN

Ixobrychus minutus

Hasta cuatro ejemplares en el delta del Llobregat, Barcelona, en el invierno 2012-2013 (F. López Sanz). Observaciones en invierno en Extremadura: en el embalse de Arrocampo, Cáceres, se observan tres aves el 7 de diciembre de 2012 (J. Muddeman) y el 1 de enero de 2013 (M. García del Rey y S. Mayordomo) y al menos cuatro aves



Avetorillo común *Ixobrychus minutus*. San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). Foto: Ramón Fernández Febles.

el 13 de enero de 2013 (C. Clemente, E. Palacios, J. Guerra, M. Gálvez, M. Á. Muñoz y S. Mayordomo); en el río Guadiana, Badajoz capital, se observan hasta cinco ejemplares entre el 13 de diciembre de 2012 y el 28 de enero de 2013 (J. C. Paniagua, J. Guerra y M. Gálvez); uno en el río Guadiana, en Mérida, Badajoz, el 10 de enero de 2013 (S. Pérez Gil), una hembra en la gravera Valdefuentes, Galisteo, el 28 de enero de 2013 (S. Mayordomo), uno en una charca ganadera de Jerez de los Caballeros, Badajoz, el 29 de enero de 2013 (F. Montaña) y un ejemplar en el río Guadiana, Valverde de Mérida, Badajoz, el 29 de enero de 2013 (J. Guerra y M. Gálvez).

Canarias. En Tenerife, datos que complementan las citas del verano de 2010 (véase *Ardeola*, 57: 520): el 15 de agosto de 2010 se observa un juvenil descansando en el cañaveral de una charca terrosa de Tejina-Bajamar, La Laguna, y posteriormente, el 26 de agosto de 2010, hay dos aves juveniles en compañía de un adulto en otra charca terrosa muy próxima a la anterior (A. Acedo y V. Cardoso). En este mismo lugar se detecta uno de los juveniles el 30 de agosto de 2010 (R. Fernández Febles).

MARTINETE COMÚN

Nycticorax nycticorax

Un juvenil en la ría de Villaviciosa, Villaviciosa, Asturias, el 17 de agosto y 13 de septiembre de 2009 (L. M. Arce). Se contabilizan 65-70 nidos

en una colonia mixta de ardeidas y comoranes en el río Pisuega, Dueñas, Palencia, durante la temporada 2012 (C. A. Camazón y C. González Villalba).

Canarias. En La Palma, continuando con la serie de datos anterior (véase *Ardeola*, 59: 419): dos machos observados en una charca de riego en La Costa, Tazacorte, el 25 de enero 2013, y un juvenil el 3 de febrero y de nuevo el 15 de marzo 2013 (R. Burton).

GARCILLA CANGREJERA

Ardeola ralloides

Tres aves en el río Guadamar, Isla Mayor, Sevilla, el 12 de febrero de 2012 (A. Domínguez). Reproducción probable en Álava: varias observaciones de una pareja construyendo nido en el embalse de Ullibarri-Gamboa, entre el 1 de junio y el 15 de junio de 2012 (G. Belamendia). En Salamanca en 2012: un ejemplar en el azud de Riobobos, el 9 de junio (M. Rodríguez) y un juvenil en Tejares, el 3 de octubre de (R. Vicente). En el río Guadiana a su paso por Badajoz capital se observan hasta cuatro ejemplares entre el 5 de diciembre de 2012 y el 21 de enero de 2013 (SEO-Badajoz). Uno en Doñana, Sevilla, el 16 de diciembre de 2012 (J. L. Anguita y M. Montalva); presencia de la especie el 9 de diciembre en Entremuros del Guadamar, Doñana, Sevilla (J. L. Anguita). En el embalse de Arrocampo, Cáceres, se observan uno o dos a lo largo de enero de 2013 (SEO-Cáceres). Un ejemplar en el arrozal de El Batán, Cáceres, el 20 de enero de 2013 (J. Prieta). Un ejemplar en Santa Amalia, Badajoz, el 24 de enero de 2013 (S. Fletcher).

GARCILLA BUEYERA

Bubulcus ibis

Dormidero de 237 ejemplares en la ensenada de La Línera, Castropol, Asturias, el 15 de enero de 2011, cifra récord para esta ría (L. M. Arce, I. Fernández y P. Vázquez).

Canarias. En Lanzarote, nueva localidad de cría: el 2 de abril de 2013 se localizan aves criando en árboles del interior del Hotel Riu Palace en Puerto del Carmen, Tías, aunque dada la ubicación de los nidos no es posible observarlos con

facilidad, estimándose un mínimo de dos parejas (F. J. García Vargas).

GARCETA COMÚN

Egretta garzetta

Canarias. En Tenerife, grupos de 16 y 23 aves las mañanas de los días 8 y 23 de noviembre de 2013 en la charca del Fraile, Arona, donde las semanas anteriores y posteriores los números de esta especie fueron mucho menores (M. B. Lancaster).

GARCETA GRANDE

Egretta alba

Unos 40 ejemplares en Quinto, Zaragoza, a mediados de marzo de 2013 (M. Galán). Un ave en las marismas de Santoña, Cantabria, el 7 de diciembre de 2009 (L. M. Arce, E. García Sánchez y D. Álvarez Fernández). Un ave en las marismas de Santoña, Cantabria, el 19 de diciembre de 2010 (L. M. Arce). Dos aves en la ría de Ortigueira, A Coruña, el 8 de octubre de 2011 (L. M. y otros/SEO-Asturias). Un ejemplar en la ría de Villa, Villaviciosa, Asturias, el 23 de octubre de 2011 (L. M. Arce y otros/SEO-Asturias). Un ave en Montehano, Santoña, Cantabria el 11 de diciembre de 2011 (L. M. Arce, J. A. García Pérez, S. Hernández Sande y otros/SEO-Asturias). Un ave en la ensenada de El Tarrón, Castropol, Asturias, el 25 de noviembre de 2012 (L. M. Arce, S. Hernández Sande y otros). Un individuo en Castropo, río Esla, Zamora, el 30 de diciembre de 2011, entra a dormir a una chopera con garcillas bueyeras (J. I. Regueras). Un ave a orillas del río Tera, Aguilar de Tera, Micereces, León, el 12 de enero de 2012 (J. I. Regueras). Siete aves en la laguna de la Nava, Palencia, el 23 de enero de 2012 (L. M. Arce). Uno en el río Jarama, San Martín de Vega, Madrid, el 23 de abril de 2012 (Á. Torres). Un ejemplar en la EDAR de Daimiel, Ciudad Real, el 6 de octubre de 2012 (T. Redondo). Un ave en el Puerto de Málaga, Málaga, el 16 de diciembre de 2012 (S. García). Dormidero en el embalse de Arrocampo, Cáceres: 26 ejemplares el 14 de octubre (S. Mayordomo, S. Langlois, M. García del Rey y D. Langlois) y 49 aves, mayor grupo observado en Extremadura, el 7 de diciembre de 2012 (J. Muddeman). En el

embalse de Montijo, Mérida, Badajoz, se observan 24 ejemplares el 25 de noviembre de 2012 (Á. Sánchez). Dormidero con 15 ejemplares en el embalse de Sierra Brava, Zorita, Cáceres, el 7 de enero de 2013 (M. I. Jiménez y J. Tapia). Se cuentan 28 ejemplares en un dormidero mixto con cormorán grande en el río Zújar, Campanario, Badajoz, el 13 de enero de 2013 (J. P. Prieto).

GARZA REAL

Ardea cinerea

Pequeña colonia de ardeidas y cormoranes en el río Pisuegra, Dueñas, Palencia, con un mínimo de cuatro nidos ocupados en el año 2012. Presente al menos desde 2010 siendo la segunda colonia para esta provincia (C. A. Camazón y C. González Villalba).

GARZA IMPERIAL

Ardea purpurea

Observación en invierno: un adulto en el embalse de Arrocampo, Cáceres, el 1 de enero de 2013 (M. García del Rey y S. Mayordomo).

CIGÜEÑA NEGRA

Ciconia nigra

Un individuo joven entre Manzaneda y Pedrún, en el valle del río Torío, León, el 11 de agosto de 2009; hay pocas observaciones en la provincia de esta especie (Á. Hernández y M. T. Lázaro). Tres bandos de 35, 24 y 9 ejemplares en vuelo sobre el río Manzanares, Madrid-Río, Madrid, el 2 de marzo de 2013 (M. Martínez y M. Fernández Lamadrid).



Cigüeña negra *Ciconia nigra*. Río Manzanares, Madrid-Río, Madrid capital. Foto: Mariano Martínez.

CIGÜEÑA BLANCA*Ciconia ciconia*

Canarias. En Tenerife, unas 50-60 aves en 5-6 grupos sobrevolando Los Cristianos, Arona, el 26 de febrero de 2013 (D. A. Hardiman).

MORITO COMÚN*Plegadis falcinellus*

Un adulto y un juvenil en río Grande, Cártama, Málaga, el 30 de mayo de 2012 (A. Garrucho y M. Rivera). En Extremadura: 25 ejemplares entre Torremayor y Montijo, Badajoz, el 4 de noviembre de 2012 (S. Mayordomo y E. Palacios), 15 aves entrando al dormitorio del embalse de Montijo, Mérida, Badajoz, el 12 de noviembre de 2012 (S. Pérez Gil), 17 ejemplares en Madrigalejo, Cáceres, el 21 de marzo de 2013 (E. Peña), 14 aves en Mérida, Badajoz, el 13 de marzo de 2013 (J. Guerra), 14 ejemplares en el azud de la Pequera, Badajoz, el 16 de marzo (A. Vega) y 12 aves en el río Guadiana, en Villagonzalo, Badajoz, el 21 de marzo de 2013 (M. Gálvez). Un ejemplar en las marismas de Santoña, Cantabria, el 4 de febrero de 2013 (S. Alarcón). Un ejemplar en la laguna Grande de Beleña, Guadalajara, el 11 de marzo de 2013 (D. Fernández Alonso).

ESPÁTULA COMÚN*Platalea leucorodia*

En León, donde hay pocas observaciones: tres aves en plumaje nupcial en el embalse de Selga de Ordas el 13 de febrero de 1999 (T. Sanz y M. Postigo).

Canarias. En el norte de Tenerife, un ejemplar entre el 12 y 23 de noviembre de 2012 en la balsa de La Cruz Santa, Los Realejos (D. Trujillo).

ELANIO COMÚN*Elanus caeruleus*

Dos aves en Fuente de Piedra, Málaga, el 28 de abril de 2012 (J. Pérez Contreras y J. M. González Cachinero). Dos aves en Arnao, Castropol, Asturias, el 24 de noviembre de 2012, y uno cazando al día siguiente (L. M. Arce, S. Hernández Sande y otros).

MILANO NEGRO*Milvus migrans*

Un ave en el vertedero de Valdemingómez, Madrid, el 16 de diciembre de 2012 (B. Molina).

Canarias. En Gran Canaria, un ejemplar en el entorno del vertedero existente en El Salto del Negro, Las Palmas, los días 19 y 21 de febrero de 2013 (R. Cerdeña). En Tenerife, uno sobrevolando el Parque Hamilton, Tacoronte, el 20 de abril de 2013 (R. Larsson).

MILANO REAL*Milvus milvus*

En un censo realizado en Extremadura en enero de 2013 se cuentan 7.200 ejemplares en 35 dormitorios (Á. Sánchez/DGMN-Junta de Extremadura). Un ejemplar en La Caneya, Nava, Asturias, el 15 de noviembre de 2009 (L. M. Arce y B. Alonso). Un ejemplar en las marismas de Santoña, Cantabria, el 18 de diciembre de 2010 (L. M. Arce). Zona de invernada de reciente localización: entre 3 y 5 ejemplares, al menos uno de ellos adulto, en Tineo, Asturias, el 21 de enero de 2012 (L. M. Arce, J. A. García Cañal y otros/SEO-Asturias). Dormitorio con 21 ejemplares en un bosque de eucaliptos, con algún pino, en el concejo de Tineo, Asturias, el 26 de enero de 2013 (S. Hernández Sande y J. M. Marín Calzado). Dormitorio con unos 100 ejemplares en el soto del río Manzanares, Madrid-Perales del Río, el 18 de diciembre de 2012 (B. Molina) y en el que se cuentan 271 aves el 20 de febrero de 2013 (C. Talabante).

QUEBRANTAHUESOS*Gypaetus barbatus*

El 15 de octubre de 2012 se observa copulando a dos adultos de una unidad reproductora, ubicada en las sierras Exteriores del Pirineo aragonés (Huesca). Esta unidad está compuesta por cuatro ejemplares, dos de ellos marcados por el programa de seguimiento de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y el Gobierno de Aragón. Esta cópula, junto con otra observada en Cataluña el 15 de octubre (Bertran y Margalida, 2005), son las más tempranas conocidas para la especie en los Pirineos (J. A. Gil/FCQ).

ALIMOCHE COMÚN*Neophron percnopterus*

Invernada 2012-2013 en la provincia de Cáceres: en el único dormidero conocido se censa un máximo de 49 individuos (Á. Rodríguez y M. Rodríguez); asimismo se observa un ejemplar en Portaje el 17 de enero (S. Mayordomo) y el 20 de enero dos en Acehuche (A. Puente y F. Díez), y uno en Sierra de Fuentes (F. Holgado). En Badajoz, un ave en Sierra Carija, Mérida, el 14 de enero (M. Á. Romo).

BUITRE NEGRO*Aegypius monachus*

Un individuo entre lago Ercina y Vega Aliseda, Picos de Europa, Asturias, el 25 de julio de 2012 (M. Á. García-Reádigos y B. García Espluga). En Cádiz, uno en Las Cuevas, Los Alcornocales, el 25 de noviembre de 2012 (F. Montoya/COCN) y uno en el puerto de Las Palomas, Grazalema, el 9 de diciembre de 2012 (F. Chiclana y F. del Valle).

CULEBRERA EUROPEA*Circaetus gallicus*

Observaciones en invierno: un ave en Alhaurín de la Torre, Málaga, el 27 de noviembre y los días 8, 20, 23 y 24 de diciembre de 2011 (J. Alba y E. Alba). Presencia el 9 de diciembre de 2012 en Entremuros del Guadimar, Doñana, Sevilla (J. L. Anguita).

AGUILUCHO LAGUNERO OCCIDENTAL*Circus aeruginosus*

Dormidero en Madrigalejo, Cáceres, con más de 140 ejemplares el 30 de diciembre de 2012 (J. Tapia y M. I. Jiménez).

Canarias. En Lanzarote, un juvenil en el Jable de Famara, Tegui, el 1 de diciembre de 2012, y posiblemente el mismo en ese lugar los días 10 y 11 de dicho mes (G. Tejera), así como otro ejemplar sobrevolando Las Amapolas en el mismo Jable de Famara, Tegui, el 28 de febrero de 2013 (G. Tejera y J. J. Moreno).

AGUILUCHO PÁLIDO*Circus cyaneus*

Canarias. En Fuerteventura, una hembra adulta en llanos de Lajares, La Oliva, el 24 de febrero de 2013 (C. Jensen Marcet/Audouin Birding Tours y M. Claudio Gombau).

AGUILUCHO CENIZO*Circus pygargus*

Una hembra en el aeropuerto de Málaga el 26 de noviembre, 16 y 23 de diciembre de 2011 y 15 de febrero de 2012 (E. Alba y J. Alba).

GAVILÁN COMÚN*Accipiter nisus*

Canarias. Citas invernales en las islas orientales. En Lanzarote, un ave en Zonzamas, Arrecife/Tegui, el 16 de diciembre de 2012 (F. J. García Vargas). En Fuerteventura, una hembra en el Llano del Tarajalillo, Tuineje, el 11 de noviembre de 2012 (M. Cabrera).

BUSARDO RATONERO*Buteo buteo*

Canarias. En Lanzarote, un ave posada en el muro de las instalaciones de la planta depuradora de Arrecife el 10 de abril de 2012 (G. Tejera).

ÁGUILA CALZADA*Aquila pennata*

Un ejemplar en el río Manzanares-Presa del Rey, Rivas Vaciamadrid, Madrid, el 3 de diciembre de 2012 (J. Fernández García). Un ejemplar en fase clara sobre el río Pisuegra, Valladolid, los días 13 y 14 de diciembre de 2012 (J. Colás). Un ave de morfo claro en la campiña de Salteras, Sevilla, el 28 de diciembre de 2012 (A. Domínguez). Un ejemplar sobrevolando el río Guadiana, a la altura del puente romano de Mérida, Badajoz, el 13 de enero de 2013 (J. J. Ferrero-García). Un ave de fase oscura en el vertedero municipal de Córdoba el 24 de enero de 2013 (F. J. Díaz y P. M. Dobado). Un individuo de morfo claro en la playa Benítez, Ceuta, el 26 de enero de 2013 (A. Parrado y J. Navarrete).

ÁGUILA PERDICERA*Aquila fasciata*

Un individuo del año en las hoces de Valdeteja, León, el 24 de julio de 2011, que podría corresponder a un ejemplar nacido en la zona donde tradicionalmente se conocía una pequeña población de esta especie (L. M. Arce y otros/SEO-Asturias). Un ejemplar de segundo año en Piedrafita la Mediana, León, el 24 de julio de 2011 (L. M. Arce y otros/SEO-Asturias).

ÁGUILA PESCADORA*Pandion haliaetus*

Canarias. En La Palma, más observaciones en el sector de Tazacorte y Los Llanos de Aridane, complementando las anteriores (*Ardeola*, 58: 203): uno en vuelo en Cabrejas el 7 de abril de 2011 y



Águila pescadora *Pandion haliaetus*. Los Llanos de Aridane (La Palma). Foto: Robert Burton.

cerca de La Costa el 6 de mayo, así como en las proximidades del embalse de Dos Pinos y sobrevolando charcas de riego en Las Martelas el 22 de mayo de 2011 (R. Burton); un ejemplar, muy confiado, en Las Martelas los días 26, 28, 29 y 30 de marzo de 2012, aunque en esta última fecha aparece otro ejemplar volando alto que al cabo de unos minutos se aleja con dirección norte, sin que lleguen a interactuar las dos aves; y una de nuevo en las mismas charcas el 12 de abril de 2012 (R. Burton); por último, citas de un ejemplar, primero posado en el cortavientos de una finca platenera en La Costa el 5 de enero de 2013, y después sobrevolando charcas de riego en Dos Pinos el 29 de enero de 2012, y en Las Martelas el 13 y 14 de marzo de 2013 (R. Burton).

CERNÍCALO PRIMILLA*Falco naumanni*

Dos aves en la iglesia de Salteras, Sevilla, el 27 de noviembre de 2012 (A. Domínguez).

CERNÍCALO PATIRROJO*Falco vespertinus*

Una hembra adulta en Brazatortas, Ciudad Real, el 28 de abril de 2012 (P. Rigaux). Un ave, posiblemente una hembra joven, en el aeropuerto de Bilbao, Loiu, Vizcaya, el 25 de mayo de 2012 (L. Bilbao y F. Pinto). Una hembra en Unzá, Álava, el 31 de mayo de 2012 (S. Alarcón).

ALCOTÁN EUROPEO*Falco subbuteo*

Canarias. En Lanzarote, cita invernal: un ejemplar adulto en el Jable de Famara, Teguiise, el 11 de diciembre de 2012 (G. Tejera y P. F. Acosta).

HALCÓN DE ELEONORA*Falco eleonora*

Un ejemplar en Algeciras, Cádiz, el 3 de marzo de 2013 (J. Elorriaga).

Corrección: en *Ardeola*, 59: 427, la observación correspondiente a un individuo observado en Cantabria en Unquera el día 18 de junio por L. Carrera es una errata.



Halcón peregrino *Falco peregrinus calidus*. Aeropuerto de Bilbao (Vizcaya). Foto: Ángel de Pazo.

HALCÓN PEREGRINO

Falco peregrinus

Observaciones de la subespecie *calidus*: un individuo en la ría de Villaviciosa, Asturias, el 10 de noviembre de 2012 (M. Quintana y C. O. Ania) y un macho adulto en el aeropuerto de Bilbao, Vizcaya, el 10 diciembre de 2012 (A. de Pazo y L. Bilbao).

POLLUELA PINTOJA

Porzana porzana

Canarias. Observaciones en fechas de paso postnupcial. En Lanzarote, un ave en el campo de golf de Tías el 29 de octubre de 2012 (F. J. García Vargas). En La Palma, un ejemplar en una charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, los días 16 y 17 de octubre 2012 (R. Burton).

POLLUELA BASTARDA

Porzana parva

Un ejemplar en los Aiguamolls del Ampurdán, Girona, el 3 de marzo de 2013 (G. Sagner).

POLLUELA CHICA

Porzana pusilla

Una hembra en Urdaibai, Vizcaya, el 16 de septiembre de 2012 (S. Alarcón y C. Mateos).

FOCHA COMÚN

Fulica atra

Canarias. En La Gomera, censo invernal: el 2 de enero de 2013 se cuentan un total de 76 aves repartidas en los siguientes municipios y embalses: en Agulo, 7 aves en La Palmita y 19 en Las

Rosas o Amalahuigüe; en Vallehermoso, 20 aves en La Encantadora y 8 en Macayo; en Hermigua, 5 ejemplares en Mulagua; en Alajeró, 6 ejemplares en Cardones; y en San Sebastián de La Gomera, 7 aves en Chejelipes, 2 en Izcañe y dos en Palacios (D. Trujillo).

FOCHA MORUNA

Fulica cristata

Tercera cita en Extremadura: un ejemplar en un grupo de 125 fochas comunes en el embalse de Valdecañas, Cáceres, los días 23 y 24 de noviembre de 2012 (S. Mayordomo, V. Risco, Miguel Ángel Muñoz, J. Briz y E. Palacios).

GRULLA COMÚN

Grus grus

En un censo realizado en diciembre de 2012 se contaron 95.282 grullas en Extremadura, aunque la cobertura no fue total, estimándose un mínimo de 101.000 y un máximo de 120.000 individuos. El reparto por áreas es el siguiente: zona centro 63.207 individuos (62%), cuenca del Tajo 22.292 aves (22%; incluye dos dormideros en Toledo) y resto de la cuenca del Guadiana 15.783 grullas (16%) (M. Gómez Calzado, J. A. Román y J. Prieta). Censados 1.109 ejemplares en el dormidero de la laguna Salina Grande de Villafáfila, Zamora, el 28 de noviembre de 2009 (L. M. Arce, B. Alonso, Y. Arce y otros).

AVUTARDA COMÚN

Otis tarda

En Guipúzcoa, un ejemplar en julio y principio de agosto de 2012, en esta provincia se conocen avistamientos previos de tres aves entre Bearn y Zuberoa en 2011 (Itsas Enara).

Corrección: en *Ardeola*, 59: 431 el autor correcto de la observación en Llanes el 21 de agosto de 2012 es A. G. Nicieza.

OSTRERO EUROASIÁTICO

Haematopus ostralegus

Una pareja ha intentado criar durante cinco años (2008-2012) en el delta del Llobregat, Barcelona; en un año, tras el fracaso, intentó adoptar varios

pollos de tarro blanco (F. López Sanz). Observación en el interior: un ejemplar en la laguna del Altillo, Lillo, Toledo, el 1 de abril de 2013 (A. Rodríguez Martín).

CIGÜEÑUELA COMÚN

Himantopus himantopus

Cifra destacada de 1.835 ejemplares censados en la comarca de Vegas Altas, Extremadura, el 14 de enero de 2013 (SEO/BirdLife y Junta de Extremadura).

ALCARAVÁN COMÚN

Burhinus oedicnemus

En Asturias, en la ría de Villaviciosa, Villaviciosa: cuatro aves el 8 de marzo de 2009 (L. M. Arce y B. Alonso) y un grupo de 11 posados en el banco de arena de la ensenada de Misiegu, el 8 de diciembre de 2011 (L. M. Arce). En el polder de Escalante, marismas de Santoña, Cantabria, cinco aves el 18 de diciembre de 2010 y cuatro el día 19 (L. M. Arce). Unos 500 ejemplares en Pedrera, Sevilla, 7 de enero de 2013 (J. Molina Jiménez y Elena Fernández Caburrasi).

CHORLITEJO PATINEGRO

Charadrius alexandrinus

En el censo de enero de 2013 en Extremadura destacan 38 ejemplares en la comarca de las Vegas Altas, Badajoz-Cáceres, el día 14 (SEO/BirdLife y Junta de Extremadura) y 33 aves en el embalse Valdecañas, Cáceres, el día 15 (J. Prieta).

Canarias. En Tenerife, donde prácticamente está punto de desaparecer como nidificante: una hembra –aparentemente adulta– en el aeropuerto viejo de El Médano, dentro de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, Granadilla de Abona, los días 21 de octubre y 29 de diciembre de 2012 (R. Barone, M. Fernández del Castillo, V. R. Cerdña, R. Larsson y B. Fariña).

CHORLITO CARAMBOLO

Charadrius morinellus

Observación de 38 ejemplares en Bardenas Reales, Navarra, el 10 de octubre de 2012 (J. Ardaiz y R. Rodríguez).

Canarias. En Tenerife, en el sector noroeste, en concreto en Matoso, Teno Alto, Buenavista del Norte, durante el atardecer del 16 de septiembre de 2012 se observa un ejemplar en un pastizal anexo a unas casas (E. Sacramento).

CHORLITO DORADO EUROPEO

Pluvialis apricaria

Canarias. En Tenerife, grupo de ocho aves en vuelo en las proximidades de la charca del Fraile, Aroña, el 12 de noviembre de 2012 (M. B. Lancaster).

CHORLITO GRIS

Pluvialis squatarola

Un individuo en Palazuelo, Badajoz, el 22 de enero de 2013 (M. Kelsey).

AVEFRÍA EUROPEA

Vanellus vanellus

Se censan 10.798 ejemplares en la comarca de Vegas Altas, Extremadura, el 14 de enero de 2013 (SEO/BirdLife y Junta de Extremadura).

Canarias. En La Palma, en charcas de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, un ejemplar el día 22 de noviembre 2012, cuatro aves el día 23, una los días 26 y 28 del mismo mes, y de nuevo una los días 12 y 13 de diciembre de 2012 (R. Burton).

CORRELIMOS TRIDÁCTILO

Calidris alba

Un ave en la gravera de Santas Martas, León, el 23 de mayo de 2012 (C. Zumalacárregui, H. Astiárraga y D. Miguélez). Uno en el embalse de Los Canchales, Badajoz, el 30 de octubre de 2012 (J. Vázquez, J. Solana, F. Montaña y A. Núñez). Un individuo en el embalse de Valdecañas, Cáceres, el 16 de diciembre de 2012 (F. Salas y A. Torrijo).

CORRELIMOS DE TEMMINCK

Calidris temminckii

Dos individuos en la balsa de Zolina, Navarra, el 8 de agosto de 2011 (M. García Valentín). Dos aves en la laguna de Fuente de Piedra, Málaga, el 28 de abril de 2012 (J. Pérez Contreras y J. M. González

Cachinero). Uno en la gravera de Santas Martas, Santas Martas, León, el 16 de mayo de 2012 (D. Miguélez y S. Blanco). Un ave en el humedal de Salburúa, Vitoria, Álava, el 23 de agosto de 2012 (S. Alarcón). Uno en Tauste, Zaragoza, el 11 de noviembre de 2012 (A. Sánchez Galán y A. Moreno). Fecha invernal: un ave en Isla Menor, Puebla del Río, Sevilla, el 24 de diciembre de 2012 (F. Chiclana). Un ejemplar en el embalse de Portaje, Cáceres, el 17 de enero de 2013 (S. Mayordomo).

CORRELIMOS ZARAPITÍN

Calidris ferruginea

Dos ejemplares en los arrozales de Santa Amalia, Badajoz, el 23 de diciembre de 2012 (Á. Sánchez).

CORRELIMOS OSCURO

Calidris maritima

Un ejemplar en el Puerto de Burriana, Castellón, el 1 de diciembre de 2012 (J. Bort, J. L. Bort y J. Carda).

CORRELIMOS COMÚN

Calidris alpina

Unos 1.500 ejemplares en Isla Menor, Puebla del Río, Sevilla, el 2 de noviembre de 2012 (F. Chiclana). Se cuentan 3.037 aves en la comarca de Vegas Altas, Extremadura, el 14 de enero de 2013 (SEO/BirdLife y Junta de Extremadura).

COMBATIENTE

Philomachus pugnax

En Extremadura, 269 ejemplares censados en la comarca de Vegas Altas, el 14 de enero de 2013 (SEO/BirdLife y Junta de Extremadura).

AGACHADIZA CHICA

Lymnocyptes minimus

Un ave en el humedal de Bolue, Getxo, Vizcaya, el 3 de enero de 2012 (S. Alarcón). Una en la balsa de Loza, Navarra, el 29 de noviembre de 2012 (P. Nuin). Dos aves en las lagunas de Torremejía, Badajoz, el 13 de enero de 2013 (J. Gómez Aparicio). Seis aves en Santa Amalia, Badajoz, el 14 de

enero de 2013 (J. Fernández). En Sevilla, una en Doñana, el 1 de diciembre de 2012 (J. L. Anguita y A. Savijn) y un ejemplar en el río Guadaira, Puebla del Río, el 13 de febrero de 2013 (J. A. Sarrón). **Canarias.** En La Palma, un ejemplar muerto por atropello en una pista de tierra cerca de una charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, el 1 de diciembre 2012 (R. Burton).

AGACHADIZA COMÚN

Gallinago gallinago

Canarias. En El Hierro, donde hay pocas citas, el 9 de febrero de 2013 en un estanque de la zona baja de Frontera se observa un ejemplar alimentándose (D. Trujillo).

CHOSHA PERDIZ

Scolopax rusticola

Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar en bosque de casuarinas de Costa Calma, Pájara, el 25 de febrero de 2013 (C. Jensen Marcet/Audouin Birding Tours y M. Claudio Gombau).

AGUJA COLINEGRA

Limosa limosa

Canarias. En Tenerife, un ave con combinación de anillas en una charca de riego de Tejina, La Laguna, vista el 10 y 12 de febrero de 2013 (R. Fernández Febles), y también el 11 de febrero de 2013 (J. Vizcaíno). Se trata de un ejemplar que había sido anillado en Workum, Holanda, el 25 de abril de 2008 por Y. Galama y T. Piersma dentro un de proyecto de larga duración de esta especie efectuado por la Universidad de Groningen. En La Palma, un ejemplar hembra en una charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, el día 29 de enero 2013, mientras que el 7 de febrero en otra charca cercana se observa acompañada de un macho (R. Burton).

AGUJA COLIPINTA

Limosa lapponica

Grupo de seis ejemplares en las lagunas de Villafáfila, Zamora, el 7 de noviembre de 2012 (A. Rodrigo).

ARCHIBEBE OSCURO

Tringa erythropus

En Badajoz, se cuentan 142 ejemplares en los arrozales de Puebla de Alcollarín, el 28 de octubre de 2010; se trata del mayor grupo observado en Extremadura (F. Montaña y A. Núñez).

Canarias. En Tenerife, en la balsa de La Cruz Santa, Los Realejos, continúa el ejemplar citado en el anterior noticiario (*Ardeola*, 59: 435) hasta al menos el 30 de noviembre de 2012, aunque el 5 de diciembre de 2012 la balsa está vacía por trabajos de impermeabilización (D. Trujillo). Dicho ejemplar también se cita allí el 14 de octubre de 2012 (R. Barone, V. R. Cerdeña y R. Larsson).

ARCHIBEBE FINO

Tringa stagnatilis

Un individuo en el polder de El Cierrón, ría de Villaviciosa, Asturias, el 17 de noviembre de 2011 (L. M. Arce y M. Alonso). En Isla Menor, Puebla del Río, Sevilla, uno el 2 de noviembre de 2012 (F. Chiclana) y el 3 de diciembre de 2012 (F. Chiclana y F. del Valle).



Aguja colinegra *Limosa limosa*. San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). Foto: Ramón Fernández Febles.

ANDARRÍOS BASTARDO*Tringa glareola*

En los arrozales de Palazuelo, Badajoz, se observan tres ejemplares el 14 de enero (J. P. Prieto y M. Cardalliaguet) y uno el 22 de enero de 2013 (M. Kelsey).

VUELVEPIEDRAS COMÚN*Arenaria interpres*

Comportamiento de interés: un grupo de cuatro aves comen migas de pan en el suelo del Paseo del Muro de San Lorenzo, Gijón, Asturias, el 15 de noviembre de 2008, muy confiados, a unos tres metros de distancia de los observadores (Á. Hernández y M. T. Lázaro). Un ejemplar en los arrozales de Palazuelo, Badajoz, el 27 de octubre de 2012 (J. P. Prieto y A. Mendoza).

GAVIOTA CABECINEGRA*Larus melanocephalus*

En la costa de Málaga, durante un censo al atardecer, se cuentan 10.174 aves repartidas exclusivamente en dos dormideros, uno en el extremo oriental, Caleta de Vélez, y otro en el extremo occidental, bahía de Málaga, el 26 de enero de 2013 (S. García, J. Fregenal, A. Bernal y otros). Un adulto en Txingudiko Padurak, Irún, Guipúzcoa, el 9 de julio del 2012 en un grupo de 30 gaviotas reidoras (H. Sarasa). Dormidero con 216 individuos en Getxo, Vizcaya, el 27 de febrero de 2013 (C. Álvarez Usategui). Un ejemplar en el embalse del Ebro, Burgos, el 21 de octubre de 2012 (X. Piñeiro). En Villafáfila, Zamora, en el invierno 2012-2013 se observa un primer invierno el 9 de noviembre (X. Piñeiro), un adulto el 3 de marzo (X. Piñeiro), siete adultos el 9 de marzo (A. Rodrigo, C. Osorio y J. Otal) y dos adultos el 20 de marzo (C. Osorio). Un primer invierno en el vertedero de Zamora, Zamora, el 9 de diciembre de 2012 (X. Piñeiro y A. Rodrigo). Un adulto en el río Manzanares, Madrid-Río, Madrid, el 25 de enero de 2013 (M. Martínez). Un ejemplar en el vertedero de Gomecello, Salamanca, el 10 de febrero de 2013 (M. Rodríguez). Dos adultos en el azud de Riobobos, Salamanca, el 13 de marzo de 2013 (R. Vicente).

GAVIOTA REIDORA*Chroicocephalus ridibundus*

Dormidero con 13.000 ejemplares en el embalse de Alange, Badajoz, el 6 de diciembre de 2012 (J. Solana).

GAVIOTA PICOFINA*Chroicocephalus genei*

Un individuo en la balsa de Zolina, Zolina, Navarra, el 26 de mayo de 2012 (M. García Valentín).

GAVIOTA DE AUDOUIN*Larus audouinii*

Dos adultos en la ría de Gernika, Urdaibai, Vizcaya, el 26 de abril de 2012 (J. del Villar y J. Hidalgo).

GAVIOTA DE DELAWARE*Larus delawarensis*

En Galicia, un adulto en la playa de Ares, A Coruña, el 24 de diciembre de 2012 y el 14 de enero de 2013 (A. Gutiérrez); un primer invierno en Xove, Lugo, el 2 de febrero de 2013 (A. Salazar) y un primer invierno en Cervo, Lugo, el 12 de enero y el 13 de marzo de 2013 (R. Hevia). Observaciones en Asturias: en el tradicional Parque Isabel La Católica, un adulto y un ejemplar de primer invierno el 10 de marzo de 2009 (L. M. Arce), un ejemplar de primer invierno el 24 de enero de 2012 (L. M. Arce) y durante el invierno 2012-2013 se observa un segundo invierno el 6 de diciembre y el 8 de enero (R. M. Rodríguez y P. Fernández), un primer invierno el 28 de enero (L. A. Álvarez Usategui) y dos aves de primer invierno entre el 23 de febrero y el 12 de marzo (Y. Marcos, G. Lepoutre y otros); un primer invierno en playa de Bañugues, Gozón, el 14 de enero de 2013, que sigue el 30 de marzo (J. A. García Cañal) y en esta misma playa un segundo invierno del 15 al 30 de marzo de 2013 (J. A. García Cañal); un primer invierno en El Musel, Gijón, el 16 de diciembre de 2012 (D. López Velasco, P. Gutiérrez y A. Gutiérrez) y un primer invierno en la playa de San Lorenzo, Gijón, el 16 de marzo de 2013 (P. Fernández y R. M. Rodríguez). Un se-

gundo invierno en Plaiiaundi, Irún, Guipúzcoa, el 4 y el 6 de enero de 2013 (M. Etzaniz y J. F. Esparza). Un adulto en Getxo, Vizcaya, el 4 de enero de 2013 (R. Rodríguez, J. Ramírez, M. Riz y D. Calleja). Un adulto en Bilbao, Vizcaya, el 13 de enero de 2013 (I. Sarabia). Un ejemplar en el puerto deportivo de las Arenas, Getxo, Vizcaya, el 18 de enero y el 19 de febrero de 2013 (S. Alarcón). Un primer invierno en El Abra, Getxo, Vizcaya, el 31 de marzo de 2013 (K. de Dios). En Madrid, un adulto en el VRSU de Colmenar Viejo, el 6 de diciembre de 2012 (D. González) y un segundo invierno en el vertedero de Pinto, el 25 de noviembre de 2012 y el 8 de febrero de 2013 (M. Juan y J. Marchamalo). En la provincia de Cádiz, un primer invierno en Chipiona, el 5 de enero de 2013 (R. García, C. Moreno y M. Torreño) y un primer invierno en Costa Ballena, Rota, el 19 de enero y el 10 de febrero de 2013 (R. García y M. Jiménez). Segunda cita en Extremadura: un segundo invierno en arrozales de Santa Amalia, Badajoz, el 18 de marzo de 2013 (F. Yuste, J. Guerra y M. Gálvez).

GAVIOTA CANA

Larus canus

Un ave de primer invierno en Salburúa, Vizcaya, el 29 de febrero de 2012 (S. Alarcón). Un ejemplar en Villafáfila, Zamora, el 28 de noviembre de 2012 (L. Gil). Un subadulto en Barcelona, Barcelona, el 26 de febrero de 2013 (J. Marco). En Madrid, un ejemplar de primer invierno en el VRSU de Colmenar Viejo el 6 de diciembre de 2012 (D. González) y dos aves de primer invierno el 13 de enero de 2013 (M. Juan y D. González), y un ejemplar de cuarto verano en el vertedero de Pinto el 13 de abril de 2012 (J. Marchamalo). Un ave de segundo invierno en el puerto de Vinaroz, Castellón, el 3 de noviembre de 2012 (F. Puyol y M. Tardy). Un adulto en las salinas de Rassal, Cartagena, Murcia, el 13 de diciembre de 2012 (R. Howard). Dos aves de primer invierno en la Balsa de Zolina, Navarra, entre el 25 de diciembre de 2012 y el 5 de febrero de 2013 (M. García, M. Valentín y otros). Un ave en el Puente Viejo, río Guadiana, Badajoz capital, entre el 4 de enero y el 11 de marzo de 2013 (J. C. Paniagua). Un primer invierno en el embalse de Alange, Badajoz, el 1 de marzo de 2013 (J. Guerra y M. Gál-

vez). Un adulto en la playa de Doñana, Huelva, el 12 de enero de 2013 (J. Elorriaga y J. J. Díaz). Un primer invierno en la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 26 de enero de 2013 (A. J. Hernández, A. Ramos, B. Pérez y otros).

GAVIOTA ARGÉNTEA EUROPEA

Larus argentatus

En Barcelona, un adulto en Barcelona ciudad, desde noviembre de 2012 al 7 de febrero de 2013 (E. Bautista) y un primer invierno en el delta del Llobregat el 26 de febrero de 2013 (F. López). Un individuo en Llagostera, Girona, el 30 de diciembre de 2012 (C. Álvarez Cros). En la provincia de Tarragona, un primer invierno en el puerto de Tarragona el 15 de diciembre de 2012 y el 6 de enero de 2013 (C. A. Fernández) y un ave de segundo invierno el 20 de enero y el 23 de marzo de 2013 (A. Cama), y un ave de segundo invierno en el puerto de Ametlla de Mar el 14 de febrero de 2013 (A. Cama). Un primer invierno en el puerto de Castellón, Castellón, el 23 de enero de 2013 (J. L. Greño). En Madrid, un ave de primer invierno en el vertedero de Pinto los días 25 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2012 (M. Juan, J. Marchamalo y J. Vidal), y un ave de tercer invierno en el vertedero de Colmenar Viejo los días 30 de diciembre de 2012 y 13 de enero de 2013 (D. González, J. M. Ruiz y M. Juan); en el río Manzanares a su paso por la ciudad de Madrid, Madrid-Río, un ejemplar de segundo invierno el 2 de marzo de 2013 (M. Martínez y M. Fernández Lamadrid), un ejemplar de cuarto año el 12 de febrero de 2013 (M. Martínez y C. Talavante) y un ave de primer invierno el 14 de marzo de 2013 (M. Martínez y M. Fernández Lamadrid). Se observa un ejemplar de primer invierno en un grupo de gaviotas reidoras y sombrías en la Laguna de El Campillo, Rivas Vaciamadrid, Madrid, el día 19 de noviembre de 2012 (C. Talabante y J. Gómez). Un primer invierno en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 17 de noviembre de 2012 (G. Martín). Dos ejemplares en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 24 de febrero de 2013 (G. Martín). Un adulto en el puerto de Málaga, el 12 de diciembre de 2012 (A. Molina Triviño y R. Palomo). Un adulto en Punta Umbría, Huelva, el 20 de diciembre de 2012 (J. Salcedo y A. Savijn).

Un primer invierno en el Puerto de Santa María, Cádiz, el 23 de enero de 2013 (R. García).

GAVIÓN ATLÁNTICO

Larus marinus

Un primer invierno en Isla Cristina, Huelva el 24 de febrero de 2012 (J. L. Anguita y J. A. Sarrón). Un primer invierno en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, el 17 de noviembre de 2012 (G. Martín). Un ejemplar de cuarto invierno en el vertedero de Colmenar Viejo, Madrid, el 3 de diciembre de 2012 (D. González). Un ave de primer invierno en el puerto de Málaga, Málaga, el 16 de diciembre de 2012 (S. García).

Canarias. En Lanzarote, un ave de primer invierno en Arrecife el 21 de enero de 2013 (F. J. García Vargas).

GAVIOTA TRIDÁCTILA

Rissa tridactyla

Un ejemplar en las marismas de El Rocío, Almonte, Huelva, el 11 de marzo de 2013 (J. Muddeman).

GAVIOTA DE SABINE

Xema sabini

Un adulto frente a la costa de Chiclana de la Frontera, Cádiz, el 31 de octubre de 2012 (J. Elorriaga).

GAVIOTA ENANA

Hydrocoloeus minutus

Un adulto y un primer invierno de la balsa de Zolina, Navarra, el 22 y el 24 diciembre 2011 (M. García Valentín). Un primer invierno en Villafáfila, Zamora, el 29 de octubre de 2012 (C. Osorio). Un ejemplar en Cartagena, Murcia, el 19 de diciembre de 2012 (C. Requena). En el embalse del Borbollón, Cáceres, se observa un primer invierno los días 10 (G. Naharro, F. Salas y A. Torrijo) y 11 de diciembre (S. Mayordomo, R. Montero y C. Clemente) y dos aves de primer invierno los días 12 y 13 (M. Á. Muñoz, J. Mahillo, H. Sánchez, E. Palacios y C. Clemente) y 15 de diciembre de 2012 (J. Prieta, J. Mahillo, G. Naharro y C. Clemente). En el embalse de Orellana, Badajoz, se observan dos individuos, adul-



Gavión atlántico *Larus marinus*. Puerto de Málaga (Málaga). Foto: Salvador García Barcelona.

to y primer invierno, el 7 de febrero de 2013 (Á. Sánchez y J. Muddeman), el 17 de febrero se observan tres aves, las dos anteriores y una de segundo invierno (C. Clemente, E. Palacios, M. García del Rey y S. Mayordomo). Un ave de primer invierno en las lagunas de La Albuera, Badajoz, el 21 de enero de 2013 (J. Vázquez). Un

adulto en el parque Tierno Galván, San Martín de la Vega, Madrid, el 3 de enero de 2013 (J. M. Herranz). Un adulto encontrado muerto en el aeropuerto de Bilbao, Loiu, Vizcaya, el 19 de enero de 2013 (F. Pinto).

PAGAZA PICONEGRA

Gelochelidon nilotica

Pasan 19 ejemplares hacia el oeste en dos horas y cuarto en punta l' Aguión, Moniello, Gozón, Asturias, el 24 de septiembre de 2011 (L. M. Arce, Á. Díaz Pastor, P. de la Nava y otros).

PAGAZA PIQUIRROJA

Hydroprogne caspia

Dos aves en la Rianzuela, Puebla del Río, Sevilla, el 22 de diciembre de 2012 (A. Domínguez). Un ejemplar en el río Guadiana, Badajoz capital, los días 6 (Joaquín Mazón) y 7 de marzo de 2013 (J. Mazón y J. C. Paniagua). Un ave en el embalse de Alange, Badajoz, los días 9 y 11 de marzo de 2013 (J. Guerra y M. Gálvez).



Gaviota enana *Hydrocoloeus minutus*. Aeropuerto de Bilbao (Vizcaya). Dibujo: Norber Martin.



Pagaza piquirroja *Hydroprogne caspia*. Río Guadiana, Badajoz capital. Foto: Joaquín Mazón.

CHARRÁN PATINEGRO*Sterna sandvicensis*

Ocho aves en las marismas de Santoña, Cantabria, el 11 de febrero de 2011 (L. M. Arce y otros/SEO-Asturias). Un ave en el muelle Rendiello, Puerto de El Musel, Gijón, Asturias, el 24 de enero de 2012 (L. M. Arce).

CHARRÁN COMÚN*Sterna hirundo*

Un ejemplar en plumaje estival en el puerto de Corrubedo, A Coruña, en el invierno 2012-2013 (M. E. Carballal).

FUMAREL CARIBLANCO*Chlidonias hybrida*

Citas invernales en Badajoz: un ave en el río Guadiana, Mérida, entre el 10 de enero y el 18 de febrero de 2013 (J. Solana y S. Pérez Gil) y un ejemplar en la gravera del Soto, Valverde de Mérida, el 29 de enero de 2013 (J. Guerra y M. Gálvez).

FUMAREL ALIBLANCO*Chlidonias leucopterus*

Un adulto en la laguna de Navaseca, Daimiel, Ciudad Real, el 1 de octubre de 2012 (S. Villa).

MÉRGULO ATLÁNTICO*Alle alle*

Uno desde Estaca de Bares, A Coruña, el 11 de noviembre de 2012 (A. Sandoval, A. Fernández y otros). Dos aves desde cabo de Ajo, Cantabria, el 7 de febrero de 2013 (J. Menéndez). Un ejemplar orillado en la playa de Cortadura, Cádiz capital, el 8 de marzo de 2013 (M. Jiménez).

PALOMA ZURITA*Columba oenas*

Un bando de al menos 400 ejemplares posados al anochecer en una chopera en Valdenebro de

los Valles, Valladolid, el 16 de diciembre de 2012 (J. Talegón y M. Martín).

TÓRTOLA TURCA*Streptopelia decaocto*

Unas 500 aves en rastrojos de Salteras, Sevilla, el 7 de octubre de 2012 (A. Domínguez).

Canarias. En La Gomera, el 27 de marzo de 2013 en La Dama, Vallehermoso, donde el año anterior ya se había constatado su presencia, se contabilizan más de una decena de ejemplares y se localiza un adulto en un nido emplazado en una rama de un mango (*Mangifera* sp.) a tres metros de altura (D. Trujillo).

COTORRA ARGENTINA*Myiopsitta monachus*

Bando de 62 aves en la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, en zona de transición entre el arenal costero y el sistema lacustre, que se ha convertido en una zona de alimentación habitual, el 20 de octubre de 2012 (J. L. Postigo y J. M. Romero). En Cáceres capital, varias observaciones de hasta cuatro aves en el parque del Príncipe y en el Paseo Alto entre el 1 de enero y el 28 de marzo de 2013 (J. Solana, R. Montero, E. Palacios y S. Mayordomo).

CRÍALO EUROPEO*Clamator glandarius*

Uno en Los Cerralbos, Trujillo, Cáceres, el 2 de enero de 2013 (M. Kelsey) y uno de segundo año en la presa de Peñafior, Palma del Río, Córdoba, el 24 de enero de 2013 (F. J. Díaz y P. M. Dobado).

Canarias. En Lanzarote, un adulto cerca de Los Valles, Teguiuse, el 15 de febrero de 2013 (G. Olios).

CUCO COMÚN*Cuculus canorus*

Canarias. En Lanzarote, un ave en Puerto del Carmen el 20 de abril de 2013 (F. J. García Vargas).

AUTILLO EUROPEO*Otus scops*

Se escucha un ejemplar en La Castañal, Bimenes, Asturias, en una estación de escucha del programa Noctua y se vuelve a localizar el 2 de mayo de 2009 en el mismo lugar, en una nueva visita (L. M. Arce y B. Alonso).

BÚHO REAL*Bubo bubo*

Se escucha un ejemplar por primera vez en cinco años en los Monte Incós, Cabranes, Asturias, en una estación del programa Noctua, el 7 de febrero de 2010 (L. M. Arce).

BÚHO CHICO*Asio otus*

Observaciones en Asturias: un ejemplar oído en Ceceda, Nava, el 19 de abril de 2009 y de nuevo 22 de septiembre de 2010 y el 17 de octubre de 2010 (L. M. Arce y B. Alonso); uno oído durante el programa Noctua en La Castañal, Bimenes, el 16 de junio de 2012 (L. M. Arce y B. Alonso) y un individuo entra desde el mar en cabo Peñas, Gozón, el 29 de septiembre de 2012 (J. A. García Cañal, L. M. Arce, I. Riestra y otros/SEO-Asturias), y



Búho chico *Asio otus*. Tramo de costa entre Llanes villa y Poo (Asturias). Foto: Fran Nieto.

otro también entrando desde el mar entre Llanes y Poo, Asturias, el 24 de octubre 2012 (F. Nieto). **Canarias.** En Lanzarote, un ave en el campo de golf de Teguieste entre los días 30 de septiembre y 24 de noviembre de 2012 (F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos).

BÚHO CAMPESTRE*Asio flammeus*

Un ave en cabo Peñas, Gozón, Asturias, el 15 de octubre de 2011 (L. M. Arce y otros/SEO-Asturias). Uno en Arnao, Castropol, Asturias, el 25 de noviembre de 2012 (L. M. Arce, S. Hernández Sande y otros). Un ave en Salteras, Sevilla, el 2 de diciembre de 2012 (A. Domínguez).

VENCEJO PÁLIDO*Apus pallidus*

Nueva invernada en Alange, Badajoz: al menos dos ejemplares permanecen todo el invierno 2012-2013, acudiendo a dormir a la iglesia del pueblo en diciembre de 2012 y enero de 2013 (J. Solana).

VENCEJO CAFRE*Apus caffer*

Un ave en Medina Sidonia, Cádiz, el 16 de agosto de 2012 (J. J. Ramos Melo).

VENCEJO MORO*Apus affinis*

Citas posteriores al 1 de enero de 2013, cuando ha dejado de considerarse formalmente como una rareza a escala nacional, salvo en las islas Canarias. Nueve adultos en Chipiona, Cádiz, el 27 de enero de 2013 (J. M. Franco y M. Franco). Uno y dos ejemplares en la rambla de San José, Cabo de Gata, Almería, el 1 y 3 de marzo de 2013, respectivamente (J. Pérez Contreras). Un ejemplar en la Rambla Morales, Cabo de Gata, Almería, el 9 de marzo (Ó. Gordo y M. Ruiz) y dos ejemplares el 19 de marzo de 2013 (R. Martín). Uno en compañía de numerosos hirundínidos de cuatro especies en el humedal de Padul, Granada, el 11 de marzo de 2013 (J. Pérez-Contreras).



Carraca europea *Coracias garrulus*. Tías (Lanzarote). Foto: Francisco Javier García Vargas.

CARRACA EUROPEA

Coracias garrulus

Canarias. En Lanzarote, un ave en el campo de golf de Tías entre los días 2 y 14 de octubre de 2012 (F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos).

ABUBILLA

Upupa epops

Canarias. En Tenerife, una pareja en unos cultivos de las inmediaciones de la balsa de La Zamora, en La Cruz Santa, Los Realejos, el 16 de diciembre de 2012 (R. Larsson y R. Barone).

TORCECUELLO EUROASIÁTICO

Jynx torquilla

Canarias. En Lanzarote, un ave en el campo de golf de Tías los días 21 y 24 de abril de 2013 (F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos).

PICO PICAPINOS

Dendrocopos major

Canarias. En Tenerife, en el monte verde de Agua García, Tacoronte, donde previamente se documentó la presencia de la especie (*Ardeola*, 59: 188), continúan las observaciones: el 20 de octubre de 2012 se observa un macho y el 24 de noviembre de 2012 se escuchan tamborileos; el 17 de febrero de 2013 se escucha un ejemplar entre la vegetación, el 26 de marzo de 2013 se vuelven a escuchar tamborileos y hay actividad de al menos dos aves por la zona, aunque en posteriores visitas efectuadas en abril no consiguen verse ni escucharse (R. Larsson).

PICO MENOR

Dendrocopos minor

Uno en Fuentesanta, Nava, Asturias, el 23 de diciembre de 2011 (L. M. Arce). Uno en una peque-

ña arboleda de fresnos, en Guadalix de la Sierra, Madrid, el 19 de noviembre de 2012 y se vuelve a observar posiblemente el mismo ejemplar el 13 de enero de 2013 (F. J. Rueda).

ALONDRA RICOTÍ

Chersophilus duponti

Cinco machos cantando en Las Amoladeras, Cabo de Gata, Almería, el 10 de febrero de 2013 (R. Martín).

GOLONDRINA COMÚN

Hirundo rustica

Dormidero con un millón y medio de ejemplares estimados en la laguna de la Encanyssada, Amposta, delta del Ebro, Tarragona, el 3 de octubre de 2012 (R. Gutiérrez). Presencia el 9 de diciembre en Entremuros del Guadiamar, Doñana, Sevilla (J. L. Anguita).

GOLONDRINA DÁURICA

Cecropis daurica

Observaciones en Asturias: un ave en un grupo de golondrinas comunes en El Cierón, ría de Villaviciosa, el 8 de marzo de 2009 (L. M. Arce y B. Alonso), una en un grupo de siete golondrinas comunes en Ceceda, Nava, el 29 de marzo de 2009 (L. M. Arce y B. Alonso) y un ave en el puente romano de Cangas de Onís, el 24 de junio de 2012 (L. M. Arce). Cuatro adultos, uno de ellos entrando a un nido bajo un puente, en embalse de Barrios de Luna, salida de la autopista AP-66 a la carretera C-623, León, el 10 de julio de 2010 (L. M. Alonso). Un ejemplar en Alange, Badajoz, el 21 de diciembre de 2012 (M. Gálvez y J. Guerra).

AVIÓN COMÚN

Delichon urbicum

En Badajoz, entre uno y tres ejemplares en Alange, durante todo el mes de diciembre de 2012 (J. Solana y J. Guerra) y al menos cinco aves en el Castillo de Benquerencia de la Serena, el 10 de diciembre de 2012 (J. Muddeman). Presencia el 9 de diciembre en Entremuros del Guadiamar, Doñana, Sevilla (J. L. Anguita).

BISBITA DE RICHARD

Anthus richardi

En Asturias en cabo Peñas, Gozón: dos aves el 30 de diciembre de 2010 (L. M. Arce), una el 15 de octubre de 2011 (L. M. Arce y J. A. Ballesteros) y diez aves, una posada más un bando de nueve, que entra desde el mar, el 29 de noviembre de 2011 (L. M. Arce y otros). Dos aves en cabo de Ajo, Cantabria, el 20 de octubre de 2012 (Melanotos Extremadura). Un ejemplar en Villafáfila, Zamora, el 27 de octubre de 2012 (X. Piñeiro). Dos aves en cabo de Ajo, Cantabria, el 1 de enero de 2013 (S. Alarcón). Un ejemplar en Palmones, Los Barrios, Cádiz, el 10 de febrero de 2013 (D. Cuenca). Un ave en Doñana, Huelva, el 12 de febrero de 2013 (C. Gutiérrez). Un ave en la albufera de Valencia, Valencia, el 14 de febrero de 2013 (B. Dies). Un ejemplar en Vilanova de Bellpuig, Lleida, el 16 de febrero de 2013 (A. Sebé).

BISBITA ARBÓREO

Anthus trivialis

Canarias. En Tenerife, dos aves en un campo de golf en San Miguel de Abona, los días 28 y 29 de abril de 2013 (A. Acedo).

BISBITA PRATENSE

Anthus pratensis

Canarias. En La Palma, en zona arada cerca de la Laguna de Barlovento, un ejemplar el 18 de enero de 2013 (A. Moore).

BISBITA GORGIRROJO

Anthus cervinus

Un adulto en la sierra de Yedra, Nívar, Granada, el 30 de diciembre de 2012 (J. Garzón, J. F. Jiménez y R. Aguilera). Un ave en Salas de los Infantes, Burgos, 27 de marzo de 2013 (R. Fernández).

Canarias. En Lanzarote, en el campo de golf de Tías, un ave los días 5 y 6 de noviembre de 2012 (F. J. García Vargas) y dos aves el 21 de abril de 2013 (F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos), quedando solamente un ejemplar el 24 de abril de 2013 (F. J. García Vargas). En Tenerife, un

ejemplar en plumaje nupcial en un campo de golf en San Miguel de Abona el 28 de abril de 2013, comprobándose que al día siguiente ya no estaba (A. Acedo).

BISBITA COSTERO

Anthus petrosus

Un ave en el puerto de Santoña, Cantabria, el 7 de diciembre de 2009 (L. M. Arce, E. García Sánchez y D. Álvarez Fernández). Uno en La Caleta, Cádiz capital, entre el 26 de enero y el 23 de febrero de 2013 (M. Jiménez, R. García y otros).

LAVANDERA BOYERA

Motacilla flava

Bando con 25 ejemplares en la Dehesa de Abajo, Doñana, Sevilla, el 16 de diciembre de 2012 (J. L. Anguita y M. Montalva).

LAVANDERA BLANCA

Motacilla alba

Observaciones de la subespecie *yarrellii*: en Sevilla, un ave en la Dehesa de Abajo, Puebla del Río, el 12 de febrero de 2012 (A. Domínguez), un ejemplar en Salteras, el 1 de marzo de 2012 (A. Domínguez) y uno en el puerto de Sevilla, el 25 de noviembre de 2012 (F. Chiclana). Un individuo joven en un césped de un jardín junto a la M-30, Conde de Casal, ciudad de Madrid, el 1 de febrero de 2013 (B. Molina). Un adulto en el basurero de Pinto, Madrid, el 22 de febrero de 2013 (J. Marchamalo).

ACENTOR ALPINO

Prunella collaris

Cinco ejemplares en las inmediaciones de la torre de Vela Blanca, en el Parque Natural de Cabo de Gata, Almería, el 1 de marzo de 2013 (J. Pérez Contreras y B. Pérez Machado).

RUISEÑOR COMÚN

Luscinia megarhynchos

Canarias. En Lanzarote, un ave en el campo de golf de Tegui el 21 de abril de 2013 (F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos).

COLIRROJO REAL

Phoenicurus phoenicurus

Cita en invierno: un macho en Logrosán, Cáceres, el 14 de diciembre de 2012 (E. Peña).

TARABILLA NORTEÑA

Saxicola rubetra

Canarias. En Lanzarote en 2013: en Puerto del Carmen, un ave el 20 de abril (F. J. García Vargas); cinco o seis aves en el campo de golf de Tías el 21 de abril (F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos) y de nuevo el 24 de abril (F. J. García Vargas); tres aves en el campo de golf de Tegui el 21 de abril (F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos) y una en Playa Quemada, Yaiza, el 23 de abril (F. J. García Vargas). En Gran Canaria, una hembra vista en las charcas de San Lorenzo, Las Palmas de Gran Canaria, el 12 de octubre de 2012 (J. M. Benito Guerra).

TARABILLA EUROPEA

Saxicola rubicola

Canarias. En Tenerife, un ejemplar macho adulto en las proximidades de la charca del Fraile, en el malpaís de Rasca, Arona, el 10 de febrero de 2013 (H. Liebel).

ZORZAL REAL

Turdus pilaris

Canarias. En Lanzarote, dos aves en Los Valles, Tegui, entre los días 6 de diciembre de 2012 y 16 de marzo de 2013 (F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos).

ZORZAL ALIRROJO

Turdus iliacus

Canarias. En Fuerteventura, un ejemplar en bosque de casuarinas de Costa Calma, Pájara, el 25 de febrero de 2013 (C. Jensen Marcet/Audouin Birding Tours y M. Claudio Gombau).

ZARCERO BEREBER

Iduna opaca

Canarias. En Lanzarote, un ave en arbustos cercanos al campo de golf de Tegui el 21 de

abril de 2013 (F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos).

CARRICERÍN REAL

Acrocephalus melanopogon

Capturados para anillamiento siete aves en la Reserva Natural de la Laguna de Pétrola, Albacete, durante la temporada 2012 (G. A. Albacete/GAA).

CARRICERÍN COMÚN

Acrocephalus schoenobaenus

Canarias. En Tenerife, un ejemplar adulto en unos zarzales anexos al recinto aeroportuario de Los Rodeos, La Laguna, los días 27 y 28 de marzo de 2012 (B. Rodríguez, R. Barone y V. R. Cerdeña).

CARRICERO COMÚN

Acrocephalus scirpaceus

Cita de invierno: Un ejemplar capturado para anillamiento en las lagunas de Campotejar, Molina de Segura, Murcia, el 5 de enero de 2013, que presentaba malas condiciones físicas, sin acumulación de grasa y con poca musculatura (J. A. Barba, F. A. García Castellanos, Á. Sallent y otros/ANSE).

Canarias. En Lanzarote, un ave en Puerto del Carmen el día 20 y de nuevo el 30 de abril de 2013 (F. J. García Vargas).



Carricero común *Acrocephalus scirpaceus*. Lagunas de Campotejar, Molina de Segura (Murcia). Foto: Antonio Barba.

CURRUCÁ ZARCERA

Sylvia communis

Un ejemplar invernando en unos jardines de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, Álava, el 14 de diciembre de 2011 (G. Belamendia).

MOSQUITERO PAPIALBO

Phylloscopus bonelli

Canarias. En Lanzarote, un ave en el campo de golf de Tegui se el 21 de abril de 2013 (F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos) y de nuevo allí el 28 de abril de 2013 (F. J. García Vargas).

MOSQUITERO SILBADOR

Phylloscopus sibilatrix

Se observa un ave en Isla Menor, en la orilla del río Guadalquivir, Puebla del Río, Sevilla el 14 de octubre de 2012 (F. Chiclana).

Canarias. En Lanzarote, en 2013: en Puerto del Carmen, dos aves el 20 de abril (F. J. García Vargas); en el campo de golf de Tías, dos aves el 21 de abril (F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos) y sólo una el 24 de abril (F. J. García Vargas); en el campo de golf de Tegui se, dos o tres aves el 21 de abril (F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos) y en zona cercana a dicho campo de golf otro ejemplar el 28 de abril (F. J. García Vargas); en jardines del pueblo de Uga, Yaiza, un ave el 1 de mayo (F. J. García Vargas).

MOSQUITERO MUSICAL

Phylloscopus trochilus

Un ejemplar en el embalse de Arrocampo, Cáceres, el 3 de febrero de 2013 (P. García y R. Vicente).

PAPAMOSCAS CERROJILLO

Ficedula hypoleuca

Comportamiento de interés: en San Feliz de Torío, León, en un jardín, se observa dos veces a individuos cerniéndose en flores (prácticamente “pegados”) de un arbusto de rosa de Siria (*Hibiscus syriacus*, Malvaceae, especie exótica originaria de Asia), probablemente alimentándose de su

polen, que estas flores ofrecen en gran cantidad por múltiples anteras dispuestas sobre una larga columna estaminal. Menos probablemente, se alimentaban de néctar –son flores muy grandes con los nectarios al fondo de la corola acampanada, y los papamoscas cerrojillos, que presentan un pico corto para esta función, no introducían la cabeza y el cuello en la corola–, y tampoco pareció que se alimentaran de insectos florícolas pues mientras los papamoscas cerrojillos estaban cernidos no había insectos volando alrededor de las flores, ni se apreció que después llevaran una presa en el pico (A. Hernández).

BIGOTUDO

Panurus biarmicus

Cuatro juveniles en la laguna de Lacorzana, Álava, el 1 de septiembre de 2011 (R. Arambarri) y de nuevo un adulto y dos jóvenes el 2 de septiembre de 2011 (G. Belamendia). En el embalse de Arrocampo, Cáceres, numerosas observaciones

entre octubre de 2012 y marzo de 2013, destacando cuatro aves el 21 de octubre, tres machos el 3 de febrero y dos machos el 23 de marzo (SEO-Cáceres).

CARBONERO GARRAPINOS

Periparus ater

Bando de al menos 59 aves junto con algunos mosquiteros comunes y reyezuelos listados en un pinar de pino silvestre en la sierra de Tineo, Tineo, Asturias, el 21 de enero de 2012 (L. M. Arce, J. A. García Cañal y otros/SEO-Asturias).

TREPADOR AZUL

Sitta europaea

Se observa a un individuo capturando y almacenando hormigas aladas repetidamente en las grietas de la corteza de un árbol cercano (roble, chopo), entre Manzaneda y Pedrún, a orillas del río Torío, León, el 5 de septiembre de 2009; aun-



Treparriscos *Tichodroma muraria*. Salto del Gitano, Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres). Foto: José Luis Rivero/Natur-Extremadura.

que se conoce el almacenamiento de semillas y frutos (Sealy, 1985; Carrascal y Moreno, 1993; Moreno y Carrascal, 1995), no se conoce información sobre el almacenamiento de insectos (A. Hernández).

TREPARRISCOS

Tichodroma muraria

En la provincia de Cáceres: uno en Puerto Roque, Valencia de Alcántara, el 13 de marzo de 2012 (J. C. Jiménez Durán), uno en el Salto del Gitano, Monfragüe, el 10 de enero de 2013 (J. L. Rivero) y de nuevo el 28 de febrero de 2013 (R. Belenguer). Un ave en cabo Cope, Murcia, el 18 de marzo de 2013 (R. Vega).

OROPÉNDOLA EUROPEA

Oriolus oriolus

Canarias. En Lanzarote, en 2013, un macho en Puerto del Carmen el 20 de abril (F. J. García Vargas), y en el campo de golf de Tegui el 21 de abril un mínimo de 30 aves, algunas de ellas cantando (F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos); de todos estos ejemplares sólo se observan en dicho lugar tres el 28 de abril (F. J. García Vargas); dos hembras en jardines en el interior de caseríos cercanos a Caleta de Famara, Tegui, el 28 de abril (F. J. García Vargas).

ALCAUDÓN COMÚN

Lanius senator

Cita tardía: un individuo en Valdesalor, Cáceres, el 25 de noviembre de 2012 (A. Ceballos).

CHOVA PIQUIGUALDA

Pyrhocorax graculus

Un ave en el Elvillar, Sierra de Cantabria, Álava, el 21 de abril de 2012 (G. Belamendia).

GRAJA

Corvus frugilegus

Primera cita en Murcia: un ejemplar en La Guía, Cartagena, el 28 de enero de 2013 (A. J. Hernández).



Alcaudón común *Lanius senator*. Embalse de Valdesalor (Cáceres). Foto: Antonio Ceballos.

CUERVO GRANDE

Corvus corax

Se cuentan 170 individuos en el muladar de Molina de Aragón, Guadalajara, el 18 de octubre de 2012 (B. Molina).

Canarias. En Tenerife, donde los efectivos de la forma endémica canaria *C. c. canariensis* se encuentran en declive (véase Lorenzo, 2007 y referencias allí dadas), datos del sector noreste de la isla: en Igueste de San Andrés, Santa Cruz de Tenerife, uno posado cerca de la playa y después en las fincas cercanas el 30 de mayo de 2012 (N. García); uno en vuelo en Mesa del Mar, Tacoronte, el 11 de abril de 2013 (R. Larsson); tres aves sobrevolando las laderas de Igueste de Candelaria los primeros días de marzo de 2012, y de nuevo en el mismo lugar dos ejemplares en vuelo por la zona alejándose con dirección a Barranco Hondo el 2 de marzo de 2013 (S. Contreras).

ESTORNINO PINTO

Sturnus vulgaris

Canarias. Datos de efectivos invernantes. En el sur de Tenerife, en campo de golf en San Miguel, grupo de ocho aves el 26 de febrero de 2013 (M. B. Lancaster). En La Palma, grupo de nueve aves en una arboleda en el interior de la ciudad de El Paso el 12 de enero de 2013 (A. Moore).

GORRIÓN MORUNO*Passer hispaniolensis*

Inusual invernada en Málaga: en el río Guadalhorce se observan bandos de más de 50 aves durante todo el mes de febrero de 2012 (E. Alba y J. Alba).

GORRIÓN ALPINO*Montifringilla nivalis*

Se observan 19 ejemplares en el Barranco de Atzavara, Borriol, Castellón, el 5 de noviembre de 2012 (L. Pereda). Un ejemplar en Peña de Francia, Salamanca, el 14 de noviembre de 2012 (R. Montero).

ESTRILDA COMÚN*Estrilda astrild*

Grupo de 12 aves en el río Guadamar, Olivares, Sevilla, el 14 de julio de 2012 (A. Domínguez).

BENGALÍ ROJO*Amandava amandava*

Dos aves en el Brazo del Este, Sevilla, el 5 de febrero de 2012 (A. Domínguez). Una pareja con tres jóvenes en el río Guadalhorce, Alhaurín de la Torre, Málaga, el 5 de noviembre de 2012 (E. Alba y J. Alba).

ESTRILDA CULINEGRA*Estrilda troglodytes*

Una pareja con dos pollos voladeros en el río Guadalhorce, Pizarra, Málaga, los días 28 y 30 de agosto de 2012 (J. Alba y E. Alba).

PINZÓN VULGAR*Fringilla coelebs*

Canarias. Datos de efectivos invernantes en las islas orientales. En Lanzarote, tres aves en el campo de golf de Teguisse entre los días 24 de noviembre y 31 de diciembre de 2012 (F. J. Gar-



Gorrión alpino *Montifringilla nivalis*. Peña de Francia (Salamanca). Foto: Ricardo Montero.

cía Vargas y A. Unquiles Cobos); dos aves en Los Valles, Teguiise, los días 8 y 13 de enero de 2013 (F. J. García Vargas y A. Unquiles Cobos); un ejemplar en Playa Blanca, Yaiza, el 10 de enero de 2013 (F. J. García Vargas). En Fuerteventura, en bosque de casuarinas en Costa Calma, Pájara, dos ejemplares –macho y hembra– el 30 de diciembre de 2012, y tres aves –dos hembras y un macho– el 3 de enero de 2013 (E. Möller).

PINZÓN REAL

Fringilla montifringilla

Dormidero con unos 200.000 ejemplares en Artikutza, Guipúzcoa el 23 de noviembre de 2012 (R. Saiz y H. González). Miles de ejemplares en Quinto, Zaragoza, el 9 de diciembre de 2012 (A. Sánchez Galán y M. Galán). Siete aves en Fuente Bermeja, zona cercana a la Reserva Natural Laguna de Medina, Jerez de la Frontera, Cádiz, el 3 de enero de 2013 (P. Delgado y F. Lara). Unos 200 ejemplares que se mueven entre el soto del río Tajo y cultivos de alrededor, Añover de Tajo, Toledo, el 12 de enero de 2013 (B. Molina y E. Escudero).

SERÍN VERDECILLO

Serinus serinus

Bando monoespecífico de 700-750 individuos alimentándose en el suelo en una zona de herbáceas en la base aérea de Armilla, Granada, el 25 de noviembre de 2012 (J. Pérez-Contreras).

VERDERÓN SERRANO

Carduelis citrinella

Bando mixto con lúganos en la Sierra de María, Almería, a unos 1.400 m s.n.m., el 25 de octubre de 2012 (R. Martín). En Piornal, Cáceres, tres aves en el pinar del puerto el día 5 de febrero (J. Prieta) y seis aves en el pinar del pueblo el 8 febrero 2013 (J. Prieta y S. Mayordomo).

PIQUITUERTO COMÚN

Loxia curvirostra

Una pareja, aparentemente fijada en un territorio, y dos machos, en un pinar de pino silvestre,

en la sierra de Tineo, Tineo, Asturias, el 21 de enero de 2012 (L. M. Arce, J. A. García Cañal y otros/SEO-Asturias). En Cáceres, donde es una especie muy escasa: uno en vuelo en Monfragüe el 18 de noviembre de 2012 (C. Mills), un macho en vuelo en el pinar de Cañaverál el 22 de noviembre de 2012 (S. Mayordomo), dos aves en La Garganta el 5 de enero (R. Montero), así como seis aves el 13 de enero de 2013 (C. Clemente, E. Palacios, J. Guerra, M. Gálvez, M. Á. Muñoz y S. Mayordomo).

CAMACHUELO TROMPETERO

Bucanetes githagineus

Canarias. En Tenerife, donde la especie se puede considerar en serio peligro de extinción y ha dejado de verse en las localidades típicas del sur de la isla (véase Lorenzo, 2007 y referencias allí dadas), citas correspondientes al período 2010-2013: un ave junto a la autopista del sur, en una zona situada por encima de San Miguel de Tajao, Arico, el 5 de enero de 2010 (D. Trujillo); dos o



Camachuelo trompetero *Bucanetes githagineus*. Granadilla de Abona (Tenerife). Foto: Antonio Acedo.

tres aves reclamando y sobrevolando la zona de Hoyos Blancos, Granadilla de Abona, el 8 de noviembre de 2010 (J. A. Lorenzo); al menos dos aves posadas en un muro en cultivos abandonados en las proximidades de la presa de Llano Azul, cerca de Cabo Blanco, Arona, el 18 de enero de 2011 (J. A. Lorenzo); una pareja en sector roturado cerca de obras abandonadas y charcos de agua en tablero junto a La Caleta, Adeje, el 2 de febrero de 2011 (J. A. Lorenzo); una pareja entra a beber en la charca del Fraile, Arona, el 8 de febrero de 2012 (V. Cubas); y por último, un ejemplar en el muro de la presa de Bernardino, Granadilla de Abona, el 7 de enero de 2013 (A. Acedo y C. García).

PICOGORDO COMÚN

Coccothraustes coccothraustes

Un ejemplar en un hayedo de los montes del Infierno, Piloña, Asturias, el 6 de noviembre de 2010 (L. M. Arce).

ESCRIBANO NIVAL

Plectrophenax nivalis

Un ave en el marjal del Moro, Sagunto, Valencia, los días 27 de marzo (F. Lloris y T. Alcocer) y 4 de abril de 2013 (M. Wilton-Jones). En el monte Gorramendia, Baztán, Navarra, en el invierno 2012-2013 se observa un macho adulto el 15 de noviembre (J. L. Gómez) y el 19 de diciembre (J. Ardaiz), y una hembra adulta el 30 de diciembre (P. Arratíbel y P. Arratíbel) y el 2 de enero (R. Fernández).

ESCRIBANO CERILLO

Emberiza citrinella

Un ejemplar en La Garganta, Cáceres, el 6 de enero de 2013 (R. Vicente).

AGRADECIMIENTOS.—A todas aquellas personas que ceden amablemente sus observaciones y que permiten elaborar este informe. En el caso de Canarias, de forma destacada a F. Javier García Vargas (Lanzarote), Rubén Barone (Tenerife) y Robert Burton (La Palma). Un agradecimiento especial al Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, y especialmente a su Secretario Ricard Gutiérrez por el envío de las citas que llegan desde dicho comité. Además, cabe agradecer el esfuerzo llevado a cabo por Sergio Mayordomo en la recopilación de registros en Extremadura y por Agustín Carretero (SEO/BirdLife) al revisar y mejorar la edición. También a Luis María Carrascal por la información proporcionada sobre trepador azul.

BIBLIOGRAFÍA

- BERTAN, J. y MARGALIDA, A. 2005. Actividad sexual en el quebrantahuesos: cópulas frecuentes y vigilancia de la pareja como estrategias para proteger la paternidad. En, A. Margalida y R. Heredia (Eds.): *Biología de la conservación del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en España*: 41. Madrid. Organismo Autónomo de Parques Nacionales.
- CARRASCAL, L. M. y MORENO, E. 1993. Food caching vs immediate consumption in the Nuthatch: the effect of social context. *Ardea*, 81: 135-141.
- LORENZO, J. A. 2007 (Ed.). *Atlas de las aves nidificantes en el archipiélago canario (1997-2003)*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-SEO/BirdLife. Madrid.
- MORENO, E. y CARRASCAL, L. M. 1995. Hoarding nuthatches spend more time hiding a husked seed than an unhusked seed. *Ardea*, 83: 391-395.
- SEALY, S. G. 1984. Capture and caching of flying carpenter ants by pygmy nuthatches. *Murrelet*, 65: 49-51.